

OCTA VII HORA

TIANI rerum Medica-
rum LIB. Quatuor.

- I. Logicus, De curationibus omnium ferme mor-
borum corporis humani, ad Euporistum. 1
- II. De Acutis & Chronicis passionibus, ad eundē. 31
- III. Gynecia, De Mulierum accidentibus, & curis eorun-
dem, ad Victoriā. 72
- III. De Physica scientia, Experimentorum liber, ad
Eusebium filium. 80

¶ Per Heremānum Comitem a Neūenar,
integrali candori nuper restitutus Auctor.

ALB V. CASIS CHIR

URGICORVM omniū Pri-
marij, LIB. tres.

- I. De Cauterio cum igne, & medicinis acutis per sin-
gula corporis humani membra. Cum Instrumen-
torum delimitatione. 119
- II. De Sectione & Perforatione, Phlebotomia, & Ven-
tosus. De Vulneribus, & extractione sagittarū, &
ceteris similibus. Cum formis Instrumentorū. 149
- III. De restauratione & curatione dislocationis mēbro-
rum. Cum typis item Instrumentorum. 177

¶ Cum gratia & Priuilegio Cæs. Ma-
iestatis ad Quinquennium.

¶ ARGENT. apud Ioannem
Schottum M. D. XXXII.

AT 50

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

Reuerendiss. in CHRISTO Patri ac domino, domi-
no Heremanno, sanctæ Colonienſis Eccleſiæ Archi-
epiſcopo, ſacri Romani Imperij per Italiam Ar-
chicancellario, Principi Electori, Veuſt-
phaliæ, & Angariæ Duci, Lega-
toꝝ nato. &c. domino
meo gratioſiſſimo

Audîo, reuerendiſſime domine, tuam amplitudinem, quicquid tem-
poris a grauiffimis Colonienſis diocæſeos curis ſuffurari poſſit, Medi-
cinæ cognitioni libenter impendere ſolere. Quod quidem ſtudiij genus,
ut patruus meus Heremannus Cômes a Neüenare, clariffimus ſane
uir, pro ſua uirili promoueret, aliquot eius artis autores, undecũq; ſum-
ma cura collegerat, quos a mendis repurgatos in lucem ſtudioſis emit-
teret. Ex quibus & hunc OCTAVIVM HORATIA-
NVM innumeris mendis ſcatentem, diligenter emacularat, T. A. abſo-
lutum opus conſecraturus, ni partim iſti operæ imperfectæ adhuc, par-
tim T. cellitudinis negocijs Auguſtæ Vindelicorum ante diem immor-
tuus eſſet. Nihilominus ut intelligeret T. D. quam ſtudioſe in hoc Scri-
ptore eſſet aduigilatum, uolui ego T. A. pro Patruo meo eundem Scri-
ptorem, utcũq; purgatum, dedicare. Quem ſpero pergratum futurum:
cum quod ad palatum faciet: tum quod eſt e corrupto fere in integrum
reſtitutus. De ipſius uero uita quum nihil certi, nobis ſaltẽ, conſtet, ſty-
lus tamen Africanum indicat. Tractat autem omnia fere argumenta,
tituliſq; Librorum iſdem quaſi uütur quibus Aurelianns alter, Præ-
ceptorem habuit Vindicianum, qui archiaterus fuit Imp. Valentinia-
ni, quemadmodum lib. 2. ad Euſebium filium teſtatur. Ego R. D. cum
ingenij uires ætate & iudicio mihi creuerint, mea (quod aiunt) Miner-
ua, partum opus offeram. Dominus interim ſeruet nobis T. A. diu in-
columem, cui me uelim quam commendatiſſimum. Datum Bedbur-
gij, Anno Domini M. D. XXXI. Pridienatiuita-
tis Ioannis Baptiſtæ.

Infra fol.
si. b.

Reuerendiſſimæ P. T.

deuotus,

Heremannus ex Comi-
tibus de Neüenare.

I N D E X Capitulum & earū rerū quæ scitu digniora.

A B O R T I V I

De Acoris 4
Acopum Dyacissum 36 c
De Alopetiosis 5
Ad Alopetias 102 d
Anni quatuor tempora 92 d
Ano accidentia 25
Antidorū Dyarobum ad pectoris, stomachi, iccoris, splenis, & omnium interaneorum dolorem 87 b
Antidotum ad digestionem, prouocationem urinæ, & colum. ibi.
Antidorū ad omnes dolores interaneorum 86 c
De Apoplecticis 38
De Apum, ceterorūq; animæ liū percussibus 23
Et turpibus ac latentibus receptis. 60.
De Artriticis 69, 75
De Atrophia 15
Ad Auriculæ dolorem 91 b
Aurium causationes 7
Ad Auriginem 98 d
Et Auriginosos 91 a
Ad Anrium dolores 88 c, 93 b

C Aliginis remedia 100 c
Capillorum infectiones 2
Et ut nigrescant 87 a
Capilli ut crescant 3, 87 a
Ad Capillorum defectionem ex ægritudine 4
Ad Capillos cadentes 3
Capitis querelæ 44, & seq.
Ad Capitis dolorem 81 b, & 93 b
Ad Calculum 90, 91 a, 100 d, & seq.
De Carbunculis 18
De Cardiacis 42
De Catarro 50, & seq.
Cerebri natura 109 a
De Cholera 43
Cibi & potus distributio, & operatio 111 a b
De Colicis 36
Ad Coli dolorem 191 b, 90 d, 94 d

De Conceptione 75
Ad Conceptionē 84, 100 c
Ad Cordis dolorem 91 a
Ad Cordis formidinem 95 a
Corporis humani partitio, & obseruatio 91 b

D ENTium curationes 14
Ad Dentium dolorem 100 c
Ad Dēitionē infantium 102 d
De Diaphoreticis 42
Dyamoron Sebastii 86 c
Dyamoron simplex 80.
Dyacitrium 87 b
Dyaherpillū acopum 87 b
Dyaltheæ compositio, & uirtus. 89 b
Dyarobum ad pectoris dolorem. 85 b

De Dysentericis 64
Ad Dysentericos 86 d, & seq. 90 d, 97 a, 100 c
Vt infirmus Dormiat 946 c

E L E Phantiosi 29
De Empyicis 54
De Epaticis 56
Ad Epar 90 c, 91 a, 96 c
Epilepsiæ causa 112 c
De Epilepticis 46
Contra Epilepsiam 82 c
Vt Escam contineas 97 a

F A V C ium uitia. 15
De Febribus 32
Ad Febres 98 c d
Ad Febrē medullarē 60, d
De Furunculis 8
Ad Furunculos 99 a

G E N I c ulorū dolor 98 c
De Gonorrhia 80

H E M I G R A n e æ curat. 93 b, 102 d
Ad Hemitrytim. 85 a, 98 c d
Hemorrhœia matricis 79
Ad Hemorrhoides. 86 d, 99 a
De Herniosis 25
Hominis in utero figuratio, & crementum 107 a b
Hordiolum oculi 91 a
Ad Hyrcosos 97 a
De Hydropicis 66
Hydropis generatio 113 b
Ad Hydropem 88 c d
De Hydrophorbicis 38

Hygæopatio mirabilis 84 c
I C T Ericiæ descriptio 7
cura
De Igne sacro
Ad Ignem sacrum 99 a
Delliaciis

Vt non Infirmis
Ad Interanea & febres 60, c
Ad Intestinorū dolorē 91 b
Ad Intestini exitum 96 d
Ad Iocinoris dolorem 97 a
De Ischiadicis 69

L A B I A crepitantia
Lapidis in uelica generatio.
Ad Lateris dolorem 91 a, & 96 c

De Lethargicis 71
Linguae natura 108 d
Liquaminis confectio 102 d
Ad Luem potio 81 a
De Lumbricis 9
Ad Lumbricos 84 d, 91 b, 90 c, 95 b

De Luxationibus 79
Ad Luxatum 96 c

M A M M I l l a r u m post partum dolor 70

Ad Māmillarū dolorē 91 a
De Matricis prefocatione 77
De Matricis inflatione 74
De Matricis hemorrhœia 79
De Matricis uulneribus 60.
Ad Matricem, & menstruum prouocationē 83 b, 84 d
Medicinæ partitio 106 b
De Melancholicis 60.
De Menomenis
Ad Morbū regiū 101 b, 105 a
Ad Morsum serpentis 95 b

N A R I V M morbi
Nariū fluxus sanguinis 60.
Ad Nauseam 97 a
De Neureticis 60

O C V L o r ū causæ
Ad Oculos equi 100 c
Oleum bonū, & nigrū, suauissimum 100 c
Oris uitia 100 a
Oscitatio 100 a

P A N N I c u l i cura 98 d

de Papulis 16
de Paraliticis 49
de Paronichijs 28. 95 a
de Paronidis 7
Partium diuersus conca-
pans 110 c d
Palsi confectio 102 d
Vt pauore equo tollas 102 c
Ad Pediculosos 4
de Peripleumoniaci 36,
& 113 a
De Pernionibus 27
Ad Perniones 84 d
Philosophiani medicamentū
mirabile 87 b
De Phreneticis 33
De Phthisicis 52
Ne Pili oculorum canes-
cant. 98 c
Pili ne nascantur 102 b
De Pleureticis 35
De Podagricis 69
Ad Prurium 90 c
De Pruritu & Scabie 28
Purgatio Fœminarū 109 b
RAGADIAE Pedū,
ud Digitorum 27
De Renum uitij 68
Ad Renum dolorem 97 a,
& 100 c
De Reumatis fluxu 79
Ad Rigorem 102 c
SACCOMELLIS con-
fectio. 86 d
de Sanguinis effusione per
uaria membra 53
Ad Sanguinis uomitū 86 d
Ad Sanguinis fluxum e na-
ribus. 90 d
de Satiriasi 41
Ad Scabiem equorū 102 c
de Scotomaticis 47
Semen qd sit, & undena-
tur 102 d. & seq. 109 b
Serpentum fuga 49 b
Singultus 113 b
Ad Sisculosos 98 d. 99 b
Ad Solutionem membro-
rum. 99 a
Ad Somnum 98 d. 99 b
Spasmus 113 a
de Spasms 40
Ad Spasum cordis 95 a
De Splenicis 53. 96 d
Ad Splenem 90 c

Stertutatio 112 d
Stomachi uaria acciden-
tia. 59. & seq.
Ad Stomachi inflationem
folio 95 a
Stomachi confortatiū ibi.
Ad Stomachum 100 c
De Strophicis 39
Ad Susprium 95 b
De Synanchicis 37
De Syntexi 55

TALORUM tumor quem
admodū sedetur 98 c
Tactus quid sit 109 a
De Testiū indignatione 24
Ad Tibiarū uulnera 98 c
Ad Tineas capitis 99 a
Troscifi Musæ 89 b
Ad Tussim 94 c

VENTRIS dolor q-
modo sedetur 99 a. 98 c
Ad Ventris fluxum 95 a
Contra Ventris obstipatio-
nem. 95 b
Ad Ventris solutionē ibi.
De Veretri. i. naturę uitij. 24
De Vesicę uitij 68
Ad Vesicę dolorē 81 a. 90 c
Ad Vinosos 98 d. & seq.
Vt Vinū bonum fiat 102 c
Vocis natura 109 a
De Vulneribus uarijs ex cau-
sis infixis 19
De Vulneribus ex se nascen-
tibus. 21
Ad Vulnera pedum 99 a
Ad Vrinę difficultatē 87
De Visione 17

F I N I S.

Capita Partis Pri- mæ Albucasis.

De iuuamēto & nocumen-
to Cauterij, & qbus cōplexi-
onibus cōueniat: & quo tpe:
et si cū ferro, uel auro. fol. 119
Cauterizatio Capitis in com-
missura coronali 121
Caterizatio capitis in dolore
totius capitis 122
Cauterizatio in hemigranea,
ram cum medicīna adusti-
ua, quam cum ferro- 120.

Cauterizatio in hemigranea
antiqua 123
Cauteri. in dolore Aurij 124
Cauterizatio in Tortura eo.
Cauterizatio in Apoplexia
antiqua 125
Cauterizatio i Obliuiscē eo.
Cauterizatio in Paralisi &
mollificatione eo.
Cauterizatio in Epilepsia eo.
Cauterizat. i Melacholia 126
Cauterizatio in aqua descen-
dente ad Oculum eo.
Cauterizatio in Lachrymis
antiquis 127
Cauterizat. i fectore Nasi eo.
Cauterizatio in mollificati-
one Palpebrę eo.
Cauterizatio Palpebrę, cum
pili inuerfantur pungen-
tes oculum eo.
Cauterizatio cū medicīna cō-
burente in eodē casu 128
Cauterixcio in Fistula la-
chrymali 129
Cauterizatio in fissuris La-
biorum 130
Cauteriz. in fistulis Oris eo.
Cauterizatio in Gingiuis, &
Dentibus mollificatis 131
Cauterizatio in dolore Den-
tium. eo.
Cauteriza. in Strophulis 132
Cauterizatio in raucedine
Vocis, & constrictione
anhelitus. eo.
Cauterizatio in agitudine
bus Pulmonis & tussi eo.
Cauterizatio in Titillico in
dislocatione humeri 133
Cauterizatio Stomachi eo.
Cauterizatio Epatis frigi-
di. 134
Cauterizatio apostematis
Epatis. 135
Cauterixcio in Pleuresi eo.
Cauterizatio Splenis 136
Cauteriza. in Hydropisi. eo.
Cauterizatio Pedū, & Cru-
rum. eo.
Cauterizatio in solutione
Ventris. 137
Cauterizatio Hemorrhoi-
darum. eo.
Cauterizatio althelul post
abscissionem eorum eo.
Cauteriza. fistulę in Ano 138

Cauterizatio Renum 138
 Cauterizatio Vesicæ eo.
 Cauterizatio Matricis eo.
 Cauterizatio Anchæ in dis-
 locatione 139
 Cauterizatio in-Sciatica eo.
 De cauterizatione in dolore
 Dorsi. 142
 Cauterizatio in incæptione
 Gibbositatis. eo.
 Cauterizatio in Podagra, &
 doloribus Iuncturarū 143
 Cauterizatio in Rupturis 144
 Cauterizatio in dolorib. pro-
 pter casum a pçussione 145
 Cauterizatio in Lepra eo.
 Cauterizatio in Stupore 146
 Cauterizatio in Albaras eo.
 Cauterizatio in Cancro eo.
 Cauterizat. in Adubelati eo.
 Cauterizatio in malo corro-
 dente. 147
 Cauterizatio in Clauis &
 Verrucis. eo.
 Cauterizatio in Tremore 148
 Cauterizatio Albathir eo.
 Cauterizatio in fluxu sangui-
 nis ex arteria i uulnere eo.
Capita Partis Se-
cundæ Albucasis.
 Decuratioe Aquæ quæ ag-
 gregat in capitib. puerorū 150
 De Incisione Arteriarū quæ
 sunt post Aures 151
 De extractione arteriarū quæ
 sunt in Timporibus 152
 De cura cursus lachrymarum
 acutarum assiduorum ab
 Oculis. 153
 De cura lachrymarum acuta-
 rum, & catarrorū ad ocu-
 los, ex interiorib. capitis 154
 De cura eius quod cadit in
 Aures. 155
 De cura opilationis acciden-
 tis Auri 157
 De cura Althelil Palpebra-
 rum. 158
 De cura Grandinum Palpe-
 brarum oculi eo.
 De cura Axirnath. i. grossitu-
 dinis Palpebrarum 159
 De modis Ataxmir Oculi. i.
 cū palpebra mollificat ocu-
 li, unde fit ut rugetur sicut
 non debet 160
 De eleuatione pilorū pungen-

tium in Oculo cum acu 161
 De cura Alxatrati, quæ acci-
 dit in Palpebra superiori 162
 De cura alxatrati quæ fit in
 Palpebra inferiori, & est ru-
 gatio, uel cōtractio sursum
 ad dextrū & sinistrum eo.
 De adherentia Palpebrę ocu-
 li cum coniunctiua, aut
 cornea. 163
 De incisione unguulæ & emi-
 nentia carnis Lachryma-
 rum. eo.
 De incisione Alguardenigi, &
 carne nata in oculo 165
 De collectione Sebel ex O-
 culo. eo.
 De reductione Arissati ad
 Nasum. 166
 De reductione eminentia
 Oculi. 167
 De incisione uuæ Tunice eo.
 De curatione Alcomnati 168
 De cura aquæ quæ descendit
 in oculo, uel cataracte eo.
 De cura carnis natæ in Na-
 so. 170
 Decura Thelul Nasi 171
 De futura Nasi & labij, &
 auri. eo.
 De extractione Nodorum
 Labiorum 172
 De incisione carnis natæ su-
 per Gingiuam. eo.
 De racione Dentium cum
 ferro. eo.
 De extractione doloris Den-
 tium. 173
 De eradicatione Dentium, &
 extractione ossium mandi-
 bularum fractarum 174
 De serratura Dentium eminen-
 tium super alios 176
 De retatione Dentium cum
 filis auri eo.
 De incisione ligamenti quod
 accidit sub Lingua, & pro-
 hibet loquelam 177
 De extractione ranulæ quæ
 fit sub Lingua 178
 De curatione apostematis du-
 arum Amigdalarum eo.
 De incisione Vuulæ aposte-
 mata. 179
 De extractione spinarum &
 ossium de Gula 181
 De extractione Sanguisugæ 182
 De apertione Apostematū &

eorū sectione & cura
 De sectione Apostematū
 accidit in cute Capitis
 De sectione Strofularum
 Collo.
 De sectione Epiglottis ab apo-
 stemate intra guttur acci-
 dente.
 De sectione herniæ Gutturis
 De sectione super speciem No-
 dorum.
 De formis Instrumentorū pro
 sectione & perforatione
 Decura Māmillarum homi-
 num quæ mamillis mu-
 lierum assimilantur
 De perforatione Apostematū
 qd accidit sub Titillico
 De sectione Apostematis qd
 accidit propter arteriam &
 uenam. eo.
 De Apostemate qd accidit ex
 torsione Nervorum
 De sectione Apostematis qd
 accidit in Ventre
 De cura eminentiæ Umbilici. eo.
 Decura Cancri
 De cura Hydropisis
 De cura infantū qui nascun-
 tur locis Vring eorum non
 perforatis.
 De Albather quæ accidit in
 præpucio & capite uirgæ,
 & corruptione, nigredine,
 & adhærentia
 De mundificatione infantū,
 & curatione ex errore eis ac-
 cidente in circūcidendo
 De extractione urinæ retenta
 in uesica
 De qualitate clisterizationis ut
 sicæ cum clepsidra
 De extractione lapidis ue-
 sicæ.
 De extractione lapidis muli-
 erum.
 De sectione super herniam
 aquosam.
 De cura Ramicis carnosæ
 De cura Ramicis quæ est cū
 uite.
 De cura Rāicis testinalis
 De Ramice uentosa
 De disruptione quæ fit in
 guinibus
 De mollificatione cutis Te-
 sticulorum
 De Castratione

De cura Hermafroditiz duo-
rum modorum. 213
De incisione Tentiginis, & car-
nis eminentis in uuluis mu-
lierum 214
De cura Alratice, quæ est uul-
ua mulieris non perfora-
ta. eo.
De cura Hemorroidarum a-
thetis & bothor in uuluis
mulierum 215
De perforatione exituræ quæ
accidit in matrice eo.
Doctrinæ Obstetricum qua-
liter medicetur embriones
uiui, secundum figuram non
naturalem egressi 216
Exitus Embrionis super pe-
des. 217
Exitus foetus super genua &
manus 218
Exitus foetus latitudinaliter
pendens ex manibus eo.
Exitus foetus super collum ex-
pansis manibus, & facies
eius ad dorsum matris
sua. eo.
Exitus foetus super latus eo.
Exitus Geminorum, aut foe-
tum multorum 219
De extractione foetus mor-
tui. 219
De formis Instrumentorum
necessariorum in extrac-
tione foetus. 221
De extractione Secundinæ 224
De curatione Ani non per-
forati. 225
De curatione Fistularum quæ
accidunt in inferiori par-
te. eo.
De cura Hemorroidarum,
ex quibus currit sanguis ex
incisione earum: & cura fissu-
rarum. 228
De curatione Almedemir in-
uerforum, & non inuerfo-
rum: & althelid siccorum &
formicæ. 229
De formis Instrumentorum quæ
administrantur ad clisteria
in ægri tudinibus Ani, & so-
lutionis uentris, et colicæ eo.
De curatione Vulnerrum capi-
tis sine fractura ossis 231
De uulneribus Colli 232
De uulnere in Spaulis 233
De uulneribus Ventris, et exi-

tu intestini, & exitura eo-
rum. 234
De cura Azufen & Fistula-
rum. 238
De incisione extremitatum, &
Serratura ossium 244
De cura Sinuum, & qualita-
te clisterizationis cum me-
dicinis. 247
De cura Panaricii & unguis
attrite, & incisione digiti ad-
diti, & sectione 249
De incisione Vitium 250
De extractione Venæ cru-
ris. 252
De sectione super Vermes ge-
neratos sub cute, & dicitur
ægritudo bouina 253
De sectione super ægritudi-
nem Nasir eo.
De extractione Sagittarum 254
De Phlebotomia uenarum 259
De Ventosatione, & qualitate
usus eius 270
De suspensione Sanguifusa-
garum. 275

Capita Partis Ter- tiæ Albucasis.

Sermo uniuersalis de resta-
uratione, & dislocatione, &
curatione torsionis, & si-
milibus 277
De iunmis & collectionibus,
& esse fracturæ ossium, ex
eis quarum præmissio ne-
cessaria est eo.
De fractura accidente in ca-
pite. 283
De restauratione Nasi, quæ
do frangitur 289
De restauratione Mandibu-
larum inferioris, quando dis-
rumpitur 290
De restauratione Furculæ,
quando frangitur eo.
De restauratione fracturæ
Spatulæ 292
De restauratione fracturæ
Pectoris 293
De restauratione Costarum,
quando franguntur eo.
De restauratione fracturæ
Spondylii dorsi et colli 294
De restauratione Anchæ 297
De restauratione fracturæ
Adiutorij eo.
De restauratione fracturæ

Brachij. 297
De restauratione fracturarum
Manus 298
De restauratione fracturæ
Coxæ 299
De restauratione fracturæ Ro-
tulæ genu 300
De restauratione fracturæ
Cruis 301
De restauratione fracturæ ossi-
um Pedis & Digitorum eo.
De fractura Vuluæ mulie-
ris, & ossis pectinis, & uir-
gæ uiri 302
De restauratione fracturæ ossi-
um, quando est cum uul-
nere 303
De curatione Nodationis in
uestigio fracturæ 305
De curatione quando restau-
ratur, & remanet membrum
post illud subtile non secun-
dum naturam suam eo.
De curatione ossium fracto-
rum, quando restaurantur
tortuose 306
De sermone in Dislocatione eo.
De cura dislocationis Mandi-
bulæ inferioris 307
De reductione dislocationis
Furculæ, & extremitatis
humeri eo.
De reductione dislocationis
Humeri 308
De restauratione dislocatio-
nis Cubiti 310
De curatione dislocationis
Almahasem 311
De curatione dislocationis
Digitorum 312
De curatione dislocationis
Spondilium dorsi eo.
De curatione Anchæ dislo-
catæ 314
De curatione dislocationis
Genu. 317
De curatione dislocationis
Calcanei eo.
De dislocatione Digitorum
pedis: & cura 318
De speciebus dislocationis
cum uulnere uel fractu-
ra. eo.

F I N I S.

Capita Libri PRIM I, qui
LOGICVS dicitur.

De infectionibus Capillorum	2
De Capillis cadentibus	3
De cremento Capillorum	eo.
Ad defectionem Capillorū, quibus ægritudine pro- lixa carere sæpe contingit.	2
De Pediculosis	eo.
De Acoris	eo.
De Alopetiosis	5
De Aurium caussatione	7
De Parotidis	eo.
De Furunculis	8
De Oculorum caussis	10
De Narium morbis	13
De fluxu sanguinis Narium	eo.
De Labijs crepantibus	12
De Dentium curationibus	eo.
De uitijis Faucium, uel Oris	15
De Papulis minutis ubiq; nascentibus	16
De Vitione calida, uel ignis	17
De Carbunculis	18
De Vulneribus uarijs casibus infixis	19
De Vuulneribus ex se nascentibus	21
De Igne sacro	22
De Apum percussibus, uel scorpionum, cæterorum q; serpentum.	23
De turpibus Receptis & latentibus	eo.
De Testium indignatione	22
De Veretri, hoc est, naturæ uitijis	eo.
De Herniosis	25
De diuersis uitijis in Ano nascentibus, uel Syringis, hoc est, Fistulis	eo.
De Pernionibus	27
De Ragadijs pedum, uel digitorum	eo.
De Paronichijs	29
De Pruritu, uel Scabie totius corporis, uel uarijs ma- culis in corpore.	eo.
De Elephantiosis	29
De Luxationibus.	30

N V P E R R I M E college Olympij exhortatione prouocatus, cō-
feci nōnullos presentaneos libellos, quos uel mediocris fama retinet, sed
græco stylo, quam medendi industriam sermone claro hæc natio publi-
cauit. In his igitur uoluminibus non studium teneo gloriæ, neq; em̄ elo-
quentiæ hic opus est, sed laboris. Quippe quia fragilitas humani cor-
poris remedium efflagitat, & celeris beneficij natura consentiente com-
poni. Non omnis enim ualetudo medendi patitur tarditatem. Quapro-
pter amice charissime, quæ ornatui nostri corporis, uel saluti procuran-
de, custodiendæq; conueniant ordinata remedia, nunc in tuam gratiam
nostro sermone digessi, non sine famæ lucro, ut arbitror. Ipsum enim in
utroq; genere Opus, plures testes habebit quam iudices.

OC T A V I I H O R A T I A N I, in Primum

Operis sui librum, qui L O G I C V S

dicitur, ad E V P O R I S T V M

P R A E F A T I O.



I M E D I C I N A M I N V S E R V D I T I B

ac rustici hominis, natura tantū imbuti, non etiā phi-
losophia occupati essent, leuioribus ægritudinum in-
commodis uexaremur, & faciliora remedia caperentur. Sed hæc uia ab
illis omisa est, quibus eloquentiæ studiosis, scribendi ac disputandi glo-
ria maior fuit. Nam scire uelim, qui fieri possit, ut cum quid rectum, aut
contrarium, quid salubre, aut incōmodum sit, huiusce artis professo-
res inter se dissentiant, diuerforumq; sentētiās singuli seruare conentur;
iacietur æger magna tempestate morbi: tunc nostri collegij caterua con-
currit, tunc nos pereuntis admiratio possidet: nec cōmunis naturę con-
dicio conuenit, sed tanquā in circo & agone, alijs eloquentia, alijs dis-
putando, alijs destruendo, quisq; inanem gloriam captat. Interea dum
hi inter se luctantur, atq; æger sic casui proprio datus, nonne uidetur na-
tura ipsa rerū hæc dicere, O frustra occupatū mortaliū genus: occiditur
æger, non moritur, et mihi fragilitas imputatur: Sunt infiniti morbi, sed
desunt remedia: Latent in fruticibus uenena, sed non germinant salutis
officia: Absit hoc. Nescio quæ perturbat rerum disputatio, atq; iste lo-
quacitatis uanus amor. Hæc ego saluti mortalium remedia nō dedi, sed
magna semina, ac frugum, herbarumq; potestates, et quicquid propter
homines genui, hæc dixi. Nō ut tibi amice, error noster sit charior, quia
de ægrotis certandi studium, & instructiuosa uerba deferimus. Hinc est,
q; ego huiusmodi opus aggressus sum, ut facilioribus, potiusq; natu-
ralibus medicemur remedijs: ut disputatione garrula careat Medicina;
q; iactanti oratione miseros & afflictos teneamus: hoc est, euporistis, suc-

In medicos ar-
gutulos &
scholasticos.

Cis, tritico, farina, & hordeo, herbisq; uarijs, uel metallis, & similibus ceteris, quibus manifesta remedia natura signauit. Neq; enim quum egrotus quispiam afficitur, adhibendus est Pontus, aut interioris Arabiae ostrea, uel castores, uel reliquae fruges, quas orbis longinquus familiares habet. Ideo Medicinam etiam in uilibus herbis, parens natura disposuit: ut nullo bello, uel tempore medendi desit officium: quum ubiq; possit esse remedium. Hoc igitur uolumine bonam hominis ualitudinem expediui, & ut aiunt, rusticis curationibus firmata, in uulgus exposui. In quo gratiores aegris Medicina, quam celeritas ac facilitas famulatur officij. Qua de re est nobis de Capite, tanquam *ὑπερθε*, ad reliquam curam corporis descendendum, In quo quanto preciosior est sanitas, tanto est molestior aegritudo. Si quis igitur in sene, & quantulecunq; scientie medico, hanc simplicem curationis uiam, illaboratamq; miratur, nouerit me in utroq; genere facere, quam docere potius elegisse.

☞

De infectionibus CAPILLORUM.

Caput I.

AD DENIGRATIONEM Capillorum. Spumae argenti, terre cimoleae, calcis uiuae, sing. semiuncia, trita cum aqua. Identidem conteri facies usq; in pinguedinem mellis, & capillos linies. Linimentum uero cum siccare coeperit, loca fricando discuties, & lauibis ex pulsa in qua terram cimoliam tritam commiscueris. Ne autem ustionem incurras, procura frequenter, ut quum lauare coeperis, loca ipsa oleo roseo irrigentur. Ferri purgatione, & rasuram plumbi uncias senas, in sextarijs tribus acetum uiscidi coques, ut ad medietatem coctura perueniat. De hac coctione frequenter loca lauabis, et oleo anethino continges. Ciconiarum oua in uas plumbeum adijcies, & agitabis: ex hoc capillos unges. Cum uero linimento siccauerint, ex aqua in qua betae decoctione fuerint tepida, delauabis. Aliud, Capparis radicem confringes, & tribus diebus in lacte infundis asinae: post uero coques molli uapore, usq; in mediam partem, & frequenter loca confrices. Fungos arboris nucis conburi facies, ut carbo fiant: postea uero teras, mixto oleo quoad libererit. Hoc utaris unguento diurno, ut ulterius albi non nascantur. Betarum rubearum cum radicibus suis libram. i. teras cum ammoniaci salis uncias ii. & admisces olei cedrini uncias. iii. ut confectio siccare non possit, & uiteris. Flauos uero Capillos si facere uelis, lupinos amaros in aqua per dies. xii. infundes: & postea ex hac aqua in balneis caput assidue lauabis. Alumen, quo infectores utuntur, cum aqua conteris, & capillos ex his infundito: quod permanere facies diebus tribus: postea lauabis ex aqua in qua nitrum resolveris. Sane si tibi multum rubri uisi fuerint, ex ea aqua lauabis in qua cimoliam terram resolveris. Si candidare autem uelis, hyrundinum stercus, cum felle taurino contrita, loca continges frequenter. Sed haec superflue nos ordinare, certissimum est. Ceterum albi

In hunc fere modum de scientia Medicinae Cor. Celsus disserit in praefatione operis sui.

Ne crines albescant.

Ad Capillos flauos.

Abli capilli.

prohibendi sunt potius q̄ procurandi. Sanē si crispāre intēdis, Asphor
deli radices in uino teris, & ex hoc frequenter infundis.

¶ De CAPILLIS cadentibus. Caput II.

INSTRVAM etiam de Capillis cadentibus, qui aut longa æ
gritudine, aut abundantia uaporis eadentes, ante senilem ætatem
nudare caput consueuerunt. Ordinamus itaq; confectionis genus, quo
non solum cadentes retineri, possideriue possint, sed etiam forte qui ces
siderint, reparentur. Accipies q̄ plurimas Napas, & in uase fictili clau
sas incendes: & postea cum oleo conteres, & caput illinies: sane sollici
tus, ne frontem tangas, ob tumores emergētes: licet falso tumore terrea
ris. Melanthion super carbones cum torrueris, teres, & cribrabis, &
cum aqua commixto, caput illinies. Hoc & alios innasci faciet q̄ maxi
me. Si supercilia curare uelis, Ladanum cum uino teri facies, & oleum
myrteum admiscebis, & uteris ut pinguisimo liuimento. Nuces uiri
des immaturas quassabis, & eas in oleo fremiali infundes, & aluminis
humecti tertiam partem, & in uase fictili nouo repones diebus. 30. in
subdiuali: & post uteris unguento probato. Nigræ myrti folior ūn
cia. I. gallarum quassatarum unc. II. similiter in oleo infundis ut supra,
& uteris. Hoc etiam supercilijs utile est quod Græci *ὑπερλιν* appellant,
Herbam Peristereon cum radicibus suis siccatas teris, & cribras, & o
leo cōmises, et uteris. De experimentis. Adeps ursinus, cum ladano
& adiantho subactus, illitusq; capillos effluere non patitur. Et sandara
ca cum aceto contrita, idem facit. Capita muscarum cum melle contri
ta, par beneficium faciunt in continendo capillo, ut capilli etiam post
combustionē exeant, si fieri uelis. Ficus folia sicca tundis, & cribrellas,
et ex eo puluere loca confricas, aut cum aqua dulci decocta proderunt.
Alcyonij radices combures, & teris similiter, & præuaporatis locis a
sperges. Sed quoniā aliquando supercilia, uitio imminētis elephan
tiæ, aut siccitate nimia corporis cadunt, ut in capite sæpe contingit, hi sic
constringendi erunt. Cedrinū militrum combures, & eius nidoris pul
uerem colligis. Vnde hoc supercilia tangere debebis.

Ut crines
crescant.

Ad Super
cilia.

B
Ne Capilli
cadant.

Contra Su
perciliorum
casum.

¶ De cremenis Capillorum. Caput III.

ALIVD generaliter omnibus ad capillorum cremenia. Poly
trichi herbæ radices pondo duo, flores eius pondo. II. cedrini
olei pondo. I. II. oua gallinarū. x. olei hispani pondo. xxx. gallarum
pondo. I. II. Radices herbarum in aqua infundes, Flores uero supradic
tos in sole siccare facies, Oleum uero utrūq; in uas mundū mittis cum
ouis, & cæteris speciebus, & agitas q̄ diu, uel uī calefactum proprium
odorem exhalet, & similiter quotidie agitas diebus octo. Postea uteris
unguento. Attamen gallico sapone caput lauabis. Aliqui uero consul
tius agentes, post capitis loturā hac usi sunt unctione. Olei cedrini pon

C do. II. uini libra, ouis. III. Nardini olei pondo. V. commiscebis. His omnibus mixtis, & agitatis.

C ¶ Ad defectionem CAPILLORUM, quibus aegritudine proluxa carere saepe contingit. Cap. IIII.
CORIANDRI seminis uncias. XL. cymini anatolici uncia. I. herbae peristerei uncia. I. Omnia infundes in olei myrtei, & uini cretici sextarijs. II. Et post tertium diem molli uapore coques usque dum materia consumatur, et ita uteris. Adipis ursini uncias. II. ueretri asini combusti uncias. II. polytrichi unciam. I. polygoni uncias. IIII. myrtei olei pondo II. Omnia tusa, & cribellata, commisces, & uteris pilulatro. Capillos locis proprijs defugabis, si uespertilionum cerebra lacte muliebri contrita commisceas, & adhibeas. Aut si marrubij succo lac asinae commisceas, & similiter loca contingas. Hoc & tunni piscis fel, ladanij lachryma commixtum facit. Et si leporis sanguine recenti loca contingas. Sandaraca, & hyoscyami succo æquis ponderibus mixtis, loca continges, & capilli cadent, nunquam ulterius exituri. Cicutæ herbae succum cum aqua diligenter contritum, euulsis ex oculis pilis, adhibeo diebus tribus, & ulterius non nascentur. Cimicis sanguine quæ maxime mulieribus loca continges. Vespertiliones quæ plures uiuos accipias, & eos in uas cum cedria infundas, quoad illo tempore putrescere possint, & ex eo loca contingas quæ a capillis semper immunia esse uoueris. Agrestis urticae semine cum oleo contrito, loca continge. Pini arboris comas accipies, & cum melle conteres, & repones. Cum uero uti uelle coeperis, loca confricabis.

D ¶ De PEDICULOSIS Caput. IIII.
STAPHIS Agriae uncias. II. sandaracæ uncia. I. cum oleo, & aceto postquam contriueris, omne corpus perungendum est. Sic garasteros, & nitrum, & oleum facit. Folia tamarisci in aqua bulliant, & ex ea decoctione fricentur. Et aliud. Postquam capillos abstuleris, aut melle, aut cedria loca continge. Lupinos amaros in aqua infundes per plenum diem: alia uero sequenti coqui facias, & ex ea decoctione loca frequenter delauabis. Hoc pyretri, & gallarum puluis ex æquo commixtus, in balneis adhibitus, facit. Post hunc uero puluerem, succo betarum loca lauabis. Staphisagriam tundes, & oui album admiscebis, & commixtione loca fricabis.

¶ De ACORIS. Caput V.

Acoræ.

Ceriones.

A CORAS, papillas dicimus, quæ per cauernas breuissimas humorum pinguium mittunt. Hæ frequenter in capite, uel facie, & ceteris membris emergunt. Quibus & ceteræ papillæ sunt similes, quas Ceriones appellamus. Sed & distant: quia Ceriones plures cauernas egestionis habent, & humorum multo pinguiorem emittunt: Acora autem unam cauernam habet, & humorum egerit aquatiorum. Est namque utriusque causa una, uitionis nascendi necessitas. Quæ cum se plenam monstrauerint, ordine tali curandæ erunt. Primo purgatione totius corporis uti conueniet: ut origo

quæ hæc effecerat, egerat: Purgatione inq̃ tali. Scāmoniam, aloë, colocynthida æquis ponderibus contritas, succo cauliculorū temperamus, & catapotia in modū erui grani conficimus. De quibus erit nobis plena datio grana. VII. Secundę. V. & ut se ratio ætatis, & causssæ qualitas attulerit. Incipientibus uero caussis, etiā solā unguentorū frequenter beneficium suffecerunt. Terra cymolia cum aceto contrita, seu creta argenteria similiter. Sic pompholix cum aceto adhibetur: sic spuma argenti: sic chartę cōbustę cinis cum aceto medebitur. Quibus uero hæc uulneratio obuenerit cum dolore, Primo ex aqua calida fouendi sunt, in qua decocta sint aut rubus, aut sparagiradix, aut * saluæ. oliā. Hoc & lenticula cocta, & cum melle contrita curare consueuit. Ante tamen lauanda loca erunt succo betarū mixtis fenigreci pollinibus. Pini corticis combusti cinis mixtus cerotario, & oleo roseo adhibetur. Sic et cadmia, sic & cerussa, sic & spuma argenti adhibetur in balneis. Certū est namq̃, in foeminis cauendam esse aceti adhibitionē. Vnde magis eis uino omnia medicamenta tēperanda erunt. Item mirū combustum uino stiptico extinguis, & contritū in balneis adhibebis. Similiter & mirobalanū oleo coniungas. Quod apud Apolloniū probatū esse cognouimus. Aliud. Olei rosei, uel myrtēi uncia mittes in mortariū plumbeum. Accipies etiā pistillum eiusdem metalli, & teris quādiu oleum pinguescat & nigrescat. Item in aliud mortariū cuiuslibet metalli, mittes spumę argenti libram unā, tantundē ex cerussa, & eorū puluerem combures cum oleo supradicto. Ex hoc omnes acoras ubi fuerint linimēto curabis. Hoc medicamentum & in papulis, & in pudendis ragadijs, uel cōdilomatibus, quæ semper pro loci natura acrioribus medicaminibus cōmouentur etiā prodest. Apud aliquos hoc genus medicamenti Ricotia appellatur. Aliud Rutatum. Spumę argenti ÷ V III. rutę uiridis foliorum ÷ V. olei myrtēi ÷ V III. acori libram unam, misces omnia contrita diligenter, & loca fricando curabis. Prius succo betarum similiter ut superius, loca lauanda sunt. Cerussę ÷ III. spumę argenti ÷ II. olei myrtēi. IIII. sulphuris uini ÷ I. soluta cōmises, & simili modo uteris non solum hoc capiti, uel quoquo loco emergentibus exanthematibus prodest. Apolloniū iudicio comprobatur.

Alias * salicis

Apolloniū experimentum.

Ricotia.

C De ALOPETIOSIS. Caput VI.
CONTINGIT dupliciter passio cadentium Capillorū: ut aliquando defectu quodam cadant, & nudando partem capitis turpent: & aliquoties, ut illis ueluti uulnerū horridus plærūq̃ uisus occurrat. Ergo defectus ut prius diximus, quū contigerit, caluiciem facit. At foeditas illa, nexu uulpini uulneris similitudinē quandā exhibet: deinde etiā serpentis squāmosi superficiem mētatur. Vtrūq̃ genus passionis foeditatem exhibet capillorū. Sane hæc passio cōparanda est frus-

Cūbus ex malis succis terræ nascentibus. Hinc caussa aliquando esse poterit, qualitas nutrimenti: & si forte sterilis terra fuerit, fructus cum raritate degenerat: sin uero humor corruptus, etiam fruges degenerant. Ad hanc ergo formam, etiam in Capillorum uitij debemus aduertere. Talis enim erit eorum positio, qualem qualitas ostenderit capitis. Est ergo utriusque accedentibus uitij, manifesta & æqualis origo nascendi, unde simili curatione iuuari debebunt, licet diuersa cognomenta sortita sint pro sui accidentis qualitate: ut Alopetia ex cognomento uulpi-
um, *ἀλοπίαια*, ex serpentium squammis cognomentū accaperit. Est namque huius passionis distantia, quæ profectio ex humorum colore originem caussarum attestatur: ut aliquando rubra, aliquando etiam nigra uideatur. Purgantur adeo proprijs purgationibus suis. Nam suadeo propriam totius corporis curam & diligentiam decernendam, quoad ulterius acerbi & corrupti humoris pertinaciam, per inferiora depositam, a capitis hactenus in quietudine deuocemus. Sūt itaque, si de flegmate caussa uel origo peruenierit, apoplegmatisimi adhibendi tales. Pyretrum, & staphisagria, cum granis mastiches, æqualibus ponderibus mixta, & confusa adhibeantur, & sales cum pulegio cōtriti similiter, & cum oxymelle mixti sint, ut diutius teneantur. Ergo quoniā singula accidentia proprijs suis purgationibus liberātur, superaddo purgationis genus, quod in commune sine alterius humoris præiudicio operetur: quo omne corpus diuersis humoribus infestatum releuari possit. Colocynthidos interiorum ÷ I. aloes ÷ I. scammoniae ÷ I. absinthij ÷ I. omnibus contritis & mixtis cum succo cytoniorum catapotia conficimus, quæ pro qualitate corporis atque caussarum adhibeo. Accipi autem debebunt, si breui accidit in modum lentis, aut. VII. aut. IX. aut certe. XI. Si autem in anu, aut homine uetusto fuerit, maior cura exigitur, unde cum aqua calida competenti, intermissis etiam diebus dabo quod post ordinabitur. Post beneficia itaque harum purgationū, quæ toto corpori prodesse prius potuerāt, etiam particulis, hæc sunt adiutoria socianda. Euforbiū tritum cum oleo pro linimento adhibemus, aut oleum solum laurinum, aut nasturtij semen cum oleo, aut sulphur uiuum cum nitro combustum, æquis ponderibus cum aceto, aut eruce semine cum oleo, aut urfinis adipibus tantummodo confrixetur. Similiter etiam alcyonium combustum cum aceto, uel cedria, operabitur. Hoc etiam murium fimus cū aceto, hoc amygdala amara, hoc cepe tritū cum oleo, hoc raphani cortex cū melle contrita facit. Nam etiam ferri purgatio cum aceto, uel hordeum combustum cum muriū fimo, & aceto siccare potest. Omnes confectiōes quæ mediocriter calefacere possunt, mediocribus & deliciarioribus corporibus adhibendæ sunt. Prius ergo loca lineteolo usque ad ruborem, ante curam confricentur mediocriter, ne uulnerentur. Quæ si uulnerabunt, oleo roseo, uel adipibus anserinis recuranda erūt.

Alopetia,
ἀλοπίαια

Apoplegmatisimi.

De A V R I V M caussatione. Caput VII.

A V R I V M dolor varijs frequenter ex incommodis excitatur. Nam & frigora, & lauacrum importunū, & quassatio eiusdem cavernæ, uel sordium conspiratio, aut altior nerui tactus, aut si per longam ægritudinem humor uitiosus illic aggregatur, æque molestiam auri- bus faciunt. Si de frigoribus etiā dolētibz emerferit, in oleo cepas coqui facias tepido, aut piper tritū cum oleo, similiter & rutaceum. Sic etiā laurinū curat. Si de humore balnearum aures fuerint inquietæ, oleum tepidum infundito, & postea lana mollito. Sed & cepearum succum, cum anserinis adipibus mixtū: similiter initio, & oui alborem cum lacte mulieris. Et si dolor innatus fuerit, basilicon in uardino oleo solutum adhibeo, & castoreum cum lacte muliebri similiter. Vtile est interea, ut sponsia molli uaporetur ex aquis calasticis: & post lana detergatur. Sane si cum illa indignatione doloris etiā deriuatio fuerit: saniosa, alumen melle & oleo resolutum infundito. Et galbanum in oleo similiter resolutum inijcito. Ventositas uero si interclusa erit, aphronitris in aceto resolutis excluditur. Hoc & dracontæ herbæ succus, & centaureæ facit. Si uero sonare aures ceperint, oxyrhodone tepido curandæ erunt. Si autem idem ex ægritudine sonitus obuenerit, ex aqua primo uaporibus aures in qua absinthium ponticum coques, & continuo oxyrhodonem infundis, aut raphanorum succum cum oleo, aut hellebori nigri puluerē cum aceto, aut solum acetum tepidum cum melle commixtum: aut porri succum cum lacte muliebri, & oleo roseo, aut amygdala amara cum aceto & oleo. Hoc & cepæ, & allium cum adipibus, uel porci felle infusum remedium procurabit. Si uulneratæ aures fuerint, glaucium, cum aceto contritum infunde. Si tamen dolor non maior fiat, uel etiā humor, lamina ferri purgati cum aceto trita iuuat. Si audire tardius ceperint, quod difficile nouimus purgari posse, puluerem nitri marini contriti commisce, & antea caput purgabis. Deinde uentrem purgatione procurabis. Auribus uero absinthij herbæ decoctionem tepesactam infunde. Lauri quoq; folia, & betarum cocta superpone. Aliquando nitrum in pusca resolutum infundimus, aut bouis, uel tauri, aut caprarū, siue porcorum fel, cum oleo roseo, uel raphanorū succo, similiter tepesactū profuit. Quibus uermes innati fuerint, bouillas carnes in carbonibus superpone, aut humorem ex hinc manantē collige, quem auribus tepidum frequenter infundes.

De P A R O T I D I S. Caput VIII.

T V M O R E S repētinis sub auribus innatos, Parotidas uocamus: quas aliquando ex ægritudine, aliquando etiā spontaneæ apparuisse cognouimus. Easdem frequenter per initia mollientes sponsia in puscula infusa compescimus, assidue cōmotando. Quæ uero ex ægritudine emergūt, æque per initia, cucurbita mediocris imposita, ad su-

A

Ex frigore.

Ex balneo in-
ordinato.Innatus do-
lor aurium.

Sanie fluētes,

Ventositas
aurium.Ex ægritu-
dine.

B

Aures uul-
neratæ.Vermes in
auribus.

Parotidæ.

C perficiē prouocāda sunt. Si uero cū grauiori augmēto minaces accesserint, tūc neq; cucurbite, neq; similia adiutoria quę ex altitudine aliqd euocare possint, adhibenda sunt. Frequēter em̄ ex doloris acerbitate, febres, et uigilię pcuratę, eliminatis uiribus uitę periculū intulerūt. Paragoricis uero iisdem adiutorijs, sic morigerandū erit, ut ex pane mundo, infuso, contritoq; cataplasmentur: quod frequentius mutari debet. Similiter etiam de tritici pollinibus faciendum est sic de hordei, super additis tamen porcorū adipibus. Sic oryza mutata cum butyro. Si aut ijs adhibitis quę mitigare consueuerunt, locis iam maturatis sanies apparuerit manifesta (quod ille ait) continuo culpā ferro compesce. Post uero refecatis caussis, uulneribus solenni diligentia seruiemus, curationibus tamen euacuaturis, & extenuantibus. Ad hoc maxime etiā tunc medicinę incumbat industria: ut frequentibus etiam fomētationibus, doloris illis penitus inquietudo quiescat. Sunt autē adiutoria hęc, quę post doloris impetus adhibenda sunt. Arnoglossa cōtrita, cum salibus, aut lapatiј radicibus in uino decoctis, & rutę folia uiridia, trita, ac mixta cum cerotario, & oleo roseo temperata, & sulphur uiuū cum cymolia, æquis ponderibus, iuncta axungia. Sic fici pingues decocti & contriti, similiter caussas lātes euocauerūt, quibus in principio hęc adhibenda sunt adiutoria, qñ per saniem digestionē uolumus pcurari, post fomentū aquarū calasticarū ex seminibus lini, uel fenogreci, et hordei pollinibus cū mellicrato facto cataplasmate seruiemus. Sūt nāq; adiutoria quę & euocare, & ad maturitatē cogere parotidas uel apostemata ualeant. Hordei farina cū mellicrato, aliqñ etiā cum aqua marina, & oleo roseo temperatū cataplasma adhibet. Et fici similiter pingues, in muria, uel in aqua marina decocti, & contriti imponunt. Et betę coctę in aqua, & contritę similiter temperant, & agrestis cucumeris radix, in mellicrato cocta & contrita adhibet. Aliud de exprimentis. Rutā, & hyssopum teris æquis ponderibus: & ficus siccos contusos sub duplo pondere cōmises, mellis quippiā adijciendo, id ipsum operabit, ut apostema ex interioribus ad maturitatē procuret. Aliud. Capparidis corticē in aqua elixa, et cū uino cōmises, & cataplasma facis. Aliud. Iriōs illyricę puluerē, cum hordei farina in mellicrato coques, & uteris. Aliud. Guttā ammoniacā teres, & similiter cū farina hordei in aqua cocta adhibebis. Hoc & alumen, scissum, contusum, cum hordei farina faciet.

Maturatiua.

Cura Furunculorum.

S De FURVNCULIS. Caput IX.
SULPHUR uiuū, tustum, cum resina terebinthina misces, & in lineo lintheolo inductū imponis, aut uuam passam enucleatā tundis, & mediā quantitātē salis imises, & uteris. Similiter ut facilius erumpant, soli adipēs caprini, uel bubuli colati efficiunt. Origanū uero, myrrha, & sal simul tusa, & cōmixta cum aqua, continuo ad maturitatē perducunt. Et caricę contusę cum resina. Deinde cū hijs adiutorijs adhi-

bitis collectiones maturatæ eruperint, uulneribus medeberis his medicamentis, quæ solennis edocuit consuetudo. Sin uero magno flegmate superueniente, solui non potuerit Furunculus, uel Parotida, sed callositate permanente, choeradas fecerit, ad duriores choeradas, alia disputatione, pro sui difficultate, curâ & operam adhibebimus. Choeradas quas frequenter in collo, uel sub mēto, uel sub ascellis nasci nouimus, hac cura uisitamus, qua duricies indigestibiles soluere possimus: ut prægratibus catholicis adiutorijs, quæ & capitis reuma constringere, et corpus reliquū catharticis purgare possint, sic easdē soluere ualeamus. Lentissimā coctam in aceto tritam, imponere perseueremus. Utamur etiā capris ficis in aqua decoctis, & cōtritīs. Similiter etiā lupini in aceto cocti faciunt. Hoc fici folia in aqua cocta, & trita sicut cataplasma. Hoc asphodeli radices in uino tinctæ. Scylla quoque, si contrita in uicem cataplasmatibus imponatur, quatuor diebus permanēs continuīs, duricias soluit. Et erui puluis, cū aceto, & cyminiū conterit, & similiter operat. Imaturas uero, & in tarda duricie permanētes, per prassij uiridis folia, porcinos, aut bubulos adipes, rutam æque uiridem, simul oīa contūdi, et inmisci suas deo, ut in lintheolo locis maturandis adhibeat. Hoc etiā sordes de parietibus palestræ collectæ, in panno inductæ faciūt. Hoc calcis flos, cerotario mixtus, facit. Hoc lapis molaris tusus, & resinæ cōmixtus. Sic puluis ammoniaci, et manna thuris cū resina cōmixtus terebīthina, saniem maturius procurabit. Sic sandaracæ puluerē, cum adipibus miscentes adhibemus, aut calcem uiuā cum adipibus similiter. Quod si tibi durum emplastrū uisum fuerit, oleum competens misceamus, ut temperari bene possit. Sic puluis etiā purnicis, & asphodeli radices coctæ, uel crudæ, cum hordei pollinibus, ut cataplasma adhibendæ erunt, aut hyoscyami folia cum oxymelle, corrumpunt interea, uel putrefaciunt chæradas. Si allium tritū cum cataplasmate, seminibus mixtū coquas, & perseuerare permittas diebus quinque, hoc de expertis habemus. Aut si chameleontis herbæ radicibus tuis, puluerem locis asperis, aut si betas coctas cum oleo contritas imposueris. Aliqui etiā unctionibus perseuerantes, choeradas frequenter fugarunt, sic ut cineribus aut uitium, aut ficis cum oleo mixtis ungerent. Sed & ferri, uel graminis purgamēta, contrita cum oleo, similiter & stercus bubulum, aut asini combustum, & cum oleo mixtum, commodius adhibetur. Et origani puluis cōtritrus cum aceto idem facit. Hoc hyssopi, hoc thymi, uel absynthij, uel centaureg, uel abrotani, chameleæ, aut singule, aut certę coniunctæ, & mixtæ cum aceto, perficiunt. Iuuant sane, ut superius memorauimus, ad hæc implenda, etiā totius corporis catholica beneficia. Nam & ciborum continentia, & portiois, exercitia quoque, & lauacrorum diligentie, & uomitus, uel purgationes, capillorum releuatio, sanguis de naribus prouocatus, hæc omnia choeradas duras, & difficiles, & in cura positas, adiuuerunt.

Choeradarum cura.

B

C De OCULORVM caussis. Caput x.

OMNES particulæ corporis, proprijs indigent curationibus. Oculi aut curationes multæ, magnæq; sunt. Hîj nanq; quum primo leuiter, seu uapore, seu frigore, uel cæteris qbusuis originibus fuerint attentati, frequenter frigidæ pustulæ, fomêtatione nos cõuenit obuiare. Si de frigore ergo obuenerit, uini mixti calida portione fouendi sunt. Quibus uero, cõmotionibus tã doloris, q̃ grauedinis, aliqn etiam uenæ frontis inflatq; plenitudinẽ sanguinis attestabunt, hîjs phlobotomo subuenire cõuenit: si tñ nulla aut ætatis, aut tẽporis, uel reliquarum causarum certa ratio prohibuerit. Si uenter constrictus fuerit, clystere, seu purgatione prouocandus est. Iisdem uero oculis impatienter dolentibus, fenogreci succus, palmarũ indulcatus decoctione, aut oui recentis tenuis liquor infundatur. Similiter etiam lac muliebre iuuat. Est etiam cataplasmatidis utilissimũ adiutorium, quod de oui uitello, & melililoti puluere, pane quoq; infuso in aqua, & oleo roseo, simul mixto, adhibetur. Nos etiam croci, & opij quippiam coniungimus. Si uero collyrij experimento uti placet, cuius probationem habeas, in ipsis cõmotionibus, cum oui albore tepidum infundendum esse suadeo: ita tamen, ut aut dialibanum, aut de libano, apto contra graues cõmotiones adhibeamus, præmundatis interea oculis, molli & tepido penicillo, a pituitis ægrotis oculis inhærentibus, iuuatis ciborum continentia, & uini detractioe. Sane si capilli nimis onerosi fuerint, detondendi sunt: ut sub maiori beneficio, cucurbitarum adhibitione, & sanguinis detractioe liberentur. Aestiuas namq; perturbationes oculorum, etiam decoctio rosarum sola curat calida. Curat etiam gargarisma, cum per initia adhibetur, Origani in aceto decoctio. Si autem declinantibus quidam tumor circa interiorem oculorum partem apparuerit, quem hypopium dicimus, hoc modo reprimendus erit. Pusca frigida frequenter infrigidetur: post uero pollinibus hordei ex oxymelle coctis cataplasmetur. Similiter etiam de lenticulæ pollinibus fiat. Aeris flos, tritus in lotio inuestis pueri per. VII. dies, quod postq; siccauerit, ex eo puluere melle mixto imposito, competens beneficium præstat. Nam & caesus recens, tritus, & impositus, sæpe illum tumorem repressit, & absynthij herbæ puluis, cum cerotario, hoc idem facit. Si ex moro pingui lotum primo foueamus, etiam cyclaminum, cum uua passa cõmixtum, & contritum, curat. Et bulbi candidi cum melle contriti, similiter operantur. Sic raphanorum cortex cum uua passa medetur. Sic & rosæ folia, cum felle taurino, uel porcino. Sic fici pingues, in moro coctæ sæpius profuerunt. Ad repentinas autem sanguineas maculas oculis inhærentes, flores, uel semen hyssopi herbæ, in limpido lintheo colligabis, & in aqua calida infundis, & agitando exiccabis: qui succus uelut sanguineus fiet, Ex quo, infundẽdo, illas sanguineas maculas

A frigida
caussa.

Ad maculas
sanguineas.

depurgamus. Postea thure masculino, & aphita æquis pōderibus, carbonibus impositis, fumigandi sunt. Si uero cæsi, aut percussi hanc maculā anguinēam cum dolore procurarint, hijs columbi matre subducti, repentinus sanguis infusus prodest q̄maxime, si de pennis mollioribus exprimatur: ubi liquor tenuis, tepidus infundendus est. Item si in eadem hora, ouium lana infusa superponatur. Idem puluis rosarum facit, uel semen earum cum aphitis, si in uino cōteratur, & superimponatur. His etiam & sulphuris uiui fumigium prodest, si idem fumus patentibus oculis hauriatur. Si oculi reumatizauerint, quod grauissimum est tædium oculorum, hijs uini & carniū paritas indicenda est. Ventris purgatio frequenter fiat, & pusca frigida oculi foueantur, & æris flos in eadem pusca resolutus, satis iuuat. Odores acres & putentes effugiant lucernarum, uel solis claritudines uitent. Fumi, uel pulueris declinent cōmotiones. In nocte uero aqua frigida, uel uino infusas superimponis fasciolas molles, ijsq; cōtinendo oculos lauas. Si his adhibitis, reuma cum dolore perfeuerauerit, phlobotomandi sunt. Ciborum, uel potus continētia custodienda erit. Sitire eteī omnib. reumatizantibus satis prodest. Fronti uero peponum uiridia folia frequenter imponentur. Similiter & de rapi folijs. Nā & succus earum frequenter fronti illinitus, & sambuci folia, & citoniorū, & portulacæ similiter, & ex his cum aphitis & uini cataplasmate sēpe curati sunt. Et caseus recens, cum apiorum folijs contritis impositis, sēpe oculos liberauit: & panis mundus uino infusus, & cum oleo roseo tritus, par beneficium pręstitit. Omnes species supradictę generaliter quę oculis reumatizantibus ordinatę sunt, cum uino & aphitis semper in cataplasmate profuerūt, & decoctiones earū: quibus sēpe oculi fomentandi sunt, Sane si calidus fuerit reumatismus, ex caulium folijs & aphitis, cum aqua cataplasmandi sunt. Sic de ocimo, sic de samfuco, sic de agresti papauere, sic de cicutę succo, sic pulicarię, uel apiorum, uel strychni. Si uero siccitas palpebrarū emerferit, lintheolum mundum butyro infusum superimponito. Aliquibus uero humorem conuenit procurare per lachrymas equas aut fumo, aut terrore, uel plagis extorquendas esse credimus. Sane si in prima oculi tunica sanguinea, nimia ueluti caro apparuerit, quam Chēmefin appellamus, hoc adiutorio curatur. Muscas q̄ plurimas, cum oui uitello cōterimus, & in lintheolo mundo superimponimus. Licet etiam collyrijs uarijs causę competentibus sēpe curati sint. Derbiosos oculos, quos nos impetiginosos dicimus, asperitatum uitijs laborantes, sic curare cōsueuimus. Alitum accipimus, cuius interioribus melle contritis, oculis postquā ex eo humore, uel succo rapuerit inungito: & ex eo pruritus & supradicta uitia depurgabis. Aliud. Grana tritici, in lamina ferri calida imponis, & similiter ex succo qui manauerit, cum uino commixto, inungito. Aeris flos tritus cum melle, fronti illitus, iuuat. Si pruritus maior palpebras

A

Ad Oculos
reumatizantes

B

Reumatismus
calidus.

Siccus

Cura Chēmefin.

Ad oculos
Derbiosos.

C occupauerit, ut etiam capillos amittant, has oportet ex oleo cedrino un-
gere, aut erugine, cum afronitis, & melle contritis, aut asphodeli succo
cum passo cōmixto. Nam & murica decocta, & mixta cum oleo, adusti-
onem curat, & capillos reparat: & murium fimus, et hircorum cornua,
utraq; combusta, cum melle, & eodem modo adhibita. Si pruritus sim-
pliciter ex sole, uel puluere fuerit, aquæ calidæ fomenta sufficient, aut ro-
sarum, aut rubi, aut lentis decoctio. Et rosa sicca, cum uino trito imponi-
tur, & in nocte oleo simplici loca tangunt, Caligantes uero oculos hoc
modo curamus, si uulneris aliquid non interfuerit præiudicium. Herbe
paritariae succum, bitumine iudaico trito, æquis ponderibus miscemus,
oculos inungentes, Et perdicum fel similiter facit. Et marrubij succus,
cum felle taurino, & melle attico, æquis ponderibus cōmixtus ita curat.
Et ursinum fel, cum aquæ dupla mensura, similiter purgat. Si autem ob-
scuritas hæc senectutis magis q̃ oculorum uitium fuerit, succū maligna-
nati, melli attico æqua mensura cōmiscet, & uteris. uetustatum tamē ma-
gis operabitur: sane si q̃ plurimo tempore uas sub diuo facias permane-
re. Hoc etiā scriptoribus & pictoribus sepe profuit. Aliud. In oleo mū-
do folia marrubij miscemus: & quū tempore illic macerauerint, proie-
ctis folijs, ex solo oleo obscuritates expellimus. Hoc beluæ fel mixtū mel-
li facit. Hoc succus rutæ cum melle similiter. Nam & chelidoniæ succus,
& feniculi, lactuæ quoq; agrestis, & mellitoti, cum aquæ mensura, cali-
gines & obscuritates, aliquando etiā suffusiones liberauerunt. Et tau-
rinum fel mixtum melle, sic profuit. Nyctilopes uero qui per noctē ui-
dent, & per diem obscuritatem patiuntur, sic curandi sunt. Accipies hir-
ci iecur, et scarificabitur: humor uero qui ex scissuris emanauerit, oculis
diebus duodecim infundendus est, & uitium corrigitur. Aut idipsum
iecur in carbonibus ponitur: quumq; exudauerit, de eodem humore in-
ungendi sunt. Hoc item iecur coctum etiā inter cibos accipiunt comedē-
dum. Et columbi sanguis infusus oculis, iuuat: & fimi asinini recens suc-
cus proderit. Alboribus uero oculorū, nitrū bene tritū cum oleo
infundēdum est, aut anethi semen cum aqua tritum. Et succus cucume-
ris dulcis. Et raphanorū succus sic medetur: & ammoniaci cum aqua
contrita. Nam & lactanti suo mater guttam ammoniaci mastigando, &
exhalando, albore oculi, similiter & albas maculas filij, sanguinem fe-
moris sui infundendo, sæpius permundauit. Glaucos uero oculos si de-
nigrare uolueris, sic facies. Gallarū puluerem tenuissimum, cum aqua
bene coctum misces, & leporis fel, mixtum melle, glaucos oculos reno-
uat in naturam. Si hordeoli in palpebris nascantur, hordei decoctione
calida oculos fomentabis, & post cera liquefacta locum tangis. Et si mu-
scarum capitibus locum confricas, hoc idem facit. Capillos uero con-
trarios sic non nasci facies: si his euulsis, loca sanguine cimicis tangas: &
fanguisugarum combustarum cinis locis appositus, eodem modo cura-

Ad oculos ca-
ligantes.

Cura Nycti-
lopum.

Ad oculorū
Alboras.

Glauci oculi,
ut nigrescant.

Ad Hordeo-
los palpebra-
rum.

bit. Et chamæleontis herbæ folia sicca trita in puluerem, & commixta sanguine ranarum uiridium. Post unctionem Capillorum pro collyrio inungimus, fel uulpis solum similiter. Staphilomata uero, hoc est, quum in modum uuæ crepantis, prioris tunicæ tumor quidam erumpit, sic curabis. Alumen scissum teri facies diligenter, & adipēs anserinos admiscēs, & uteris pro collyrio. Nam & mellis commixti adipēs, supradicta Staphilomata diligenter curant. Et soli adipēs bene colati, sufficient.

A

Staphilomata.

O De NARIVM morbis. Caput XI.
ZENIS, & Polypis, uno eodemq; modo cura est adhibenda. Constringendus in primis est de tonsis capillis reumatismus. Post rasuram uero emplastrum Diatheon, aut Barbarum. Et de cocleis simile est adiutorium. Accipis cocleas minutas, albas numero ducenas, intritas, admiscēs myrrhæ, & thuris masculi uncias singulas, pro cataplasmate raso capiti diebus nouem permanfurum. Naribus uero specialiter sic medeberis. Succum nepitæ frequenter infunde, aut eiusdem siccata & contusa puluerem; per cannalem exufflato: aut batrachij herbæ succum, cum melle commixtum. Et succus rosarum, contusus cum pinguedine, item prodest. Sic Irios illyricæ, & Sandaracæ pulueres ex æquo cum melle commixtos adhibebis. Polypis itaq; eminentibus, æris florem, & synopidem ex æquo comburis, & ex eo puluere sanabis loca. Et cornu ceruini combusti puluis, cum sandaraca similiter spargendus est. Sic brioniæ herbæ radices combustæ, sic auripigmenti puluis cum melle. Ego uero sic e naribus polypos cecidisse probaui. Puluere ex calcite, admixto æris flore, æqua ponderatione cōfecto.

Zeni:
πολύπους.Emplastrum
Diatheoni.
Barbarum.

B

Expertum
Autoris.

P De fluxu sanguinis NARIVM. Caput XII.
PRIMVM instrato melle, in extremo baculo molli lana obuoluto glebas sanguinis e naribus purgare nos conuenit, post lana identidem obturando procludere. Aliud. Linteolo combusto, & infuso in aceto, aut in succo polygoni herbæ, aut cymæ, uel porri sectiui similiter. Si perseverauerit, sine mora sbotomandus erit, & fimi asini combusti puluere, cum oleo roseo mixto, collyria facta supponimus. Et de silique mollibus folijs contusis facta similiter collyria profuerunt. Sic portulacæ, sic strychni, sic terræ alexandrinæ cum succis supradictis puluis sepe profuit. Caput eorum succo lini seminis frigido fouendum est. Circa frontem uero gipsum cum ouo, uel luto figulorum similiter mixtum, inlinire debemus. Sic æris flos, * sic pini cortex combustus, sic fimi asini, ut supra significatum est. Si uero istis adhibitis adhuc perseverauerit fluxus, ignita cucurbita, si ex dextra nare manauerit, dextro lateri admouenda est: si ex sinistra, sinistro lateri: sin uero de utrisque, & utrisq; igneas cucurbitas applicabo. Aliqui uero fascioliis lineis natu-

* Alias cum
hoc habet. sic
mulin, uel
cycin.

b

Cram, & testes eorum aligando mollius constrinxerunt: si in sceminis, femoralia.

¶ De LABIIS crepitantibus. Caput XIII.

CALLÆ tunſæ puluerem, reſinæ terebinthinæ limpidæ admiſces, et uteris cum emplaſtro ueteri, ſeu hyſſopi ceroto, cum melle, aut adipibus caprarum colatis tantummodo. Aliud. Sulphur uiuum, morum, et thus maſculum, ex æquo ſucco herbe paritarię commiſces: & ſic trociſcos conficies, quos cum aqua reſolues, & linies. Aliud. Mel terebinthinū, adipem anſerinum, oleum roſeum, hæc omnia ex æquo mixta teris. Si odor inſuauiſ Oris fuerit, pulſa frigida oſ frequenter colluere oportet, & cymoliæ pulueribus, cum ſaliſbus toſtis, ſimul mixtis, & tuſis, dentes & uicina loca fricare. Aliud. Hordeum, & ſal, in lintheolo collectum comburis æquiſ ponderibus, & teris, & cum melle commiſces, & mundas. Siligo, cum illyricæ puluere ſimiliter commixta operabitur: Aliquoties etiam cum uino melius commiſcentur. Maſticare autem hiſ conueniet aut arboriſ pini folia molliora, aut anetum, aut glicirrhizan, aut herbam quæ Sonchora appellatur. Sed & cornu ceruini combuſti puluiſ, & ſcætoſem oriſ, & dentium ſemper compeſcuit imbecillitatem.

¶ De DENTIVM curationibꝯ.

Caput XIII.

DOLORES Dentium ſimus aſini ſiccatus, & trituſ, pro dentifricio, ſine dilatione compeſcit. Mixtuſ quoque cum aceto, ori diutius remorando, æque profuit. Et betarum ſuccuſ tepiduſ ſimiliter profuit. Et decoctio ex cucumeriſ agreſtiſ radice in uino, ſimiliter. Et nitruſ cum oleo trituſ, & decoctio roſarum in uino, uel rubi in aceto, & cypreſſorum fructuſ, tedæ pingueſ in uino decoctæ, ſine cunctatione Dentibuſ relaxatiſ atque dolentibuſ profuerunt. Si omneſ inter ea doluerint, cædriâ in ore teneat, & continuo mitigantur. Sin uero male dolent, herbæ paritariæ radiciſ ſuccuſ, in balneo ore continetur, & ſtatim medetur. aut ſi eiuſdem radix coquitur. Similiter & pyretri radix profuit maſticata continuo. Item alcyoniſ radix, in carbonibuſ poſita, Denteſ dolenteſ fumigando compeſcuit. Phyſicum. Caniſ dens combuſtuſ, ſimiliter profuit. Et ſi æriſ floreſ in oleo trituſ Dentibuſ admoueas, & lac aſinæ recenſ ac tepiduſ, conſtringit & mitigat. Similiter quibuſ putreſ cauernæ obuenerint, Melanthis um elixum in aceto commixtuſ, & ſi ſolo puluere aluminiſ ſciſſi eadeſ cauernas impleas. Hoc & gallarum puluiſ cum melle commixtuſ facit. Si uero percuſſuſ quideſ Dens, uel mola fuerit, reſolutuſ coralli puluerem apponito, & continuo conſtringitur. Si longo uitio laboranteſ, ſpontaneos cadere uolueriſ, pyretri, uel artemiſiæ pulueſ

Ad ſcætoſem
oriſ.

Si omneſ den
teſ doluerint.
Aut Malæ.

Denſ per
cuſſuſ.

rem, cum aceto commiscebis, & denti circumlinies, & spontanei exilient. Aut succo tithymali cauernam adimple, & spontanei cadent.

Physicum. Lacertum solum exseca, & sicca, & eius puluere dentem, uel cauernam attinge, & continuo cadet. Post scarificationem coccus gnidius tunsus, cum galbano, similiter operatur. Et apophlegmatismum hoc profuit. Si stafisagria ad mastiandum detur, aut si cum pulegio misceatur, aut cera cum gallarum puluere confusa, aut salicis, uel myrti folia uirida in aceto coquantur, & in ore contineantur. Post ea uero si nausea consequatur, oleum tepidum roseum in ore contineant, & origanum in oleo coque, et ex hoc dentes calefacito. Et sacculus calidus impositus de salibus, uel milio, forinsecus adhibitus, prodest. Omnia hæc calida, secundum Hippocratis præceptum, dentibus profuerunt. Nam & dentifricia hæc, & saluti, & ornatui; semper uitiolis dentibus profuere. Salibus melli commixtis, & combustis, & contritis, quippiam myrrhæ miscendum est, & utimur, ut moris est. Hoc & maratri puluis solius facit. Nam & lanæ succidæ combustæ pulueri, tertiam partem salium commiscemus, & utimur similiter. Post uero, uinum, in quo Irim Illyricam decoxeris, cum puluere conueniet: & Tithymalus in uino decoctus, multum proderit. Si ex hoc bis per mensem tepido collueris dentes, facies eos semper sine uitio permanere. Gingiuas uero cum gargarismate ex aceto tepido, in quo herbæ mercurialis radices decoxeris, sine mora mitigabis.

Ecce Auctore
Hippocrati
posteriorem.

De uitijs FAUCIVM, uel ORIS.

Caput XV.

PER INITIA cum commoueri aliquid in faucibus senseris, generaliter omnibus ex decoctione siccatarum rosarum, uel dactylorum elixorum, aut lentis, aut cantabri, uel cæterarum stipticarum mediocriter specierum, conuenit tepidum gargarisma: cui etiam mellis quippiam despumati commiscemus. Nam & lac ouillum, uel caprinum, cum melle tepidum iuuat. Similiter rhodomel, similiter diamorron. Quod sic conficere consueuimus: ut ad duas partes succi mororum, una mellis adhibeatur. Sic etiam aliquid ex succo rubi & melle, ueluti diamorron confecerunt. Alij etiam de citoniorum succo eadem asserunt. Item de malo granato, sed stiptico. Alij uero eadem mala quasantes, in passo cõegerunt, quæ omnibus querelis faucium prodere putant. Hæc omnia licet specie dissimilia esse uideantur, uirtus tamen una omnibus, idemque beneficium. Sane frequenter accipiant & cibos, qui magis sorberi, quàm mastiacari uideantur. Si his adhibitis, faucibus adhuc perseverauerit molestia, sic ut uulnerare partes attentet, que etiam Synanchin minetur: tunc nos fortioribus oportet occurrere capitaplasmatibus, hordei, uel lini seminibus paragoricis, mixto aliquan-

Diamorrou.

C to nitro, uel salibus: quo Hippocratis nostri præceptis custoditis, sic curando, ab interioribus euocare sollicitudines ualeamus. Præstant interea cataplasmatibus beneficio, etiam fomenta calastica ex similibus superprædictis, & hybisco confecta. Vulneratio uero si faucibus apparuerit, sic a nobis sollicitè curanda erit. Fimus cauum albus, tritus cum melle, & tumorem reprimat, & uulnera delicate permundat. Echirundinum combustarum cinis, cum melle similiter proderit. Aliud. Omnibus uulneribus, & tumentibus, & sordidis, utilissimum multorum ueterum autoritate probatur hoc, quod conficitur sic. Thus masculinum, Irin Illyricam, herbam et radices aristolochiæ, omnia æquis ponderibus tunduntur, & melli miscentur, uel mellicrato, & sine molestia eduntur. Item, Antheræ, quæ omnibus nota est, Irin Illyricæ, sandaracæ, cyperi uncias binas, aluminis scissi, myrrhæ, croci, crocomæ gummatibus semuncias singulas, in uino omnia trita, & cribellata adhibebis: & cum necessitas cogerit, aut cum puluere, aut cum melle commisces, & uteris. Nam & Musæ trociscus, ubique diffamatus, cum succo roris syriaci, & melle, uel mellicrato adhibendus est. Si uero uua dimissior fuerit, & faucibus indignatis reumatifauerit, gargarismate ex speciebus stipticis confecto, tepido imminemus, & ex dacylis in aqua, uel mellicrato decoctis, aut rosis siccis, aut uitium turionibus molissimis, aut sorbis, aut mespilis, uel certe gallis infusis, & decoctis adhibebimus. In tumore uero posita, cum amplius reumatizauerint, sales triti cum melle multum profunt adhibiti, & dacylorum ossa: & si nuxes uirides immaturas comburas, & ex his puluerem facies, & admisceas. Similiter aut modicum mellis, aut mellicratum, et alumen humidum, in uase uicili coquas. Sic de puluere radicum caulium combustarum. Sic etiam de anetho, et postea puluere facto. Vuam siccas, et continuo desiccata, si inflatum os fuerit, quod Afatham appellamus, nimia uisione accedente, rosam siccam cum melle tritam locis impone, et portulacam in melle similiter infundimus, et manducandam damus: et oliuæ folia uiridia in uino decocta, ex quo tepido, os frequenter coluendum est. Nam et auellana cum despumato melle contrita, pro electuario semper adhibenda est, ut oris uisio purgetur.

Papulæ faciei.

Q De PAPVLIS minutis ubique nascentibus. Caput XVI.
Q VIBVS IN facie quæ maxime, ueluti leuissimus tumor repente innascitur, humorem aliquando pinguem, aliquando aquatiorem mittens, pruritus & uulnerationes procuramus oxy melle, & aceto acri, & melle, æquis ponderibus confecto, et confricatione curantur. Item amygdala amara cum aceto acri contrita, similiter operantur. Nam & troscisci ex hoc confecti, & in aceto soluti, medentur. Post uero etiam subscripto lauare linimento conueniet. Si uero

ueluti exanthemata, quas scabies dicimus; in facie, uel genis, ex humo-
rum acredine, uel plenitudine apparuerint, hederæ agrestis folia ex mel-
le contrita, pro linimento adhibenda erunt: aut certe allium cum sali-
bus tritum, mixto oleo roseo similiter adhibetur. Sic galbanum cum o-
leo resolutum. Sic feces uini, & Iris Illyrica, utraque contrusa, & cum o-
leo roseo commixta medebuntur. Et cedria cum resina, & cera, æqua
ponderatione commixta, et adipēs anserini similiter cum resina, et oleo,
& melle operantur. Nitrum quoque cum porcinis adipibus. Nam &
myrrha, cum tripla ponderatione albi mellis mixta, continuo id præ-
stat. Et spuma argenti, cum folijs rutæ uiridibus, & acri aceto mixta, pa-
pulas suprascriptas & scabies totius faciei percurat. Si uero tumor
permanens post curationem, sales fossiles triti cum aceto compescunt,
aut taurinum gluteni cum synopide, et aceto. Si impetigo ex hoc facie-
em, uel cætera membra occupauerit, per infusa triticum in lamina can-
dentis ferri superimponito, & succo qui ex hoc emanauerit adhuc tepido,
penna perungito. Et myrrha similiter operatur. Frequentius & gut-
ta ammoniacæ, cum aceto contrita perungenda est. Sic succus menthæ.
Sic thus masculum. Sic apium contritum cum salibus & aceto. Sic glu-
ten taurinum in aceto resolutum: cui manna & thus admiscendum est,
& puluis similiter adhibendus. Aliud. Sulphur uiuum, cum aceto et
pice commisce, et utere. Si papulæ plures innatæ sint, aceto tepido pri-
mo foueto: postea nitro cum aqua colluio. Item de supradictis linimen-
tis. Si autem longi temporis fuerint, aut acres, tunc plumbi rasuram;
sulphur uiuum, gluten taurinum in aceto uiscido coctum, & solutum
inungamus. Aliud. Lilio agresti, lachrymarum loca perunge, aut la-
pathij radicis corticem cum aceto coterimus, et cataplasma adhibemus:
ante tamen nitri puluere loca defricando. Aliud. Maluæ agrestis se-
men immaturum colliges, et ex hoc succum elicies, quo cum frequen-
ter linieris, & antiquatas, et agrestes percurabis. Aliqui ex diuersis su-
prascriptis componentes trociscos, ad maiores curas hoc modo compo-
suere. Alcyonij combusti semiuncia, chamaeleontis nigræ radicis uncia
i. alphodeli radicis uncia i. sulphuris uiui, thuris masculi, pyretri, afro-
niti, ana senuncie singulæ: glutinis uncia i. omnia cum aceto coquan-
tur, & operamur. Cum uero mudatæ fuerint & percuratæ, tunc asini
adipibus loca perungue, et post serenatas maculas, colorem restituas
naturalem. Hæc omnia quo fieri possit, catholicis primo purgati-
onibus releuandi sunt.

A
Exanthemata
faucium.

Tumor post
curationem.
Impetigo.

B
Contra papu-
las antiqua-
tas.

V

De v s t i o n e calida, uel
ignis. Caput. xvii.

s t i o n e s antequam fluidas uescas erigant, murium oli-
uarum frequenter infunde, & easdem oliuas salsas contritas imponito.

C Et lactuca trita cum salibus, pro cataplasmate imposita, continuo curant. Et fel taurinum cum aqua plurima infunditur. Aliud. Alamine scisso cum aceto contrito omnes unctiones ungo. Nam & thus masculum cum aqua tritum similiter operatur: & sales cum oleo roseo triti inliniuntur, & betae elixae contritae imponuntur: & pollines tritici, cum ouis crudis mixtis superimponuntur. Sic etiam hederae agrestis folia in uino cocta curant.

Si uero post easdem unctiones uesiculae inquietarint, myrrham cum uino tere, & imposito: aut calcis uiuae puluerem cum carota: rio tempera, & in lintheolo linitum impone. Si uero etiam uulnera fecerint, porros terito, & locis impone: aut maluarum folia elixa, & cum oleo superinrita impones: aut lenticulae puluerem, cum melle commixtum induces. Sic & columborum stercora combures, & in lintheolo linis cum oleo contrita, quibus omnes exustiones ueni- entes procurabimus.

¶ De CARBUNCULIS.

Caput XVIII.

GENERALITER his omnibus per initia phloboto- mo subueniendum est. Specialiter uero locis superimponendū est ca- taplasma, de arnoglossa cum pane mundo, & lenticula cocta. Vul- neribus uero acriora & calidiora medicamenta ordinamus: ut An- dronyci trociscos, aut Polybii: qui sollicitius cum dulci uino, aut pingui infusus, & in mortario confusus, sub cataplasmate uulneri imponatur. Si uero his adhibitis, uulneris radix occupauerit alti- ora, cauteris admouendi eidem loco: si nullum obstiterit praedi- cium, ut loca uitalia periclitentur, quae sunt in musculis, aut nervis at- tingentibus, neque ignis poterunt sustinere tormenta. Qua de re, fri- gido cauteri utimur, quod frequenter approbabitur. Aquam, in qua calcis uiuae puluerem extinguimus, miscemus feculae, nitro, & sapo- ni, aequa ponderatione: & ex eo linimus loca quae comburi placet.

Super cataplasmata, loca tegenda sunt, donec illa cadant quae alti- us inhærebant. Sunt & alia, quae os Carbunculi sepeliant: uideli- cet, uuae passae, enucleatae, solae contritae. Aut ficus sicca in uino de- cocta, & trita. Sic lupini in uino similiter, & purgati teruntur, & imponuntur. Sic stercora columbarum cum melle contrita. Sic men- tha cum aqua contrita. Sic nitrum cum ruta uiridi, & aceto tri-

tum. Sic rapa, cum uua passa, & porcinis adipibus, ad- mixta etiam pice liquida, omnibus sub aequa men- sura temperatis, & adhibitis, ulcerum

semper loca periclitantia

liberata sunt.

D
Andronyci
trociscus.
Polybii tro-
ciscus.

Cautere fri-
gidum.

S De vulnerebus varijs casibus infixis. Caput XIX.

ITEM LO, seu morsu canum, aliarumue ferarum, seu ex quolibet casu neutro uulnerato, quos Neutros appellamus, in pactis uulneribus omnibus, generaliter continuo hoc adhibendū erit, quod glutinare & curare ualeat membra uulnerata. Myrrhæ puluerem aspergo, quem permanere faciam sine aliquo humore: continuo etenim glutinat, et colligit. Et rubus elixa & trita, hoc facit. Hoc Iris Illyrica tunsa, et melli mixta, atque in panno lineo imposita. Et aristolochiæ puluis cum aqua mixtus hoc idem facit. Idemque ossa sæpius colligabit. Et omphacinum tritum cum uino sic curat, per initia adhibitum. Sic puluis thuris masculi. Et myrrhæ puluis, cum uino & melle coctus, et temperatus, continuo medetur. Sane sub his adiutorijs, quæ semper futuris obstant feruoribus, utilis est sub uno schemate, etiam patientia uulnerati. A lauari uero, a foci, a solis calore, uel æris frigore, a clamore, uinolentia, usu uenereo, iracundia custodiantur: ne quod iam aut collectum, aut glutinatum est, his occasionibus soluatur. Hæc etiam prætermittere non debui amice, per omne corpus recentibus uulneribus frequenti approbatione laudata. Allij igitur combusti puluerem uulneri asperge. Sic etiam Scyllam tritam imponito, & sub utrisque adiutorijs, quatuor continuis diebus penitus maneat inquietatū, quo continuo percurari possit. Nam & myrrhæ, & lanarum succidarum combustarum cinis uulneri aspersus, similiter operabitur. Item aliud. Malignanati folia, cum melle trita, mixto uino, imponito, desuperque lintheolum infusum resina & terebinthina superaddito. Item lanis operiatur, uino & oleo diligenter infusus. Item aliud. Fabæ syriacæ radicem siccam tundis, cribellas, & loca eius puluere aspergis. Item aliud. Oliuarum amurcam coques primum igne fortiori, ad primam mundationem, secundo, & tertio molli uapore, quo pinguescere possit. Cum uero coagulauerit, reponis in uas mundum, & cum frigescere cœperit, lintheola infusa loco percusso opponimus. Operabitur uero fortius medicamentum, si gallarum pulueres admisceamus. Aliqui eandem amurcam cum eodem puluere coquunt, et sulphuris uiui, & origani puluerem æqua mensura uulneri aspergunt. Qui uero ferro in altum uulnus suscipiunt, fel bovis unciarum. II. & ficus nigræ lachrymum ÷ II. & adeps caprinus ÷ III. in uinum commiscetur, & temperatur, et hoc medicamento curatur. Aliud. Baccas lauri cum resina tunsas, locis imponimus. Glutinantia uero adiutoria hæc sunt. Resinæ Syriæ puluis, capilli hominum, æqua ponderatione cum thure masculino tunsis, & cribellatis. sed cum puluerem aspergere cœperis, præungendum est uulnus picre solutione. Particulam utris uinarij, & resinam ex æquo comburis, et uteris puluere collecto: qui & sanguinis fluxus ualeat prohibere. Et mandra-

A

Neutrosi.

A quibus absineat uulneratus.

B

Glutinantia.

Contra sanguinis fluxū.

C goræ folia trita cum uino, & aqua cataplasfabimus. Aliud. Malo-
granati dulcis grana cocta in uino diligenter terimus, & in uicem cata-
plasmatis adhibemus, adiutorium approbatum. Sed & betarum furcu-
los, exceptis folijs, elixos & tritos imponimus similiter. Si canis mor-
fu quis fuerit uulneratus, continuo spongia, aqua frigida infusa, aut oxy-
mellite imponenda est, quæ frequenter ex hinc irriganda erit. Primo
uero eiusdem uulnerati lotio, uulnus, secundum physicos, fomentan-
dum est. Et porri cum melle triti, & impositi, eodem modo medentur.
Et lachryma arboris ficus continuo si ungas, hoc idem præstas. Et spon-
giæ rudis combustæ cinis cum liquamine mixtus, optimum beneficium
facit. Sales triti, ac in lintheolo ligati, aceto infunduntur, & ex hoc uul-
nus tamdiu apozimandum est, uel infundendum, donec sanguinem ex-
liat. Postea uero cum sanari cceperit, eruum tritum cum melle uulneri
imponere, aut lentis puluerem cum melle despumato similiter. Quæ ue-
ro in feruore fuerint, spuma argenti cum melle trita, & imposita, conti-
nuo mitigat: præfomentanda sunt interea uulnera aqua gelida. Etiam
qui humanos morsus patiuntur, adiutorijs supradictis percurantur.

Vulneratio
nerui.

ἀνιστόμαστι.

Oleum Sa-
binense.

Experimen-
tum.

D Si uero his accidentibus uulneribus, etiam nervus fuerit uulnera-
tus, in quo graue periculum frequenter euenit, cuiusque patefactio pri-
us custodienda est, ad humoris ex uulnere uenienem digestionem: quo
ex hoc impetus & dolores auerti possint. Frequenter etiam ferro hanc
anastomasin procurare debemus. Conuenit interea præ omnibus eti-
am his phlobotomum adhibere: conuenit etiam eos uentris purgatio-
ne iuuare. Aquarum sane calidarum fomenta fugienda sunt, quæ pu-
tredines & indignationes sæpe procurarunt: sed oleo sabinensi, uel dul-
ci, tepido, aut certe uetusto, frequenter uulnera ipsa fouenda sunt. Vi-
ride uero oleum, uel gremiale penitus uitandum est. Utimur tamen
post fomentationem olei calidi supradicti, sola terebinthina resina, lin-
theolis infusis & apposisis: utilius, si terebinthinæ etiam euforbij quip-
piam pulueris admisceamus. Fœminis uero, uel pueris, delicatiora cor-
pora habentibus, etiam solius terebinthinæ sufficit beneficium. Cæ-
teris uero, ut superius comprehendî, terebinthina cum euphorbio, &
oleo miscenda est: addenda & cæra propolis, addendum sagapenum;
addendum laser, addenda & opopanace: quibus coniunctis beneficium
attestatur. Item aliud, quod in experimentis, ad neruorū uulneratio-
nes adhibemus, iuuat. Calcis puluerem diebus canicularibus ex aqua
marina lauamus, quā custodiemus. Huic medicamēto mixturi euphor-
bium, sulphur uiuum, puluerem calcis lotæ deligēter in uncijs singulis,
terebinthinā, ceram, picem, in uncijs tribus. Interea per initia ad uirorū
uulnerationes cataplasmate tali uti nos cōuenit, ex melle, aceto, oleo ro-
seo modice admixto, cum fabæ pollinibus coctis, & tēperatis. Post cata-
plasmatis uero beneficiū, hoc est aptissimum adiutoriū, Euphorbium,

cera, resina, in singulis libris: oleum in duabus: sed euforbium cum aqua prius terimus, & superioribus solutis, ut moris est, admiscemus. Superaddimus interea etiam salis quippiam: ut os patulum humoris noxij digestionibus procuremus. Nam & Melanchorus trociscus semper his utilissimus fuit, cum aceto tritus, & aliquando cum cerotario temperatus. Sunt etiam alia adiutoria his causis aptissima, sub una uirtute uariae composita: sed paucis magis, & probatis uti nos conueniet, quarum perseverantia, effectum facilissimum potuerunt procurare.

Trociscus Melanchorus.

V De VULNERIBVS ex se nascentibus. Caput XX.

VULNERA VARIA, aut ex humorum acredine, uel plenitudine generantur, aut praeventibus diuersis ictibus acquiruntur: quae imperitia medicorum frequenter, aut adiutoriorum inopia procurata, uetusta & Chironia fiunt. Igitur cum uulnera recentia & caua fuerint, sic curanda, uel replenda erunt. Mel, & resinae terebinthinam aqua ponderatione in cacabo facies solui: item addes butyri tantundem, & ex hoc infusis lintheolis uteris. Aliud. Resinae puluerem, ceram, & adipem mices, & similiter adhibebis. Cum aqua lia in superficie fuerint, hoc uteris medicamento. Spumae argenti ÷ III. resinae ÷ II. olei ÷ IX. conficies, ut moris est, ad emplastri temperamentum, quo cicatrices utilius ualeas procurare. Sin uero transcendens planiciem, plus excreuerit, acrior eruptio, phrygium lapidem tundis, & eius puluerem aspergis. Aliud. Aëris purgamentum tunsum similiter adhibendum est: id aceto temperabis, humore importuno permanente. Et dum uulnus a sanitate prohibetur, hoc adiutorio percurandum est. Plumbi purgamenta, eruginis uncias singulas: aloë, & calcis uiuae uncias binas tundis, & cribellas, & uulneri aspergis. Si cicatricem ferri sanare uolueris, hoc emplastrum facies. Cerae ÷ II. resinae ÷ I. thuris, & eruginis uncias singulas, olei cyprini ÷ VIII. conficies, ut moris est, & imponis, emplastrum probatissimum. Si nimis antiqua uulnera fuerint, cerae in Sole liquefactae commiscendus erit puluis floris eraminis, ut ad temperamentum emplastri perueniat, & uteris: neque frequenter soluere, sed etiam fasciola custodire debebis. Item Chronicis, uel Chironijs uulneribus, hoc emplastrum approbabitur. Lapidis chalcitis, cera in uncis singulis: aluminis scissi uncia. I. his commixtis & temperatis utimur.

Ad uulnera caua.

B
Aequalia in superficie.

Excedentia superficie.

Ad cicatricem ferri.

Ad uulnera antiqua.

Sunt & alia uulnerum genera quae serpunt ad loca uicina, atque his adiutorijs percurantur. Lenticula cocta, & melli commixta, & folia caulium cum melle similiter. Et coriandrum uiride cum melle. His etiam ex lini seminis puluerem, cocti in uino, & oleo cataplas-

Serpentia.

C smata semper adhibui. Sic ex milij pollinibus feci. Sic etiam hederæ folia in uino coxi, & cum melle trita superimposui: fovi etiam de eadem decoctione uulnera frequenter.

Vulnea callosa.

Si callositas emerferit, in qua semper est tarditas uulneribus ad sanationem, æris florem coctum terimus, & ex eo puluere uulnera sanabo, & tithymali lachrymam cum uino & melle mixtam, in uicem cataplasmatibus adhibeo. Si madefactio permanferit, his adhibitis, sales tritos cum melle imponam, & desuper ficibus tritis, & incoctis cataplasmas bo. Et amygdala amara sic curant, locis adhibita, & cum melle con trita. Sic porri in uino cocti eodem modo curant. Sic erui puluis cum melle, & oliuarum uiridia folia in uino cocta, & trita adhibentur: ex quo uino prius fomentari loca suadeo. Similiter ex aqua etiam in qua alumen scissum infundendum est.

¶ De IGNE SACRO.

Caput XXI.

H V I C M V L Tiformis est cura deligenda. Aliter enim in febricitantibus emergens curatur. Aliter in eo cui febres superueniunt uisitatur. Nam & omnibus partibus corporum generaliter adiutoria adhiberi similia possunt: excæpro tamen capite, uel facie, quorum est præmaxime causa sollicita. Vicinitatem enim appetendo ignis ille serpens, oris aliquando, uel linguæ, aut gutturis partes facilius pulsatur, & ueluti superficiem derelinquens, continuo instat interiora molestando, in quibus uitæ periculum formidandum est. Nam & Hippocrates hac eos sententia uisitat. Ignis sacer, ait, si interiora appetuerit, molestum erit: si in cutibus perseveret, curari poterit. Ergo si cum febribus, & in supradictis partibus apparuerit, intra tertium diem phlebotomandi sunt, & purgandi, a cibis penitus abstinendo, si tamen uirium non occurrerit fetosa debilitatio. Dabis adhuc cataplasmata calida, & fomenta humectantia: frigenda sunt ignem, causæque dolorem augmentia: sed lenibus linimentis, euocatorijs, & curantibus, quæ sine grauedine possunt asferre utilitatem, ungendi sunt. Si phlebotomus sane, uel cathartica, certa de causa prætermittenda sunt, clysteribus assiduus imminebo: quo competentibus, & assiduus purgationibus uentris, quod phlebotomo negatum est, possimus compensare. Frigidi tactus, & acres, uitandi sunt. in frigidatæ enim partes facilius commouentur. Declinantibus febribus hoc trocisco uti consueui, omnibus temporibus & locis aptissimo. Spuma argenti, cerussa, sulphure uiuo, croco, opio, sub æquo tunsis, & cribellatis, & cum passo, uel succis strychni temperato. Nam istorum euporistorum frequentium semper beneficia profuerunt. Butyrum cum strychni succo adhibetur: & acacia cum aceto, uel aqua: & spuma argenti cum

Hippocratis
sententia de
igne sacro.
Ignis sacer cum
febribus.

fuco porrorum, uel betarum, & gutta ammoniaci cum aqua, & cyz A
 molia cum aphita, & strychni succo, & oua recentia in aceto, cum o
 leo, & bulborum combustorum cinis cum melle. Oleum cyprinum
 cum melle mixtum, & cerussa cum aceto, & uasorum fictilium puluis
 cum aceto, & thus masculum cum cerussa: omnibus, aut singulis com
 mixtis, aliquibus mixto pane, aliquibus ex aqua coctis, & contritis.
 Nam & folia in uino cocta, & contrita, imposita saepe profuerunt igni
 sacro. Si etiam post hæc ignis ille sacer adhuc insanierit, & ruboris
 sollicitudo perseuerauerit, iam cataplasmatibus de seminibus cum mel
 le coctis imminendum erit. Adhibeo etiam locis scarificationem: adhi
 beo fomenta aptiora, & ex eisdem desuper cataplasmatibus frequenter
 requiro beneficium. Periculosum est etenim, caussa permanente adiu
 toria uariare.

Ignis sacer
 post febres.

¶ De A P V M percussibus, uel scorpionum, cætero
 rumque serpentum. Caput XXII.

A P V M percussus maluarum folia imposita continuo curant:
 & sisami folia, uel ipsum tritum, & appositum. Et lauri folia
 molliora trita cum uino, potui data, saepe curauerunt. Scorpionum
 uero percussus, sales frixi, & cum oleo contriti, loco appositi. & ci
 nis cum aceto mixtus, & impositus similiter, & allium cum oleo tritum,
 & origanum cum aceto coctum calido faccello, continue medetur. Et
 porrum tritum impositum, & sardinia trita, & folia oliuæ trita cum sa
 libus, et imposita, & scylla cruda trita imponitur, & statim curat. Sed
 & his semper potionibus liberantur. Aristolochiam rotundam, gen
 tianam, myrrham trogloditen, baccas lauri, omnia tinsa ex æquo, &
 cribellata: aut puluerem, cum uino, et calida identidem in tempore da
 bimus. Hoc etiam contra cæteros serpentes usi sumus. Aliud. Pi
 peris, & papaueris semiunciam unam tundis, & cribellas: ex his co
 cleare cum aceto dabitur, & bacca lauri cum folijs rutæ uiridibus tun
 sa, cum uino, aut aceto semper datur: & Irios illyricæ puluis cum ui
 no calido similiter. Quin & fraxini folia cum uino trita,
 bibenti dantur.

Apum ictus,

Scorpionū.
 B

¶ De turpibus R E C E P T I S, & latentibus. Caput XXIII.

T I T I M A L I maioris molles & uirides ex acumine turiones
 tolles, & hos calidis cineribus subijcies: & postq̃ combusti fuerint, pro
 iectis sordibus in mortariolo contundis, & eorum pulueri aphitam si
 militer immittis, & uino cōmixta, patefacto orificio, uulnere imponis,
 & continuo telum, aut aliud quod diu latuerit excludetur. Aliud.
 Aristolochiæ puluis patefacto uulnere similiter imponendus est, & ue
 locus exiliet. Sic etiam de dictamni folijs, uel radicibus contusis, uelo

Vt tela laten
 tia ex uulnere
 prosiliant,

Cius fieri consuevit, secundum ueterum testimonia. Et eufesami semen contusum una cum calchantio, uulneri appositum, similiter operatur. Et lacerti caput contusum, & impositum, secundum physicos similiter facit. Si uero in fauces aliquid transuerit, aquam & oleum calidum contineant in ore, et spontaneum exibat sine mora. Sunt et alia physicorum beneficijs publicata, sed suo loco & tempore conscribentur.

¶ De TESTIVM indignatione.

Caput. XXIII.

FERVORES testium, uel indignationes, cyminum cum melle & oleo tritum, & appositum curat. Et semen lini frictum, & cum uino similiter uice cataplasmatibus temperatum. Sic faba in uino cocta, aut in mellicrato cum melle trita, operatur. Sic ex coriandro, uiridi cum faba in aqua cocta, et simul trito cum melle cataplasma bimus. Sic etiam de hyoscyami folijs. Similiter & uuam passam enucleatam, ex æquo cum nitro adhibemus. Et nasturtij puluerem cum lini semine ex æquo cataplasma bimus. Sic rutæ, & lauri folia uiridia in uino cocta, cum aphitis profuerunt. Et cymini puluerem mixto butyro, & resina, & pampinos molles tritos cum aphitis adhibemus.

¶ De VERETRI, hoc est, de naturæ

uitijs. Caput. XXV.

VERETRI dolores, fel taurinum cum nitro contritum curat: & butyrum cum terebinthina ex æquo mixtum. Similiter ex lini seminibus puluere, & myrrha ex æquo, resinæ quippiam superadditum, in aqua coctum cataplasma imposuimus. Quibus uero tumuerit, pampinorum folia molliora triginta, thuris & cerusæ semuncijs singulis commixta, pro cataplasmate imponimus, ante tamen ex aqua marina frigida fomentabis. Nam & testes tumentes, cymolia trita frequenter cum aqua peruges: post uero myrti siccæ pulueres, & myrrhæ similiter aspergendi sunt. Vulneribus uero in eodem cole, lepidos cyprinæ puluerem satis confidentur aspergo. Et afronitri folius triti puluis eodem modo operatur. Et alumen scissum contritum, similiter & myrrha cum passo trita. Si ueluti carbunculus innatus fuerit, liciū cum melle tritum superpono: frequenter per diem inspergo mel tepidum. Fomentandum est interea ex aqua de seminibus, quæ in aqua coqui debent, aut myrti uiridis, aut lentisci folijs, aut rubi, aut oliuæ, aut rosæ siccæ: cuius puluis si post fomentum aspergatur, continuo operabitur. Sic etiam de herbarum supradictarum cataplasmate innuendum est, cum melle commixto. Nam & uini, & mellis species prætermittenda non est. Continentia uero ciborum, & uentris purgatio frequenter prouideri debet. Efflatterij, quoque puluere tangendum erit. Aliqui minimorum piscium capita trita impoluerunt.

Tumores
testium.

λεπίς est scho-
ria, siue squā-
ma, cuprinā
uocat λεπίς,
quæ ex ære, si-
ue cupro fit.

De HERNIOSIS. Caput XXVI.

HERNIAS uero infantium frequentius emergentes sic curabimus. Resinam pituinam siccam, nitrum, cyminum, ex æquo cum melle miscemus, & sub emplastri temperamēto imponimus, superaddita ligatura quæ contineat medicamentum. Et uiam passam purgantes, in uncijs. V. I. nitri uncia. I. cymini uncijs. II. cum melle contriuius, & ita usu sumus. Vitandi cursus, & saltus, et auster, uentris quoque conatus, & ciborum nimia præsumptio. Aliud probatissimū. Caduci malogranati ÷ I. gallarum semiuncia, asphodeli radice ÷ I. narcissi radice ÷ I. hæc omnia in uino coquenda, & tundenda, et malaxata in primo adhibenda sunt. Hoc herniarum perseverantiam intus sub ligatura, etiam ueterum percurabit, & hydrocelas, & sarcocelas, & enterocelas similiter. Itē Cinopoli emplastri expono maximū & probatissimum remedium. Spumæ argenti ÷ V. I. aceti ÷ XVIII. olei & opij, spuma argenti pleniter comburis, & supradicto aceto restinguis, & teris diligenter. Omnia simul mixta coques, agitabis spatula olosidera, & ita ut dactylon coques, ac in lintheolo adhibendum diebus cōtinuis V. imponis. Hoc hydrocelas, & similes collectiones sine dilatione curabit. Carnes cochlearum teris, & his myrrhæ puluerem misces, et in lintheolo inductum impones sub fascia, ut facilius reprimatur: & passum cum acacia tritum, et aqua similiter temperatum supponendum est. Item etiam cochleas ex arbore lauro collectas comburimus, & tritas imponimus, ut umbilicum in naturam propriam reuocemus.

De diuersis uitijs in ANO nascentibus, uel Syringis, hoc est, Fistulis. Caput XXVII.

DIFFICILES in his locis causse euenire consueuerunt, pro accidentium qualitate. Est enim loci natura delicatior, & qui ad omnes acerbos quæ maxime contactus, facile commoueat. Nasquitur ergo in hoc sæpissime indignatio, uel feruor: fit ragadium, fit condiloma, erumpunt hemorrhoidæ, nascuntur exocadia, fiunt & syringæ, frequenter etiam intestinorum effusio, et cetera, quibus omnibus suo ordine remedia designabo. Quando ergo indignatio, uel feruor locum attentaerit, pingues dactyli, in passo, uel mellicrato infusi teruntur, superaddito quopiam de oleo roseo, e quibus factum cataplasma tepidum adhibemus. Superimposita tamen ligatura, quæ adiutorium continere debet. Nam etiam de musteo similiter faciendum est, sed quod piper non habuerit. Sic etiam de bulbis albis, cum melle contritis, loca comota frequenter curata sunt. Et liciū inde contritū cum cerotario, et ex oleo roseo temperatū adhibuimus, & sæpissime sulphuris uiui quippiam tritū superadijciemus. Est & hoc genus adiutorij utilissimū. Spuma argenti, & cerussa, uncijs singulis: thus masculum, et crocum in semuncijs singulis, cum uino & oleo tritum, et cōmixtum adhibendum est, et oui ui-

A
Herniæ infantium.

διόπον, σάπρον, & ἰτρυπον.
Herniæ sunt species ab Hippocrate & Galeno descriptæ, quæ etiam plures & apud Galenum & Paulū Aeginerum numerantur.

B

Ani accidentia.

Feruor Ani.

C tellum coctum, tritum cum melle & oleo, commixtumque, loca indignantia satis iuuat. Sic butyrum cum medulla ceruina, & sepum ceruinum, & thus masculum, omnibus ex æquo tritis, immixtis oleo & uino, similiter temperatis curati sunt frequenter. Huic medicamēto etiam licium indicum admiscendum est. Si Ragadium factum fuerit, hoc medicamento uti nos conueniet. Oleum roseum solum, tritum in plumbeo uase, & ex pistillo simili, usque in pinguedinem, & caricarum pinguium combustarum cinis, uino tepido prælauatus, ac impositus, prodest. Sic rosæ flos, & pompholix simul trita, similiter spargitur. Et molybdæna cum folijs rutæ uiridibus teritur, & cum oleo myrteo pingui temperatur, & similiter iuuat. Sic hyoscyami folia, sic corij puluis aspersus similiter loca curauit. Sic etiam lintheorum combustorum cinis cum amylo, ex æquo succo foliorum oliuæ temperatur, & subpingue fit at linimentum. Quibus Condilomata fiunt, uel Exocadia, hoc adhibendum est medicamentum. Ceræ libra una, picis ÷ IIII. medullæ ÷ II. adipis taurini ÷ III. mellis ÷ IIII. uini ÷ III. guttæ ammoniacæ ÷ I. thuris masculi ÷ II. myrrhæ ÷ V. sicca cum uino teruntur, & solutis calentibus commiscuntur. Aliud. Calcis uiuæ ÷ III. nitri ÷ II. utraque teruntur, & cum aruina miscentur, & ex eo pingue facies linimentum. Quod cum siccauerit identidem superaddis, & hoc modo per seuerando facilius consumuntur exocadia. Sic chalcantum teris, & eius puluerem cum oleo dulci molli uapore coques, & pinguefacto, loca frequenter tangantur. Nam & alumen missum in uase nouo, coctum, atque tostum, puluerem facit. Hoc tacta exocadia, spontanea frequentius ceciderunt. Hemorrhoidas uero erumpentes, sic compescere, uel temperare consueuimus. Butyrum, crocum, cerussam, mel ex æquo omnia commiscenda sunt, & oui albore temperanda, & imponenda. Sic arnoglossa trita cum aceto facit. Sic pulueres cerussæ cum aceto contritæ. Fomentabis uero loca ex aqua, ubi alumen scissum, tritum mitti facies, & æris florem excoques in tertiam partem, & ex hoc fouendi sunt ante linimentum. Sed ut etiam in tempore aliquando de physicis adiuuentur, in ea aqua coquendæ sunt species supradictæ. unde ægrotus is qui hemorrhoidas patitur, frequentius elauatur, & ad supradictas species, in uncias senas, aquæ sextarios decem mittis.

D Si uero conclusas resolvere uolueris, taphiæ succum, & apij similiter ex æquo conterimus, & loca contingimus, quæ solenni digestionem fuerint impedita. Lafer cum aceto contritum imponendo, frequenter uti sumus. Nam & Musa rrocisco, omnibus approbato, in aqua in qua calcem uiuam extinximus, resoluto, imminuimus, & profecimus. Qui trociscus hoc modo a nobis conficitur. Aluminis scissi uncias. III. aloë ÷ III. croci ÷ II. crocomagma ÷ II. chalcanti ÷ III. caduci mallogranati ÷ II. uino omnia trita commiscemus, ut trociscos faciamus.

Ragadium
Ani.

Condilomata,
& Exocadia
Ani.

Hemorrhoidas
Ani.

Physica remedia
frequenter
ab Autore uocantur
ea, quæ absque certa
ratione data, pro
desse compendimus.
Syringæ.

Trociscus
Musa.

Etiam hic puluis nobis experimentum dedit, omnes syringas & expurgandi, & glutinandi: qui ista ratione conficitur. Iris Illyrica ÷ V. erui ÷ III. manne thuris ÷ III. lepidos calcis ÷ III. aristolochiæ ÷ III. 5. omnia tunduntur, & cribellantur, & ficilis puluis, cui nomen est Acopali, commiscetur eodem modo, ad linimentum quemadmodum Musa troscus supradictus. Quibus uero intestinum exierit, mori * syluestris dolori fomentatio adhiberi debet: & post acacia trita cum aceto linimentum facit: & cyclamini succus cum melle ex æquo mixtus, & coctus usque in pinguedinem. Aliud, Puluis ellebori albi, qui cum aceto coctus est, admixto cærotario ex oleo roseo, satis iuuat. Et hyoscyamus in aceto tritus, & similiter adhibitus, intestinum effusum si militer reprimat.

A
Puluis ad
idem.

Intestini
exitus.
alias * uiscido.

PERNIONIBVS. Caput XXVIII.
PERNIONIBVS quæ cum pruritu sunt, aquæ marinæ fortis satis prodest. Similiter etiam si uino calido stiptico foueantur. Sic si etiam decoctiones betarum, quibus alumen scissum infuderis. Post quod fomentum, cæra liquefacta linire conuenit. Nam & ex aluminis puluere, cum hordei farina, & uino cataplasma adhibendum est. Sic cære, & picis resolutæ sola unctione curatæ sunt. Et gluten solutum in aqua profuit liniendo. Sic oliuarum uiridia folia cataplasmate adhibita profuerunt. Sic gallæ cum aceto contritæ, sic uini feces impositæ curauerunt. Quibus uero iam uesicauerint, raphanos tundes, & ex eorum succo bene proderunt linimenta. Et lenticulæ coctæ, & tritæ cataplasma proderit. Et caduca malogranati, in calidis cineribus tepesacta, & trita adhibita, conuenerunt. Sic etiam scylla cocta, similiter contrita, profuit. Quibus uero increpuerunt, & uulnerati fuerint, his spuma argenti trita, mixto adipe porcino, pro emplastro apponi debet. Sic adipēs anserini cum cæra & oleo tepidi adhibendi sunt. Et cochlea cum testa combusta, & trita, & in puluerem redacta, si aspergatur, continuo medetur. Eruum in uino coctum, & cærotatio similiter curat contritum.

B

De RAGADIS pedum, uel digitorum. Caput XXIX.

OMNES CREPIDINES in calceis pix liquida illinita percurat. Et spuma argenti, cum cerussa, & alumen scissum ex æquo confusum, & uino mixtum, medebitur similiter. Quibus uero pilis inhaerentes molestiam fecerint, ferro subtili loca ante purganda sunt, & melantherium cum locio pueri tritum apponendum. Et gutta ammoniaci cum aceto trita similiter adhibet. Et mysi, & aristolochia ex æquo confusa cum melle adhiberi debet. Hoc & rasura cucurbitæ trita faciet.

C

¶ DE PARONYCHIIS. Caput xxx.

PARONYCHIAE in initijs lana ex aqua infusa imposita curantur, eaq; frigidiorē frequentius irriganda erunt. His etiam asphita, cum aqua trita adhibenda erit. Sic & thuris masculi pulvis cum melle mixtus medebitur. Sic etiam gallarum. Si saniem sane collegerit, locum pungis: ad eius uero digestionem, & lenticulam coctam cum melle contritam superimponis. Et myrti folia uiridia trita, similiter cum melle adhibentur. Sic etiam rosarum, & sic oliuæ folia similiter. Sic cadmiæ pulvis aspersus curat, sic erui, sic etiam thuris masculi. Quibus uero etiam ungues quassī fuerint, folijs myrti uiridibus, uel malograna ti tunsis cataplasmandi erunt. Quibus autem forte aliqua loca nigrescunt, farina tritici, cum pice folia admixta curantur. Et sulphur uiuum hoc cum porcino adipe tunsum, & commixtum præstat, ne ipsi ungues exiliant. Et lini seminis pulvis. Simul etiam & * asturacus cum melle commixtus imponitur. Et cæra sola liquefacta superimposita. Sed his omnibus adhibitis, diutius perseverandum est. Calefacti etenim perseverantia adiutorij ungues, melius gubernantur. Scabiosos, ueluti elephantiosos si quis forte ungues habuerit, uini fex sicca, trita, & cum cæro rotario imposita curat. Et ficus sicca, purgata, & tunsa, superimposita, æque medetur. Et lapathi agrestis radix in aceto cocta, & contrita, et sulphur uiuum cum sandaraca, ex æquo tritum, & aspersum, continuo curat. Interea sub his omnibus adiutorijs, ungues ipsi primo ex pice liquefacta ungi debent: quos superiori medicamento & fasciola munire & gubernare oportet.

alias * Aster-
atticus.

Ungues
scabiosi.

D

¶ DE PRURITU, uel SCABIE totius corporis, uel uarijs maculis in corpore. Caput xxxi.

SI IUVENIBVS hoc bene habentibus obuenerit, phlebotomo prius sub gemina detractioe subueniendum est. Item uentris purgationes frequenter deinde adhibendæ erunt. Cibis plane fortibilibus nutriendi sunt. Lauacris frequentibus uti conueniet, in quibus thuris masculi, sulphuris uiui, & nitri puluere aspergendi erunt. Si hoc adhibito adiutorio, aut pruritus, aut scabies perseverauerit, lapathi agrestis radix trita, & cum aceto commixta, in balneo similiter adhibenda est. Sic linimentum cum melle commixtum. Quo linimento, frequenter etiam in sole adhibito liberati sunt. His frequenter etiam frigida lauacra profuerunt, & postea oleo roseo, uel lentiscino, aut myrtino, admixto uino, se utilius perfuderunt. Scabies uero si uulnera habuerint, mirabolanum, & sulphur uiuum, ex æquo tñsum, cærotatio ex oleo myrteo liquidiori cōmisceō, ut leui unguento eorum in balneis uulnera pertractentur. His sane calidum lauacrum aquarum dulcium pro-

Loquit de lini
mentis quæ in
calce huius Ca-
pituli descri-
pta habetur.

curandum est, in quo supradicta linimenta adhibenda sunt. Nam & thuris masculi, et pulegij ex æquo puluis, ibidem in balneis commodissime adhibetur. Commodius, si etiam cum uino Capnitidis succus, sic nitrum cum uino, sic Capnitidis succus, qui frequenter etiam cum aceto mixtus, plus profuit.

¶ De ELEPHANTIOSIS.

Caput XXXII.

SUNT QVIBVS certis ex accidentibus, maculae in corporibus frequentius inhæserunt. Sunt nigrae, sunt albae, uelut elephantia, si aliquando annunciantes: quibus hoc modo medendum erit. Myrti folijs uiridibus in uncijs duabus, nitri, & aluminis singulis, contritis, in balneis fricandi erunt. Aliud. Sulphuris, nitri, & aristolochiae puluis ex æquo contritus, in balneis adhibendus est. Sic gutta ammoniac, trita cū oleo, profuit. Sic fici folia cum sulphure uiuo, & cum aceto medentur. Nam & sub sole de hac confectione curatur. Et cyminum, cum aceto tritum saepe sic profuit: & quinque diebus superaddendo linimenta, non delauatis prioribus. Sic cymolia, nitrum, & bacca lauri cum aceto commiscuntur, & similiter, ut priora, medentur. Aliud. Fenograci puluis, aphronitri in uncijs binis, et alcyonium, & cyminium in uncijs singulis, similiter cum aceto adhibendum erit. Et ex betarum folijs coctis, & tritis, cataplasma his imponendum est. Et piper cum myrteis folijs uiridibus tritum, & sub sole in balneis adhibitum, utraque maculas permundabit. Sæpe his perseverantibus maculis, ad elephantia uitium, frequentius declinatum est, cui per tempora nunc ordinabo remedia. Per initia huius passionis, cum sanari plene uitium supplices orauerint, phlobotomandi erunt, & purgandi frequentius. Faciem uero in qua huius uitij magis horret imago, mirabolano cum aceto, & oleo roseo, uel myrteo, uel lini semente fricare conueniet. Aquis naturalibus frequentius utantur, & marini lauacri. Continentia sane uitij his plurimum prodest. Cibis digestibilibus, & dulcioribus frequentius uiuantur, lactis acceptatione præmaxime, si aquae eius accipiant quod greci ^{ὑγρόν} appellant. Nam & succus Neptæ herbæ frequentissime hoc uitium releauit: & hæc eadem herba, par beneficium præstitit saepe cibo data: & coagulum ^{νιόβιον}, id est, hinnuli, quæ nos ceruū lactentem dicimus, cum oxymelle ieiunio datum, uel temperatum, sæpe profuit. Si isdem adhibitis, morbus ille adhærescens omnino fuerit publicatus, tunc neque phlobotomo, nec catharticis uti conueniet. fieri enim non potest, ut humor corruptus insanienis, quique omne corpus suo horrore funestarat, his adiutorijs purgationum adhibitis, ad interiorem originem identidem reuocatus, uenenati sanguinis, geminatis effusionibus arceat. Sed uomant frequentius, & lactis beneficio per cibos, per potiones enutria

A

Capnitidis est ea quæ Fumus terræ uocatur a neothericis: a uenteribus etiam Fumaria dicta.

B

Elephantia-
sis cura:

Trociscus
Ciros.

- C** antur, & educuntur. Locis uero contaminatione uulneratis, omnia stupida adhibenda sunt, quibus illa caro corrupta, & effoeminata, ualeat durari, uel stringi. His frequenter Cirus trociscus profuit, qui conficitur ex sinopide, alumine scisso, grugine, & cymino sub aqua ponderatione in aceto dispositus. Omnia etiam linimenta, uel fricamenta quæ pruritui in superioribus, nec non etiam scabiei conuenientia significauimus, etiam his apta, seu utilia asseueramus. Aliqui uero etiam illis carnes ut pereas ministrauerunt, quaternos digitos in mensura, tam in capite, quæ & a cauda præcidentes, quæ oleo & salibus condite profuerunt. Addis
- * de græco quamplurima.

¶ De LVXATIONIBVS.

Caput XXXIII.

- P**ER INITIA, ut moris est, primum auulsa reponenda
- * sunt locis suis. Item embrocis uti necesse est, ex herbi pollinibus, uel certe cineribus, oleo, sapone, & ouis commixtis, lanisque mollibus, infusis succis loca munienda sunt, & pro locorum natura, fasciis continenda, & constringenda. Si sub hoc adiutorio, loca naturaliter custodita quieuerint, eisdem usque ad perfectam sanitatem imminendum nobis erit.
- D** Si uero aliqua aduersitate, locis proprijs auulsa minime potuerint reuocari, tunc adiutorijs catholicis, doloribus crescentibus, subueniendum erit: ut est phlobotomus, uel catharticum, et cataplasmata paragonica. Quibus perseverantibus, si dolorum declinauerit inquietudo, fomento lauacri, crotarijs, uel certe emplastris casticis imminendum est. Postea uero malagmatibus perseverandum, quibus curanda loca possint perpetuo solidari.

COCTAVII HORATIANI in Secundum Operis sui
librum ad EVPORISTVM PRAEFATIO.



VNC secundi Operis partes aggrediar, quibus prodenda, discutiendaeq; rōnis delegauimus functionē. Quē qm̄ oculis cōprehendi non potest, qd officiū liber superior occupauit, idcirco passiones interiora possidentes, in hoc uolumine, aut accidentibus conuincēt, aut prodent īdicijs. Studio quippe ueritatis noli frustra disputatiōes ingerere, qn̄ potius in utroq; opere, certis, deprehensiq; morbis remedia cōstitui, uel curis medendo facilioribus, uel tuendo materiā uitiorū. Qñquidē in Logico ope obscurisq; piculis, non opus est assertore, sed iudice. Omnes acutę Febres uel ægritudines, de quibus nūc dicere cōstitui, aliqñ passiones præueniūt, aliquies cōsequunt, quæ certa prodūt indicia, quibus morborū possit materia cōprehendi. De chronicis uero secundis partibus promissos sermones expediā. Hæc est itaq; sub oīm ueterū autoritate febriū diffinitio, quibus etiā nos assensum libentissime accōmodamus. Inest nobis calor ignitus, qui cū se in altioribus p̄cordiorū locis, repētina aliqua necessitate cōmouerit, & uelut aduectus tēpestate, loca aliqua naturaliter quieta turbauerit, uaporē acriorē procurat, & tū quidem ex altitudine stomachi febriū serit originem.

CAPITA primæ partis LIB. II. De Acutis passionibus.

- | | |
|--|--------------------|
| 1 De Febribus | 2 De Phreneticis |
| 3 De Lethargicis | 2 De Pleureticis |
| 5 De Peripleumoniācis | 6 De Synanchicis |
| 7 De Apoplecticis | 8 De Hydrophobicis |
| 9 De Iliacis, Colicis, Strophosis | 10 De Spasmis |
| 11 De Satiriasi, uel impedimento usus ueneri | |
| 12 De Cardiacis, qui etiam Diaphoretici dicuntur | |
| 13 De Cholera | |

CAPITA Secundæ partis LIB. II. de passionib. Chronicis.

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1 De querelis Capitis | 2 De Epilepticis |
| 3 De Stomaticis | 2 De Menomenis, <i>μηνονομίας</i> |
| 5 De Melancholicis | 6 De Paralicis |
| 7 De Catarro | 8 De Phthisicis |
| 9 De Sanguis emissioe interior | 10 De Empyricis |
| 11 De Syntaxi, uel Atrophia | 12 De Asthmaticis, uel Suspiriosis |
| 13 De Epaticis | 12 De Ictericis |
| 15 De Splenicis | 16 De Stomachi uarijs accidētib. |
| 17 De Lumbricis | 18 De Dysentericis, uel lientericis |
| 19 De Hydropicis | 20 De Renum uitrijs, uel Vesicæ |
| 21 De Artriticis, Podagricis, Ischiaticis, | |

C LIBRI II, pars prima, De OXYORIS,
seu acutis passionibus.



De FEBRIBVS. Cap. I.

IC IGITVR ꝑmaxime omnibus in locis, siue di-
matibus, omniqꝫ ætate, morbis omnibus certa ex necessi-
tate uel imminētibus, uel præeuntibus, hæc sociantur.

Febricitantibus itaqꝫ generaliter omnibus, unum magnum remedium
cunctorum cautum est autoritate, præcipue seruire temporibus: ut per
conditionem caussarum ægri omnes, adiutorijs competentibus rele-
uentur, similiter etiam cibus congruis nutriantur. Conueniens profe-
cto, in utrisque aliquando congruum, bonum tempus. Possunt enim
in hijs officere, quæ æque utilia iudicarentur, si in competenti tempo-
re suggerantur. Docuit enim natura omnium gubernatrix, in ijs o-
mnium exagitationum, sub quacuncqꝫ sorte caussarum aduenientium,
quando præsentis commotionis tempestate, naturalis ille uapor turba-
tus, recessus interiores petierit, & cum * ex materia articulos frigus uel
tumor quassauerit, uel occupauerit, tunc nihil penitus a Medicis tenta-
ri, uel adhiberi debere. At uero imminente declinatione, transactis au-
gmentis, cum paulatim uapor exasperatus, omnia illa exteriora mem-
bra perfuderit, tunc adiutorijs potius competentibus seruiemus. Er-
go quomodo aliquando sub certis accidentibus manifesta declarantur
nomina passionum, sic aliquando simplex febrium imago conspicitur,
quæ uentris semper constrictionem procuret, capitis dolorem, linguæ
asperitatem, aliquando insomnietates, cum leuibus mentis erroribus.
Hæc etenim ex eadem Febrium origine, uapore naturaliter superiora
appetente, præcipue capiti sollicitata contingunt. Quæ accidentia licet
etiam in cæteris passionibus, cum alijs signis plurimis misceantur, tam-
en cum per se sola fuerint, febribus sociata, febrium magis simplicium
quam figuratarum speciem designare noscuntur. Ergo cum simpli-
cium Febrium causa constiterit, per initia commotionum, cum ad-
huc articulos possidet frigus, manibus calidis, uel uaporibus, cætera
omnia membra calefacta contineo: tunc etiam somnos inhihero, nihil
que aliud inhiheri permittam. Cum uero ex altitudine uapor exili-
ens, corpus omne calefecerit, & emergens inflammatio impatiens, uis-
cera uniuersa siccauerit, tunc post clysteris simplicis beneficium, etiam
enemate, quod ex sicco lini seminis, & oleo roseo, uel chamæmilo tem-
peratur, in uncijs tribus, igneis illis ardoribus succurrendum est.

Alias, * exte-
riora articu-
lorum.

D bra perfuderit, tunc adiutorijs potius competentibus seruiemus. Er-
go quomodo aliquando sub certis accidentibus manifesta declarantur
nomina passionum, sic aliquando simplex febrium imago conspicitur,
quæ uentris semper constrictionem procuret, capitis dolorem, linguæ
asperitatem, aliquando insomnietates, cum leuibus mentis erroribus.
Hæc etenim ex eadem Febrium origine, uapore naturaliter superiora
appetente, præcipue capiti sollicitata contingunt. Quæ accidentia licet
etiam in cæteris passionibus, cum alijs signis plurimis misceantur, tam-
en cum per se sola fuerint, febribus sociata, febrium magis simplicium
quam figuratarum speciem designare noscuntur. Ergo cum simpli-
cium Febrium causa constiterit, per initia commotionum, cum ad-
huc articulos possidet frigus, manibus calidis, uel uaporibus, cætera
omnia membra calefacta contineo: tunc etiam somnos inhihero, nihil
que aliud inhiheri permittam. Cum uero ex altitudine uapor exili-
ens, corpus omne calefecerit, & emergens inflammatio impatiens, uis-
cera uniuersa siccauerit, tunc post clysteris simplicis beneficium, etiam
enemate, quod ex sicco lini seminis, & oleo roseo, uel chamæmilo tem-
peratur, in uncijs tribus, igneis illis ardoribus succurrendum est.

Cura.

Enema.

At uero quinta transacta die, & primis iam temporibus ægritudinis
refrenatis, cum sub quadam maturitate qualitas causæ humanior ap-
paruerit, tunc post augmenta commotionis præsentis, lini semine, &
hordei pollinibus, cum aqua & oleo, ut moris est, præcordiorum lo-

ca iuuanda sunt: ex quo aut ignem illius commotionis temperemus; **A**
aut sudorem oportuno tempore procuremus.

Monitum te interea uolo, ex urinarū inspectione, supradictæ ægritudinis maturitatē, sic considerari debere. Aduertendū est itaq; ex urinis naturalibus & consuetis, quantū in contrariā partem natura deuiauerit: ut ex hoc, quid aut præsens status, aut futurus ægritudinis exitus allaturus sit, instruaris. Est autē urina naturaliter, quæ corporis eius qui emitit, sanitatē manifestat, rubra mediocriter, & subpinguis, & tactu calida, habens naturaliter nebulas, in aquā maxime appetentes. Quantitatē uero ex accepto nosse conueniet. Hæc itaq; cum inspexeris, de maturitate ægritudinis bene confidēs, adiutorijs cōpetentibus uisitabis. Superueniente igitur declinatione, tēporales cōmotiones, etiā prioribus adiutorijs procurato. Tunc & linguæ curationi, & cæteris, quæ cibos impedire consueuerunt, seruiendū erit. Aliquando etiam lixoperita pro cataplasmatis adhibita, q̄maxime profuerunt, quæ infundere ac nutrire magis, quā infrigidare corpora ardentia uideantur. Quæ conficere hoc modo consueuimus. Spuma argenti uncias tres, mellis ÷ III. succi lini seminis ÷ VIII. ceræ ÷ III. olei rosei, uel chamemelini libras. II. conficis ut moris est, et uteris in uicem cataplasmatis, cōmotiones cōpetenti tempore iuuaturus. His igitur adhibitis, simplices ægritudines sic uisitare consueuimus, usq; in plenam uisitationem: quo etiam lauacris adhibitis, & reparare sanitatem, & reparam custodire possimus. Igitur postq̄ illius ægritudinis species, quæ solis Febribus cum proprijs accidentibus designantur, hac pagina compendiose composui, in sequenti ordine, acutas omnes passiones, proprijs nominibus, atq; etiā accidentibus designabo. Sumimus itaq; initium de Phreneticis, febrium acutarum necessitate fluctuantibus, adiungentes adiutoria cōpetentia.

¶ De PHRENETICIS.

Caput II.

PHRENETICORVM causam, certa accidentia manifeste designant. Sunt enim acutæ febres, cum terribili mentis alienatione, sunt iuges insomnietates, ex mininge tensione, uel indignatione uenientes. Vnde quum speciale accidens, hos tantūmodo manifesta uerit, uel si floccos intensius legerint, cōmotionum temporibus, uti iam ante premonuimus, seruiendū est. Docet natura, exasperatis nulla penitus adiutoria admouenda, ex his præsertim, quæ importunis temporibus q̄maxime adhibita, nocere probata sunt. Per initia itaq; huiusce passionis, lucidum ac temperatū primo cubiculū prouidendum est. Ciborū obseruanda continētia. Et si prædicta adiutoria, quibus passio publicata est, intra tertiū diem apparuerint euidentia: & si nulla nos aut ætatis, aut temporis ratio remoretur, phlobotomo subueniemus, licet ad detractionem sanguinis, cunctatior * non facile peccauerit. Cum enim

Vrinæ ludicium.

B

Cubiculum Phrenetici.

Alias * cunctator.

C sanguinis, cōmodissimi elementi, copia laborantes, etiam alienis pos-
sint iuuari remedijs, eo sane detractio, uel amisso, difficile reparantur.

Venter.

Ventris item si constrictū fuerit officium, per clysterem simplicissi-
mum procurabo, mellicrato calido, oleum tantūmodo admiscens, nihil
asperum, neq; diureticæ qualitatis adiiciens. Certū est enim, febricitan-
tibus omnes collectiones miningæ sociari. Vini, uel aceti penitus in his
odori fugiendus est. Cibus humectus & lenior est adhibendus. Aps
tēporibus caput oleo roseo infundendū. Et si his adiutorijs contem-
ptis, passio augmēta perceperit, ita ut extensioribus uigilijs, & febribus,
& alienationibus adhuc molestissimis terreamur, oleum chamemilinū,
uel anethinū calidum, in quo papauer, uel lactucæ semina, uel menthæ,
uel hederæ succos coxeris, miscebis, & eorū capita frequētius irrigabis.

Cibus.

Vigiliæ.

Si uero impatientius se luctando quassauerint, quod est omnibus ui-
gilantibus accidens speciale, mollibus ligaturis fasciarū alligatos quiesce-
re faciemus. Etenim plus incōmodi accidere poterit ex uigilijs inquietis,
q̃ si inter luctationes nimias intercepti, uiribus fatigent. Vultus eorū
ante cibos, aqua calida, ubi agreste papauer, aut lactucæ semen, & cate-
ra illa quæ significamus decoxeris fomentent. Similiter etiā articuli eorū

Vultus.

Articuli.

Lingua.

D ni seminis irrigent. Febribus etenim perseverantibus, ægri amplius
siccitate linguæ quatiunt. Lectus eorū suspendendus est, & ad uicem
gestationis agitando. Frequenter enim, ex illa lecti motione, ueluti &
mētis oculis, & mentibus occupatis, somnos his dulcissimos procura-
bimus. Media eorū, consideratis tēporibus, oleo dulci calido fomen-
tanda sunt, aliquādo mixta aqua calida pertigmatibus infundenda. Si-
militer etiam inguen eorū, huic tēp maxime compatiens aegritudini. Fre-
quenter etiam seminum cataplasmatibus media eorum iuuanda erunt.

Media.

Rasura ca-
pillorum.

Iuuat interea multum detonsio capillorum, aut si raso capite admotæ
cucurbitæ, cū sanguinis detractioe adhibeant. Ex hoc etenim adiuto-
rio, quantū sæpe probatū est, ad plenā causæ perducit digestioe.

Hæc est amice, simplex Phreneticorum medicina, quæ naturæ bene-
ficijs, & adiutorijs sic ordinatis, competenti tēpore adhibitis, continet.
His etenim rite custoditis, facilius potest aegritudo uicta succumbere.

Phrenetico-
rū, & Lethar-
gicorum dif-
ferentia.

¶ De LETHARGICIS. Caput III.
LETHARGICIS & Phreneticis simile est capitis aut mi-
ningæ sub extensione uel constrictione periculum, utriq; acutis
febribus agitantur. His tamē accidentibus differunt: quod Phrenetici,
manentibus insomniatibus & alienationibus eriguntur. Lethargici
uero sub simili incōmoditate uigiliarū, grauedine molestissima, & falso
ueluti somno, molestius deprimunt. Sunt hæ differentiæ, ex simili passi-
one subortæ, ita tamē, ut plus lethargici periclitent. Nam phrenetici am-
plius grauati, lethargici sunt: Lethargici uero reuelati, in phreneticos

mutantur. Vna est ergo & æqualis in utrisq; causa uitiõrum, eadem & iam in uisitando diligetia esse debebat. Sed phreneticis quies & patientia indicenda est: lethargicis uigiliæ procurandæ sunt. Ergo lethargicis foris capitis simplex adhibendus est, ut phreneticis: exceptis herbis illis, uel seminibus saporibus afferentibus, quibus media præcordiorum similiter adiuuanda sunt. Lingue siccitas eodẽ modo riganda, ritẽq; uentris officium procurandũ. Caput quoq; sic detractione sanguinis releuari debet. Vno eodemq; modo, uel tẽpore, etiam ciborum qualitate nutriendi sunt. Vnũ tamen præcipue curandũ, ut si per spinas tantũmodo admonitionẽ febres adhuc acutas perseverare intellexeris, frequẽtibus eos sternutamentis releues, tunc acerbis adiutorijs ptarmicis imminere nos cõueniet, in lucido sane & tẽperato cubiculo. Articulos uero eorum ungo frequenter oleo ueteri, uel cucumeratio, mixto nonnunq; nitro, aut pipere, aut castoreo: et uncta sollicitius defricabo. Et si frigidi adhuc fuerint, etiam sinapi puluerẽ admisceo. Nam & aliqui etiã sanguifugas fronti eorum, uel temporibus recte adhibuerunt. Perseueranti uero grauedine, & sensus occupatione demeritis, expedit accipere ad mensuram cochlearis unius cum mellicrato castorei puluerem. Expedit etiã apoplegmatisare ex oxymelle, & hyssopi, aut origani, aut thymi, aut pulegij, aut rutæ decoctionibus. Et si adhuc ista ueterẽ capitis depressiõem non deponant, etiã sinapismus adhibendus erit, unguenta quoq; ex castoreo, & oleo sicionio. Iam tunc etiã odores naribus admouendi ex castoreo, pulegio, origano, thymo, & baccis lauri. Hoc & ex cornu ceruinũ, & galbano fieri, cõmodum probauimus. Hęc igitur grauatis lethargicis adhibenda sunt, ubi febrium acutarum non interuenerit necessitas, quæ quidem nos omnia eis quæ phreneticis accõmodari solent adiutoria, uel illis similia adhibere compellit.

πάρμικα,
adiutoria uo-
cat, quæ ster-
nutationẽ p-
uocent.

DE PLEURETICIS. Caput III.
PLEURETICORVM hæc est certissima definitio. Dolor insustentabili, & perseveranti, circa interiora lateris afficiuntur, Febribus æque acutis minime desistentibus: & tussi molestissima compressi, sputa uaria eijcient. Super quod latus iacuerint, tolerabilius asseuerant. Nam loci dolentis, ad saniores partes in tempore demigrat pressa materia, ac tum loca ipsa languentia releuantur. Febrium itaque temporibus seruientes, adiutoria & cibos congruos adhibebo. Cubiculum procurabo calidum & lucidum. Ex initio mellicraton ex despumato melle suggeram, omni ægritudinis tempore ministrandum.

Pleureticorum
accidentia.

Interea si statim nos augmenta terruerint, retractantes ægrotantis ætatem, temporis qualitatem, prouinciarum naturam, intra tertium diem phlebotomo subuenire nos conuenit. Item uentris officium procurandum est, aut balanum supponendo, aut clisterem simpliciore.

Lateri uero dolenti, ex oleo samfucino calido fomentum adhibeo, et

βάλανον, glās.
Balanũ, pessariũ,
seu pessũ
in farglãdis.

C Ex samfuci puluere, uel rutæ siccae, loca affatim aspergo dolentia. Post uero succidas, aut sulphuratas calefactas lanas appono, uarijs & frequentibus cæteris uaporibus loca mitigabo: & aliquando faccellis ex cantabro: aliquando ex milio, uel salibus calefactis, aliquando oleo superpradicto samfucino, uel rutaceo adiecto, uesticam uaporamus. Adhibemus etiam uentosarū suis temporibus aptissimū adiutorium. Perseuerantibus uero doloribus, etiam cataplasmata calastica cum melle de seminibus addo, detrahēs semen fenogreci. Febrientibus caput semper dolore & inflatione sollicitatur, quod expertus es. Cibos uero usque ad ægritudinis digestionem, cōmodis tēporibus, matutinis q̄maxime, forbiles ministrabo, & calidos. Semper em̄ naturę certa ratione, uesper tinæ horæ crassiores accessus, ægros animos ad tristitias quasdam adducūt, et uita ueluti renasci cōgunt, cōmotionem interea addētes. Eoq̄ facilius ægritudinem refrēnabis, si per dies singulos semel tantūmodo cibos adhibeas. Sub hac igitur uisitacione, si necdum ægritudinis augmenta recesserint, diebus pluribus ex mellicrato, aut hyslopum, aut rutam uiridem decoquam, & ex hoc frequenter eos potabo. Locis ue-

ἰχθα.

D ro impatienter dolentibus, etiam ἰχθαῦς uestionis impono. Ita etenim frequenter ad peripulemoniacoꝝ non permittetur æger uicina peruenire pericula. Dolentes uero latus sine febribus, & cæteris accidentibus pleureticorū remotis, quos iam non pleureticos, sed latus dolentes proprie appellabo, ex subiectis alia diligentia uisitamus. Piper, uel cyminiū, uel castoreum, aut rutam siccam terentes, mellicratoq̄ miscēntes, potui dabimus. Oxyporia adhibenda erunt. Item acopo calido, cōmixto opobalsamo, aut glaucino, aut laurino, latus ipsum est perungēdum, & fricandū. Quibus adhibitis, si necdum dolor quieuerit, super illam decoctionē quam superius ordinauimus, fraxini radicem, aut caparis admiscebo. Dabo interea etiam antidota apta frequenter pleureticis, superaddens samfuci puluerem, ἴσδ̄em semper adiutorium cōmodissimū. Nam & emplastra, uel malaginata, his sapissime profuerunt, ex rutæ foliorū uiridum contritorū, cum axungia, et cetera q̄ plurima, quæ sibi quisq̄ in tempore causæ probatæ utilia esse cognouerit.

Contra do-
lorem laterū.

Peripleuma-
ticorū acci-
dentia.

P **DE PERIPLEVMONIA CIS.** Cap. V.
PERIPLEVMONIA COS hæc accidentia manifestant. Febres acutæ, thoracis pondus, quod etiam laterū sollicitet uicinietatem. lacere supini non facile patiuntur, sed magis sedendo releuantur, Facies attestantur infectas ueluti quodam rubore genas. Anhelitū tardū, & suspiriū patiuntur. Tussiuñ frequenter, sputa sanguinea & fordidā digerunt, pulmonis periculū designantia. His primo lucidū, & calidū, utpote calasticū cubiculum prouidendū est. His febrū temporibus seruens, adiutoria, et cibos moderatius administabo. E succis ptisanæ, aut alicæ, mellis quippiam despumati habētibus, mellicraton

faciendum est: sicuti etiam in Pleureticis ordinatum est: cui concoqui debet ruta uiridis, hyssopus, uel origanum, aut Iris Illyrica, quæ quæmaxime perseveranti tussiculæ mederi consuevit. Si uero digestio sputorum tarda, & difficilis fuerit, uel si pectora eorum uiscosa quadam pinguedine percludantur, ad mensuram cochlearis, ieiunos recentis butyri frequenter accæptione iuuamus. Ventris officium assidue procurabo. Thoraci eorum, hoc est, pectori, adiutoria omnia Pleureticorum adhibeo, tam in fomentis, quæ in cataplasmatibus, cæterisque uaporibus constituta. Carotaria quoque ex oleo cyprino, habentia sinapi puluerem, adhibenda sunt: quibus ad exteriorem cutim, pulmonis laborantis, causa interior prouocetur. Nam & uentosa imposita par beneficium etiam mitigando præstiterunt. In declinatione uero huiusmodi ægritudinis, emplastris, & malagmatibus amygdicis pro tempore aptis uti nos conueniet, nec non & humanioribus lauacris, cæterisque, quibus ex tanta ægritudine, reparare membra lassiora, & roborare possimus.

De SYNANCHICIS. Caput VI.

DVPLEX Synanchicorum species. Vna quæ cum tumore nimio, uel indignatione gutturis, & uuæ, & faucium, & uicinarum partium efficitur. Altera sine tumore, iisdem tamē inhaerentibus signis, uel accidentibus: quæ plus periculi facere consueuerunt. Meatus utriusque in transglutiendo difficilis fiet, & de conclusionem eorum locorum, uel suspitio, uel etiam nauseando periclitantur. Hi hoc modo curandi erunt. Cubiculum maius, & calidum procurandum est. Clysteris ardore officium uentris cogemus. Et si ætas eorum adhuc calidior fuerit, phlebotomo liberantur ex uenis sub lingua apparentibus, eo sane tempore, quo necessitas coegerit detractionis. Vbi enim febrium timor defuerit, etiam post tertiam diem sanguinis detractio non negatur. Gargari smatis uero has causas faucium, frequentissime tali modo nouimus reuolui. Mellicrato, in quo aut cantabrum coquendum est, aut ficus sicæ, aut gallæ quassatæ, aut rosa sicca, aut lenticula, aut omphacium, aliqua ex his, aut certe omnia, ut superius conteximus, concoquenda erunt. Nam Andronici trociscus omnibus merito approbatus, si cum passo, aut careno teratur, & molli penna his locis adhibeatur, satis iuuat. Sic etiam de flore rosarum, & alumine scisso, & de phrygio lapide simul combusto, confectus puluis, similiter temperatus, commodius adhibetur: & cætera medicamenta: ut anthera, & his similia, anteriorum compositione probata. Interea saccellis, uel fomentis, cataplasmatibusque calasticis, & paragoricis, locis faucium periclitantibus, & pectoris uicinis partibus imminebo. Cibis uero temporibus competentibus humidis, calidis, & tenuioribus nutriendi sunt. Acutæ etenim ægritudines, utilius gubernari non poterunt.

Synanchia duplex.

B
Synanchicorum accidentia.

Cura.

Andronici Trociscus.

C

Apoplectici,
unde dicti.

¶ De APOPLECTICIS. Cap. VII.

APOPLECTICI appellati sunt, eo quod veluti ictu quodam repentino percutiantur: uel quod frigidissimi cum totius corporis desperatione, & grauedine iaceant, sine sensu etiā. Hæc quidem passio acuta est, et nunquam penitus sociata cum chronicis, nimium sollicita, sine febribus tamen. De his igitur Hippocrates noster, huius professionis autor, sic sua sententia iudicauit. Apoplecticos, inquit, grauiter occupatos, nullo penitus pacto curari posse: leuiiores attamen, licet difficile liberari. Huic etiam ego obediens, hoc sic suadeo obseruari: ut eos quos sine sensu penitus iacentes inspexeris, & nimium frigidos, anhelantesque, tantummodo plena sub desperatione agere pronuncies.

Hippocrates
in Aphorif.

Cura.

Quos uero leuiiores, ut dixi, & aliqua parte sensum proprium continent, sono narium respirare conspexeris, penna prolixiore inter ora faucium attingendo, si fieri potest, cibos, aut flegmata per uentum reijcere compelles. Sternutamentis acrioribus, eorum capita commouenda sunt. Vnguentis, uel fricamentis, acrioribus, & calidis, omnes eorum articulos, mixto nitro, & pipere, infundere suadeo. Extremi- tatem uero intestini, taurino felle tangendam, aut puluere staphisagriae, quam syluaticam uuam appellant. Balanos supponimus acres, & thermanticos. Consueuerunt enim his adiutorijs coacti, *ενύδα*, uel urinas, uel phlegmata frequenter extrudere. Cognoscentibus uero, & respondentibus, intrepide phlebotomum adhibeo. Si tamen nimium fenes non fuerint, succis eos ptisanæ, uel alicæ, cum oxymelle gubernabo. Aquam calidam potui dabo. Cum uero transactio periculo præfenti, ad paralysin, ut frequenter contingit, causa fuerit deriuata, suo tempore, quum de paralysi tractaturi sumus, etiam eorum ordinabo remedia.

Accidentia
Hydropho-
bici.

Cura.

¶ De HYDROPHOBICIS. Cap. VIII.

HYDROPHOBICORVM causam, aliqui ex morfu canis rabiosi, aliqui ex serpentium uenire assueuerant. Sed has origines sollicite nos scrutari superfluum est. occupatos etenim hoc morbo molesto, nil iuuat originem didicisse. Igitur cum initia huius manifesta fuerint passionis, emergit primo ueluti quædam irrationabilis animi respiratio, repentina, & frequentes iracundiæ. Item pigrescunt ad omnia, insomnietates, uel certe somnos terribiles patiuntur. His & stomachi grauedo, cum corruptela ciborum emergit, lauacrorum incon- sueta uitatio. Aerem serenum, ueluti plumosum perhorrescunt. Vitare etiam bibendi consuetudinē tentant. At uero, cum passio eos plena possederit, quantum in desideranda potione hic accesserit desiderij, tantum timoris in accipiendo generatur. Ad hæc phlebotomo prius occurrendum est, si nos nulla prohibuerint cætera præiudicia, ut superius dictum est, quando necessitas cõegerit temporis. Vbi enim febrium timor desue-

rit, etiam post tertium diem detractio sanguinis non negatur. Item dabo gentianæ radicis puluerem, in melliscrato coctear unum: diatheriacon dabo, coagulum leporis tritum, similiter cum melliscrato. Dabo etiam canum catulorum coagulum. Dabo etiam cancrorum fluuiatiliu puluerem com bustorum. Vulnera autem eorum a plena sanatione, ut possimus differemus, admo uendo medicamenta quæ debent mitti, & sordida eadem uulnera faciam permanere. Admo ueo interea etiam languifugas, admo ueo caustica. Patientium enim locorum uenenati humores minime poterunt prohibere digestionem. Pectus eorum, uel stomachum, seminum chalafticis cataplasmatibus adiuuabo. Iuuabo etiam carotario, ex aloë & mastiche, & nardino oleo temperato. Caput eorum oleo anethino, uel chamæmilino tepido infundo. Vomitus & clysteribus releuandi erunt. Stomacho uentosas impono frequenter cucurbitas, & unguentis ex sam fugo herba, uel absinthio confectis, præcordia perfricabo. Cogo interea & suadeo per interualla, ut ad balneas accedant, & solo fomento calido eos posse iuari asseuerabo. Procurabo cibos cum saporiferis speciebus: sed si in tempore non deerit, etiam sagapenum, aut laser admisceo.

DE ILIACIS, COLICIS, & STRO

PHICIS. Caput IX.

ILIIACORVM, Colicorum, & Strophicorum similis est omnibus doloris molestia, diuersis attamen accidentibus separantur. Strophus est leuis uentris tantummodo dolor: & leui adiutorio aut uaporum, aut uentris expositione, aut lauacrorum fomentatione cõpescitur. Colicorum uero intestini unius querela grauissima est, & frequenter lege chronica, statutis & præfinitis ueluti temporibus comouentur: ut iam temporis magis molestiam, quam uitæ periculum reformident. Iliacorum autem passio, de qua nunc nobis tractatus interponitur, acuta est, & sub augusto tempore periculosa. Primo, quod uentosus illis est stomachus, uentositate tenduntur: uescicæ, inguinum, coxarum, & omnium uicinarum partium doloribus opprimuntur. Scybalorum interclutione nimia conligantur, usque adeo, ut etiam clystere acri adhibito, non simum, sed uentositatem solam inutilem egerere uideantur. Salutarum frequentium profluuium per seueranti, coguntur in nauseam: ut non solum phlegmata, uel humores, sed etiam horribili uisu stercore cogantur egerere. Ad hæc igitur accidentia quantis possumus adiutorijs hoc ordine succurrendum est.

Vaporibus frequentibus, & cataplasmatibus de cymithi puluere, & sinapis semine temperatis immineo: iniectionibus quoque ex supradictarum specierum decoctione confectis. Admiscens succos fenograci, quibus rura uiridis concoquenda erit. Item etiam ex oleo roseo, mixtis anserinis adipibus, aut castorei puluere, cum oleo uetustissimo. Vtilius si ex laurino, uel glaucino temperentur. Vnum uentosus, cucurbitis ignotioribus, uiolentius euellendis. Et si adhuc doloris molestia perse

A

B

Strophus.

Colica
passio.

Iliaca passio.

Cura.

C uerauerit, phlebotomum adhibeo, perseverando tamen fricationibus, uel fabanis calidis. Scybalorum uero egerendorum causa primo eos chalaistico clystere compello. Qui si contenti fuerint, in secundis acrioribus intumescere, colocynthidas decoquens cum succo betarum, & similibus cæteris, asperere prouocantibus. Si uero ex sumptione potionis uenenosæ perceptæ, hoc euenire cognoueris, theriacā cum uino dare conueniet. Ventre prouocabis ex lacte decocto, quod schiston aliqui uocauerunt, in quo coqui facies, uel dissolui, aut aloë, aut scammonëam. Ad dis etiam adiutoria de græco euporiston compendiosa.

Lac exierit
est, quod coa-
gulat postq̃
ferū inde abs-
trahitur.

Spasmus.

¶ De SPASMIS. Caput x.

S P A S M V S appellatus est ex tensione, uel protractione neruorum, & uicinarum musculorum, ceruicis q̃maxime impatienti dolori compatientis, ut etiam ad respondendum os facile aperire non possint. Nam sub hoc titulo Spasmi, uariæ sunt huius passionis figuræ.

Spasmus per omne corpus extensionē rigidam, temporalem quidem habet: sub qua ita tenduntur, ut sub uno schemate iacentes, tensione molesta, & inflexibili teneant. Quos uero pronos contractio habet, Emprostothonicos dicimus: quos aut ad posteriora reclinatos, Opisthotonicos appellamus. Hæc accidentia, corporibus frequenter sine febribus euenire consueuerunt. Quod si febres Spasmiss superuenierint, causam solunt. Spasmi autē superuenientes febribus, uitæ semper periculū minantur. Sed hæc supradictæ discretionēs, una eademq̃ medicina diligenter uisitantur.

Эмпрототоникі.
опистотоникі.

Cura.

Primis diebus comodius phlebotomo suauiter utendum est: si tamen postea etiā omnia adiutoria competentia minime prætermittas. Fricamentis, uel unctionibus omnia loca diligentius mitiganda sunt, uino & oleo temperatis, cubiculo calido et lucido procurato. Neruis uero tensis, & flexibilibus, fomenta uel sola ex oleo caustico, & calidissimo temperabo. Cucurbitas, cum detractioe sanguinis, competenti tempore adhibeo, uentrē procurabo ex clystere simpliciore. Cibis cūgruis, digestibilibus nutrio: ut sunt oua * tomātula, buccellæ candidæ, in aqua calida maceratæ. Frequenter etiā mellicrato infusæ, inferendę erūt. Et si adiutorijs supradictis releuari, etiā oris coeperint impedimento carere, malas & minutos pisciculos anethino iusculo discostos, plenā iam confidentia subministrabo. Frequenter etiā cum * emplasmate ex hydromelle temperato, lactis his copia neganda non erit. Omnibus uero tensionibus, post fomenta chalaistica, ex oleo sicionio unctionem adhibeo, & cepa calidiore, & cataplasmate chalaistico loca diutius mitigabo. Post clysterem uero chalaisticum, expositis scybalis, enemate uti nos conuenit, ex oleo rutaceo, commixto castoreo. Conueniet etiam locis ipsis, de sacculis calidis adhibere saccellos. Nam & carbonibus proxime calentibus, lectos & stramina calidiora procurabis. Carotaria, uel acopā, ex oleo cyprino his frequenter adhibenda sunt. Et adipēs leonum galbano

Alias, * Halapala.
Sunt autē Halapala oua recetia, quorū cortex nondum iuduruit.

Alias, * anommelle.

cōmixti, par beneficium procurant. Dabo etiam interea potiones huiusmodi, Castorei puluerem cum mellicrato, aliquoties his piper intermiscens. Silphium cum pipere, & mellicrato similiter. Dabo etiam diureticas potiones. Dabo somniferas. Curabo etiam per aquarum naturaliter calidarum beneficia. Nam post declinationem ægritudinis, natura hijs uentris beneficia procurare consuevit.

S De SATIRIASI, uel impedimento usus Venerei. Cap. xi.

SATIRIASIS, Gonorrhææ, uel Priapismi, similis est sub immoderata patratione molestia, quæ his accidentibus determinantur.

Gonorrhæa sine ueretri extensione, uel usus desyderio, spermatis affluētissima sub effusione, corpora debilitat, & per chronica tempora producit. Satiriæ uero ex certa corporis incommoditate, quæ etiam mulieribus aliquando eontingit, desyderiū insatiabile, & tensionem parit, cum assidua patratione auidissimā facit: & licet sine febribus, at tamen inter acutas, & temporales ægritudines numeratur. Hanc passionem Priapismum aliqui appellauerunt. Sic itaque curandi erunt, qui de utriusque cognomentis ægrotant. Frequentatione palestræ, per initia omne eorum corpus exerceo. Post identidem penitus quiescendum est. Vapores stipticos, ubi iam sub tegmine, uel munimine totius corporis bene fuerint dispositi, supponimus, uaporem calefactum ex acacia, uel hippoquistide, uel cicutæ herbæ succo, contrito, & resoluta. Tunc ipsius partibus superaddimus fricationem unam sabanorum paulo asperiorum. Cibos stipticos omneis cum aceto ministrabo, uitans calidos, & qui inflationem poterunt concitare corporibus. Hi etenim frequenter usum erigere uenereum consueuerunt. Sic etiam potus subministrandus erit. Sed tamen omnia hæc mediocriter, & rarius exhibenda sunt, ut ex hoc ueluti famem, uel sitim procurare possimus. Si uero passionis huius molestia diutius perseuerauerit, ut tensio & desyderium impatientissime protendantur, laminam plumbi, renibus & partibus uicinis appono. Nam & uentosis cucurbitis assiduis, eadem loca fatiganda sunt. Dropaces quoque imponendi erunt. Ab omnibus carnosis cibis, & multum nutrientibus abstinendi sunt. Ab odoribus bonis, uel thymiamatibus. Ab aspectu, uel cōmunionē pulchrarum penitus figurarum, ut neque tangendi, neque uisendi eis copia præbeatur. Quibus uero, aut ætatis uergentis defectio, aut morbus locis residens, ueluti iam frigentibus, usus uenerei officium pernegarint, his contrarijs adiutorijs famulabor. Conuenit exercitio uti mediocri, fricationibus quæ maxime locorum inferiorum, & inguinum, ex pipere, uel euforbio, uel similibus speciebus, quæ erigendo uigorem, desyderium, uel usum ualeant ministrare uenereum. Etiam horum dropaces adhibeo renibus, uel inguinibus, & ex eodē balanos. Cibis calidioribus utar, instantibus, uel erigen-

A

Gonorrhæa.

Satiriæ.

Priapismus.

B

Pro Frigidis.

* C
Alias, ceno-
melite.

Infra lib. 4.

tibus membra frigētia. ut est uinum boni odoris, uel * hydromel, alica, amyllum, pinei nuclei, porri, eruca, bulbi etiam, & similia, quæ per potiones accepta, uirile semper officium reparauerunt. Et piper, satyrion, & stinchus, & erui semina, & cætera adiutoria, par beneficiū ministrantia, quæ in libro Physicorum cōmodius disponimus. Interea eos quiescere cōuenit, non solū noctis spacijs, uerum etiā diei: uti plumis, & mollioribus opertorijs, uel stranietis cōuenit. Interea puellarum speciosarū, uel puerorū similiter seruitium procurandū est. Vti sane lectionibus animū ad delicias pertrahentibus. ut sunt Amphipolyti, Philippi, & Herodiani, aut certe Syrii, Ambulij, uel ceteris suauiter amatorias fabulas describentibus.

De CARDIACIS, qui etiam dia-
phoretici. Caput XII.

Cardiaca.

LICET quamplurimorū sententiæ ita definierint, sicuti hæc eadem professio nominis attestatur, cordis initio hanc ægritudinem fieri, hys ego tamē non facile accōmodabo sensum. Nunquā etenim clauit indicium manifestum, quo tentari in aliquo naturā cordis intelligerem. Est autē totius corporis, et uirium plena resolutio, quam *καρδιακὴν διαφύεσιν* appellamus. Hanc sudor uiscosus & frigidus perseverans, interemptis uiribus manifestat. præeuntibus attamen acutis febribus, & flammarū interiorum ardoribus. Quem morbum aliqui Causon appellauerunt.

D Hæc igitur passio frequentius iuuenibus, quā cæteris ætatibus euenire consuevit, in augmento ægritudinis, hoc est, circa diem sextum, & quā maxime eo tempore, quo æstas calidior incanduerit. Licet ergo in omnibus generaliter malarū ægritudinum necessitatibus, ualde promouerit, si gubernantibus temporibus seruiamus, attamen magna uis, & periculo interposito, dum sudoris illius emerferit iniquitas, cum uirium defectu, & ex eo præsens uitæ periculū, tunc confusis & prætermisissis temporum rationibus, adiutorijs competentibus imminemus: & nunc cubiculum frigidum, nunc lectum stramentis ueteribus lineis dispositum, nunc flabella, nunc quoque pannos nardo & uino infusos, præcordijs eorum ordine imponimus. Cataplasmata quoque frigida, & stiptica imponenda sunt eorum præcordijs, strichnon, aut aizoon, aut rubus, aut thebaicus dactylus, aut caduca mali granati, uel cenanthes grana. Certissimum est etenim, singularū specierum merita, quemque medicū bene cognoscentem, uel etiā temperamenta, siue cōmixtionem adiutoriorū facile posse desponere. Faciem ergo eorū ex pulsa frigida, uel niro stiptico fomentabo. Pulueribus aspergo membra sudantia, menthæ, uel rosarum folijs, siccis, contusis, & cribellatis, gypsi, naxi, mannæ thuris, gallarum, singulis tunsis, & cōmixtis, cū uino stiptico, uel eius fecibus: simul mixtis odoribus bonis, uel thymiamatibus, uires labentes, & mēbra confidentia reparabo. Articulos eorū oleo cucumeratio, uel nimis uetusto,

mixto puluere nitri, uel piperis, pyretri, uel adarces, uel urticę feminibus defricabo, uel infundo: quo calorem ingenitum emoriente, reparare alia quatenus ualeamus. Nutriā succis modicis, sed frequētiōribus, frigidis tamē, quibus sudoris feralis abundātia uires emorientes exuscitem. Nutrio potādo, ut potero: nutrio similiter per clysterē, aut alicę, aut ptisanę succis, ut supra dixi, in qbus ungulas porcorę, usq; in plenā earę decocti onē concoqui suadeo. Aquā frigidā per interualla similiter subministra bo: & si ætatis adhuc uapor calidior cōegerit, niuatas non aspernabor.

¶ De CHOLERA. Caput XIII.

CHOLERA passio molesta, sub angusto tempore sollicita, omnibus acutis ægitudinibus uelocior. Nam hæc sub uno die desperata, ut frequenter experti sumus, uitæ terminū fecit, dum subitanei uomitus, uentris quoq; imminere effusiones, sub dolore nimio præcordiorū, uel totius corporis, interiorem omnē sæpe substantiā effuderunt. Est etiā hoc simile in Diarrhiā periculū. Sed eo distat, quod diarrhiaci sola uentris molestia, et sub longo tractu temporū, aliquoties fatigantur. Cholera uero ex utrisq; effusionibus sæpe, & sub angusto tempore homines pernecauit. Ergo cū interiora præcordiorū, humorum minaciū prius occupauerit conglobatio, ut ecthlipses, uel angustias, nimias quoq; dolores efficiat, tunc nos aquā calidam in tempore porrigimus, & per uomitus procurabimus digestionē. At cum per uias expulsionis eorū, impetus torrens & repentinus eruperit, ita ut ex utrisq; terribilis effundat, sic, si possumus præsens periculū remouemus. Oleo calido omne eorū corpus infundimus, articulos fasciolis astringimus: neruos omnes, & loca contrahentia, lanis infusis eodē oleo calidissimis munimus. Utimur quoq; etiā carotario, & nardino oleo, & cyprino, et glaucino, aut irino temperato. Si uero intercēptis uiribus, plena fuerit desperatio, odores, uel thymiamata his propter reparationem adhibebimus. Cibos dabimus competentes, succos lentis cum aceto, oua hapala, uuām fabriciam, buccellas mero infusas, ungulas porcorum, uel iuscellum gallinarū, concoques strichnum, uel aizoon, aut rubum. Dabo potū frigidum, dabo niuatā, columbos matri subductos. His etiam perdices eodē modo cōuenit ministrare. Cataplasmata uero omnia adhibenda sunt, quæ diaphoreticis ordinata sunt. Febris uero interpositis, consyderatis temporibus seruiendum est. Intensius tamen effusionum sollicitudini militabo. In quibus sæpe etiam sanguinis superuenientis effusio, uitæ periculum procurauit.

¶ LIBRI II. Pars Secunda. De passionibus Chronicis.

OMISSIS ACUTIS passionibus, quæ certa lege ægitudinum propriarum, febribus aliquando sociantur, eisquē iam partim publicatis, ad Chronicas descendemus, quibus aliquando

A

Cholerica passio.

Diarrhiā a Cholera differt.

Cura.

Cholera defestio est spiritus, alias uocatur.

B

C febres superuenientes, sub longo tractu passionum, ueluti temporales commotiones assimulant. Etiam in ipsis ordinem dispositum custodientes, initium de capitis querelis accidentibus ordiemur.

¶ De querelis CAPITIS. Caput. I.



DVERELAE CAPITIS, uarijs frequēter accidentibus superueniūt. Aliquando de uapore, uel de frigore, uel ceteris rationibus accidere uident. Igitur quādo de uapore dolor infederit capiti, tunc accidens ille dolor, cū uapore quodam, et uenarū inflatione con-

cutitur. Tunc oculi sanguinei, tunc etiā insomnietates nimie procurant. His gremialis olei infusio adhibenda erit. Quæ si forte dolorē non com-
pescuerit, oleū roseum adhibemus. Cuius si copia defuerit, gremialis supradicti quatuor partibus, rosea uua erit aceto miscenda. Si uero maior uis uaporis, frigidiora exegerit adiutoria, superaddimus auxilio aut polygonij succū, aut arnoglōssæ, aut portulacæ, aut uuarū immaturarum. Quiescere aut debebunt locis frigidis, quorū pauimētis spargenda erūt folia uiridia, aut rubi, aut hederæ, quæ graueolentia non sint, & competenter infrigidare sufficiant. Si uero de frigore caput fuerit inquietat-

Ex frigore.

Dthino oleo, uel rutaceo calido cōueniet somnari. Et si superaddi aliiquid adiutorio debere caloris aduerteris, aut agrestis cucumeris radix, aut eu forbiū, uel certe castoreum superaddendū est. Nam & laurinū oleum, uel irinum, uel glaucinū similiter adhibendū est. Quando aut ab ex-

anathymiasis.

halatione inferiorū, quam *anathymiasis* appellamus, caput fuerit sollicitatū, tunc ille dolor per interualla subcutiens, cū saltu quodam uenarū, caput sollicitat: tunc q̄maxime uertigines, tunc oculorū obscuritates emergūt, querelis attamen aliquibus pulsantibus etiā precordiorū loca. His ergo primo uentris solutiō procuranda est, & cubiculi tēperies prouidenda, & ad releuationē eius post cibos uomitus procurandus, sternutamenta frequētia: si tamen nullū februm indicium interuenerit. Caput uero oleo dulci calido adiuuandū est, cui aceti quippiam cōmisceri debet: unde su peruolantis ad superiora uaporis inquietudo, aliquatenus reprimitur. Somni arcendi sunt, diurni q̄maxime: & ciborū prohibenda præsum-

Ex indigestione.

ptio. Frequenter hæc uitia indigestionis causa emergente cōtingunt. Nam & doloris tunc uehemētia, atq; subita uocis interclusione periclitant. Quibus hoc pacto subueniemus, si eo tēpore uomētibus, post continuo eorū auribus oleum myrtinū, uel anethinū, uel nardinū infundatur. Capiti etiā, ex his somēta calidiora adhibeant. Si uero ex uini potione caput fuerit dolore pulsatū, quod ex natura huic frequēter euenire cōsueuit, ea cōueniet adhibere, q̄ his adhibent, q̄bus ex anathymiasis ca-

Ex uini immoderata repletionē.

put fuerit inquietatum. Olei etiam rosei fomentū est applicandum. His lauacra serotina permittenda sunt, somni uel quiescendi patientia procuranda. Tunc cibi competentes, ut ptisanæ succus, & oua recentia, panes ex aqua calida, caules decocti, aquæ calidæ potio, & lactucarum beneficium frigidarum. His etiam adiutorijs adhibitis, uaporis ad caput ascendentis deprimi importunitas consuevit. Sed quoniā his causis, aquæ calidæ potionem diximus posse beneficium ministrare, frequentius intēdendum est, ne ex ea resolutio stomachi procuretur. Quæ si euenerit, tunc apiorum, uel citoniorum decoctioni uinum est immittendum, quod stomachum ualeat reparare. Omni modo, omnes uitandi sunt dactyli. Specialiter etenim ex natura sua contrariantur, quæcūq; ex suauibus fuerint confectæ potiones. Tunc ad lauacrum calidum protinus festinandum est, in quibus ore aquam calidam, in cellis calidioribus sustinentes, uaporem omnem transigant lauacrorum. Si ad ciborum ergo continentiam, frequentiamque lauacrorum, & cætera supradicta adiutoria minus fuerint releuati, olei tunc rosei ulterius adiutorium euitandum est, atq; chamæmilini, uel anethini beneficium est apponendum. Si uero caussis ueluti incertis, caput doluerit, fronti linimenta hæc superadhiberi suadeo, omnibus superioribus obseruatis. Cornu ceruinum cum oleo roseo fronti contritum adhibetur. Nam & lapa-
thij folia uiridia, cum gallarum puluere trita, ex aqua, similiter illita iuuabunt. Sic Iris Illyricæ puluis, cum aceto illitus præstat. Et ellebori albi puluis, mixtus cærotario olei rosei, & fronti impositus, & acaciæ puluis mixtus, similiter catarroſis medetur. Item etiam hemigranici hæc sunt adiutoria adhibenda, Sinapi tritum, & urticæ semen excoctum cum aceto, frequentissime profuerunt. Et decoctio pyretri, cuius uapor naribus si hauriatur, continuo medetur. Et fumigia eodem modo hos iuuare cognouimus, si melanthum cum fimo bouis, uel asini, carbonibus impositum, naribus hauriatur.

Nam & unguenta hæc, ut experti sumus, capitis dolorem sedant. Oniscos, quos porcelliones appellamus, si in oleo decoqui facias, & ex eo tepido caput infundas. Sic peristerion herba oleo infusa, medetur. Et si storacem oleo resoluas tepido, & ex eo caput infundas, multum iuuabit. Sunt & cætera adiutoria *πολυπλῆκη*, quæ multarum specierum congregatione compacta sunt: ut troscisci diuersi, emplastra, uel antidota, uel cætera, quæ ex uarijs simplicibus componuntur: sed hæc magis facilia adiutoria adhiberi suadeo, quæ sufficere arbitror caussis supradictis capitis & querelis. In *ἀναλείμματι* uero, hoc est, eo intervallo temporis, quo caussæ uel passionēs chronicæ publicantur, dum quiescente dolore caussa latet, dum commotionibus ueluti transactis, æger sollicitus alias iterum reuersuras attonitus formidat, tunc his catholicis adiutorijs imminendum est, quibus secundū naturam, sanita-

Cautela.

Dactylos uocare uideſ u-nus dulcior-es. sic enim apud Dioscor. aliquando uocantur uux.

Ex caussis incertis.

B

Contra Hemigraniam.

Experimenta Autoris.

Vbi dolor quiescit, & caussa latet.

Ctem reformando, futuras confidit cōmotiones minime nocituras. Ergo omnibus querelis, uel caussis capitis, indifferenter hoc temporis intervallo, uno eodemq; modo, hoc est, cura & diligētia ministranda. Omnibus modis est indicenda uini continētia, quę supradictis omnibus querelis capitis prodest. Lactis æque, similiter dactylorum omniū. Multo magis uentris purgatio frequentissima procuranda est. Fricatio totius corporis. Quammaxime emplastrum capitis longa doloris ualetudine laborātis. In dialemmate ficus pingues in uino infundes unc. VI. lazaris drachmam. I. sagapeni. I. storacis. II. galbani. II. omnia trita sic commiscēs, & uteris pro cataplasmate, præcalescto capite post rasuram nouaculæ, inferioribus partibus femorum, uel surarum, æque exercitio calefactis, ut ex superioribus causam omnē deuocare ualeamus. Apophlegmatismos quibus caput purgandum erit, cōuenit adhibere. Conuenit de naribus, uel ex fronte sanguinis eos detractiōne releuari. Nam & post rasuram capitis, cucurbitas cum scarificatione sepē adhibuimus. Conuenit & emplastrum infrascriptum. Et frequentius etiam sanguisuga applicari conueniet. At ego in hoc ordine curæ, etiam cicli beneficia non aspernabor, omnia pene uetusta uitia percurantes: si tamē recto ordine peragatur, ut ieiunia in tempore uomitus, ex radicibus salis, aliquid quando perceptio *παραπλησιον*, dropacæ, synapismi, secundum usum & auctoritatem ueterum adhibeantur omnibus. Attamen proprijs temporibus custoditis, ciborū quoq; qualitatibus & ponderibus moderatis, uilia tamen esse censeo etiā aquarum calidarū naturalium beneficia. Peractio igitur ciclo, aliqui hyeram adhibuerunt, quā alij piciam appellauerunt. aliqui *ἀπρηπιωμένην*, aliqui etiam cauteriam. Ex his omnibus adhibitis, constat supradictarum caussarum sanitatem fuisse plenam capiti reformatam, ne uariarum curarum, uel beneficiorum merita confunderentur.

D Sed quoniam aliquando aut ægrotantium impatientia, aut imperitia medicorum, aut certe dum caussarum magnitudini, adiutoria non sufficiunt competentia, minime percurantur, & ex eo ad *πινδύλειον* capitis uitia deuoluuntur, his etiam quibus nunc possumus remedia uel adiutoria componimus.

De EPILEPTICIS. Caput II.

VARIIS nominibus hæc passio pro sua magnitudine nuncupata est. Nam cum sit sola capitis causa Epilepsis, ideo sic appellatur, q̃ statū sensus penitus alienet, et q̃ mens a propria sede exterminata, grauius attentetur. Vnde antiquiores sub cuiusdam religionis imagine Sacram passionē nūcupauerunt. Hos antē cōmotioem aliquidā certa signa præueniūt: aliquoties casus occupat repētinus. Quos ergo in hac passione uolētius exagitari cognouimus, hī cōmotionibus imminētibus nunc sua mēbra grauari præsentiūt, nunc crebris oscitationibus resoluunt, & ad oēs motus pigriores fiunt. Tunc etiā oculos terri-

Epilepsio.

Sacra passio.

Accidentia
Epilepsiæ.

biles habere incipiunt. Tunc stridor prosequitur dentium, cum præcordiorum tensione: distenti uel contorti cadescunt citius, atque colliduntur. Tunc omnium musculorum uel neruorum spasms, & saltibus confringuntur: & uocis articulata quadam confusione, sonos magis & ululatus excludit ore & naribus, & sacrabiliter spumant, & ueluti dormientes, cum sonitu pectoris grauius comprimuntur. Desistentibus uero commotionibus, præteritorum omnium immemores fiunt. His licet difficile succurri possit, tamen pro causæ magnitudine, & pro ipsius professionis compatiencia, adiutoria quæ competentia didicimus, aut exercuimus, non negabuntur. In initijs ergo huiusce passionis, frequenter eos uomere compellam: sternutamentis etiam prouocatis, eorum capita commonebo, uentrem acri clystere procuro: frequenter adhibeo phlobotomum, semper huius causæ competens adiutorium. Temporibus uero commotionum, ora spumantia uili spongia detergo: membra sollicitè continebo, spasms commota uel saltibus, quæ frequenter in ipsis commotionibus contorqueantur: & lanis infusis oleo sicionio calido, fouebo correcta. Pennas admoueo nitro & oleo infusas, ex quibus faciles uomitus procurabo. Poterunt etenim ex hoc, aut cibos, aut pinguius flegmata digerentes, uelocius releuari. Exactis tribus diebus his, est in principio ieiunium indicendum. Succis tantummodo nutriendi sunt. Aquam fontanam calidam bibent, in hydromelle, uel apiata, si fuerit, non negetur. In hac enim sollicitudine, uini penitus præsumptio inhibenda est.

Quiescentibus itaque commotionibus, ciborum humanior ordinatio, simplex attamen & digestibilis ordinanda erit. Iam fricari, uel exerceri debent. Cursus tamen uehemens penitus inhibendus. Solis calidioris, & balnearum calidarum uapor arcendus est. Cucurbitarum beneficia cum sanguinis detractioe capiti adhibenda ordinamus. Ordinabo dropaces, ordinabo etiam synapismum, & omne ciclicum adhibendum esse suadeo: sed locis imponendæ sunt uestiones: arteriotomie faciendæ, quibus forte, si possimus, funestæ huius passionis perseverantiæ remoueamus. Huius etenim causæ magnitudini, maiora sunt & frequentia adiutoria prouidenda. Nam quamplurimi sapientiores, etiam Physicorum, adiutoria prouidere, in quibus (ut etiam nostro libello Physicorum comprehendimus) magna, & ueluti religiosa remedia procurauere.

DE SCOTOMATICIS. Caput III.
SCOTOMATICORVM, & Epilepticorum pene similis est in iisdem casibus sollicitudo: simili enim mentis confusione alienantur. Quantitate causæ, & magnitudine accidentium solū terminantur. Iuuenibus hæc quæmaxime, & ociosis euenire consueuerunt. Contingit etiam quibusdam, qui hemorrhoidarum solennes euirauerunt digestiones. His licet cura epilepticorum sola sufficiat, attamen hoc ordine uisitandi sunt. Cum ergo commoueri cœperint, manibus corinebo,

Cura.

B

142

Cura.

C auribus eorum inclamabo, easdem fortius defricabo, capillos euello ex temporibus, odores naribus admouebo. Ex pulegio tunfo, uel origano, aut synapi cum aceto cōmixto, procurabo sternutamenta. Cibos in tempore cōpetenti leuiiores dabo, & ad cætera quæ Epilepticis adhibenda erunt. Vnū supaddo, qđ hos frequenter hellebori acceptio liberauit.

¶ De M A E N O M E N I S. Caput III.

Insignia Mæ-
nomenicorū.

Cura.

S V N T certa insignia quæ *μακρυδύμνον* produnt. Primo, ut cum sit sine febribus, caput sibi grauius dolore asseuerent: sonos aurium suarum expauescant. Cum autem cōmoueri cōeperint, aliquando cum hyalaritate cōmouentur: aliquoties irascunt. Hos sollicito custodire conueniet, & eis phlobotomos adhibere. Item post totius corporis uariis purgationes, fomentandum est caput eorum oleo nardino: & ordinandum est, ut frequentius uomant. Ex cibis leuioribus, & aqua calida nutriantur. Ab alienationibus uero eorum quæ cum risu fuerint, terroribus coercendi erunt. Furorem uero mollioribus blandimentis lenire conueniet. Interea eos ligaturis cōmodius custodiemus. Cubiculum eis in inferioribus procurandum est: ne per cōmotiones precipitentur. Caput eis post fomenta olei nardini, uel chamemilini, radendū est. Item etiam scarificandum. Conuenit interea etiam sanguifugas admouere.

*
Viderit hic
lector.

D Transactis uero cōmotionibus, etiam quietis passionis temporibus, hordei scicli ecori ordinandi sunt, ut ex eo magnum beneficium consequantur. Et si post hæc adiutoria, causæ uel cōmōtiones adhuc in suo statu permanferint, in illo nil asperius attentetur, sed quæ sunt prius adhibita, identidem repetantur. Sin uero plura augmenta causæ concreuerint, incisio uenarum in capite, & uistio celebranda est. Danda hyera, dandum helleborum, & cætera quæ Epilepticorū curis ordinata sunt. Hanc curam etiam in *ὑπονοσησίων* adhibere debemus.

Melancholicorum signa.

Cura.

¶ De M E L A N C H O L I C I S. Caput V.

A C C I D E N T I A Melancholicorū manifesta sunt. In principio huius causæ, salutis suæ desperatione, primo proponentes mortis desyderium, frequenter coguntur in lachrymas: & deserta loca potius appetentes, hominū incipiunt uitare confortia. Aliquando rursus suam sententiam redamnantes, uitæ solatio delectantur. Circa præcordia uero, de assidua inflatione queruntur: & cum sudore totius corporis importuno, frigidis articulos sapissime patiuntur. Priuari se ob hoc etiam uiribus naturalibus asseuerant. Indigestione frequenti stomachi fatigantur: ructus suos uarios, & insuauis perhorrescunt. Calor illis intrinsecus fiet, & interiorum uiscerum doloribus frequentius attentantur. Vnde omnem curam q̄maxime stomacho delegabo, fomentis, uel cataplasmatibus calasticis imminendo. Ventris officium prius inoffense procurabo, quo facilius etiam catharticis depurgentur. Pa-

lestra, uel gestationibus solidius exerceant. Vini ueteris, et bene olentis, accipiendi copiam præbemus. Cibos aptos stomacho, maturiores, & largiores cōuenit ministrare. Declinantibus uero doloribus, absynthij pontici decoctione iuuandi sunt. Et aloes iubeo puluerē ieiunos in maio unius coclearis in mellicrato accipere. Similiter etiā hyeram quā picram ueteres appellant. Si his adhibitis caussa diminuta non fuerit, phleboto- mum sub gemina detractiōe adhibeo. Vomitus eis cum radicibus frē- quētius procurabo. Eūā inter cibos helleborū aliquādo dabo. *μικρὰ δὲ πικρὰ* uero, & adhuc hoīm fugientibus societate, longas indico peregrinatio- nes, & aut marina, aut naturalia lauacra calidiora exhibebo frequētius.

De PARALITICIS. Caput VI.

PARALITICI multis ex causis fiūt. Etenim aut ex se hæc passio nascitur, aut præcedentibus ægritudinibus comparatur. Quæ grauior & difficilior fuerit, ea in præfatis corporibus consequi-

Igitur si Paralysin passus fuerit, caput prius est detondendum. Dehinc oleo sicionio fomentandū, præcedentibus interea fricationibus calenti- um fabanorū. His cucurbitę uentosæ sunt imponendæ, & apophlegma- tis cōpetentibus medendi frequētius. Sturnutamenta assidue procuran- da sunt ex odoribus acrioribus, quibus facilius possit pressa altitudo cē- rebri fuscitari. Nam & allia naribus eorū supponenda sunt, ex uiuo sul- phure, uel lasere, uel castoreo temperata. *Καϊστωδέρμιο* præterea, cui ex uici- nitatis molestia linguæ, uel uocis officium frequenter intercipitur, pro- prijs curis corrigendus erit specialiter: gargarismatis hyssopi, thymi, sy- napi, cum oxymelite: salisioribus nutriendi sunt, & chatartici assidue re- leuandi. Si sub hac sane diligentia parū medicina profecerit, ueniam eis sub lingua secabo: nec non etiā tardas confusasq; eorum locutiones, sub disposita prouocatione compello, timorem incutiendo uel ignis, uel serpentum, ut correctiorē uocem tandē cogantur expromere. Caput eo- rum liquidō carotario frequenter infundo, ex castoreo, peucedano, & oleo laurino, uel irino temperato. Potionē temperatam ieiūno dabo ex castorei puluere ad mensurā coclearis unius cum mellicrato. Dabo hye- ram ex more: dabo theriacam tempore cōpetenti. Si autē ex frigoris

caussa Paralisis obuenerit, ut lepra aliquando corpus attentatur, fricati- one calida, cubili tepefacto, & acopis bene olentibus imminēbo. Confi- cio e ruta uiridi, uel marrubio, aut artemisia oleum non solū ad ungen- dum, uerum etiā & lanarum infusionē, quibus membra post curam sem- per calidis munienda sunt. Cucurbitas interea locis pinguioribus admo- uebo: aquis chalaisticis fomentabo, pulegio, nepita, iri Illyrica, hybisco, uel seminum decoctionibus. Acopa uero adhibeo ex pice, oleo laurino, resinaque, pipere, uel euforbio & adarce coniectura medici temperata. Exercitijs competentibus membra recolligo. Frequenter hyeram his dare cōuenit. Quibus uero sensuum partes attentatæ perierunt, hijs

Curā.

B

Καϊστωδέρμιο, id est, cōmu- nis, siue uni- uersalis spa- smus. Ego in legere malim *καϊστωδέρμιο*, id est, caninis spa smus, morbi genus, subin- de ab Hippo- crate & Gale- no memora- tum.

Paralisis ex frigore.

C hyemis tempore senili ætate laborantibus, unguenta hæc adhibenda erunt. Ex scylla, euforbio, tapfia, pyretro, adarce, & oleo glaucinò.

Si loca emarcuerunt, diu hoc morbo uexata, cucurbitas, dropaces, la uacra, & cætera adiutoria similia, post cibos adhibebo q̄maxime.

Significo præterea aliquando Paralysin per solutionē obuenire membrorum: aliquoties per contractionem. Et quomodo hæc accidentia sibi inuicem contraria, sic non una diligentia uisitanda sunt: eorum itaq̄ nunc curas determinabo.

Paralifis ex
contractione
membrorū.

Collecta ergo membra, & ex caussâ uī, repentina contractiōe diminuta, omnibus chalafticis adiutorijs resoluenda sunt, mollibus manuum fricationibus, & unguentis ex diuersis adipibus, & medullis, quæ possint loca contracta relaxare. Vt or fomentis similiter aquarum chalafticarum, ex seminū decoctionibus, & altheæ radicibus. Indico interea, solam aquam calidam esse bibendam. Sane concedendum est, aut apiatum, aut hydromelite.

Ex resolutione
membrorum.

Resoluta uero membra omnibus stipticis adiutorijs, & frigidioribus colligenda sunt, siccis fricationibus, unguentis quoq̄ mordentibus, ex oleo cyprino, uel calce uiua, euforbio, castoreo, adarce, & similibus cæteris temperatis. Nam & ligna iacentia, subinde eos suadebo transcendere debere. Sane si pes ex hac resolutione dimissus, usum penitus denegauerit, laminam plumbi prius unciarū trium, articulis eius pedis admouebo, in tertium diem uncias singulas superaddēs. Hoc diebus. xl. seruabo: ut illam ponderationem, quæ eo tempore creuerit, usu nouerint sustinere. Post uero, similimodo quæ superaddita fuere plumbi, detractus sum: quo pes, qui cum colligaretur, pondera sustinebat, eadem subductiōe releuetur.

Interea quotidie horis matutinis lamina detracta, unguentis, & cæteris adiutorijs imminebo. Hoc uitium plerumq̄ etiam in oculis euenisse uidimus. Nam Phthisis & Medriasis certissima Paralifis oculorum est. Quæ Phthisis ex contractione uel diminutiōe pupillæ contingit: ex resolutione uero uel dissolutione pupillæ Medriasis, quā medici platochoriasin appellauerunt. Diuersis ergo eorum accidentibus, diuersæ curæ disponendæ erunt: ut altera fomentis, & inunctionibus stipticis, & constringentibus colligatur: altera chalafticis omnibus & nutrientibus relaxetur. Sed de utriusque difficilior est Medriasis. Etenim generaliter in omnibus caussis, facilius restricta resoluimus, q̄ resoluta constringamus.

Phthisis.
Medriasis.

De aquis uero naturalibus certissimum est, quomodo dulcia semper & calida lauacra, corpora relaxarunt. natura uero salsa uel bituminea, uel sulphurea, relaxata corpora collegerunt.

O De CATARRO. Caput. VII.
M N I S ^{κατάρρο} sollicite uisitandus est: cui origo & principium de capite nascitur. Deriuatio etenim ex eo defluens per uarias arterias, continuo quæ attigerit loca perfundit; & sic perseverantia neglecta debilitat. Nam sub tribus differentijs ex hoc causæ fiunt.

Fit in naribus, cui nomen est Coriza. Fit in faucibus, quod dicitur Bronchos. Fit in thorace, qui si diu permanferit, & pulmones inuufferit, Phthifin penitus infanabilem facit. Præterea cū ad inferiora se præceps demerferit, fecum trahens ui & pondere materiam uitiorz, læfis frequenter præcordiorum uitalibus locis, aquas passionis tranfitu infigit, & tandem desperata pedum loca occupat, difficile remouendus. Sed primum quū omne corpus inquietat, et ueluti quoddam pondus cum dolore, omnes particulas corporis sine febribus apprehendit, defcenfu eiusdem reumatis e capite, fimiliter etiā antea, q̄ maxime follicitabo: cui cum cæteris uicinis & proximis membris, hanc diligentiam interim ordinamus: in fequenti etiā ſpecialeſ, pulſatis, uel occupatis partibus deſignabo. Omne igitur corpus calidis & ſiccantibus unctiōibus perungimus, cubiculo munito & calefacto. Operimentis inſuper lanarum mollium infularum, caput morborum omniū cauſſam, calido oleo cyprino, uel laurino, ſiue glaucino frequentius curo. Conueniet interim per initia reumatizanti diurnam quietem interdici. Conueniet ſimiliter etiā potionis detractio, ſub qua ſitis procurata multum profuit. Sed magis obest falſus cibus: ſiccans autem ſub utriuſq; cōactione ebrietas protinus arceatur. Ventrem præ omnibus purgandum moneo. Sane cum his adiutorijs humanius cauſſa profecerit, unguētis tunc ſupra dictis, cum tali fricatione imminebo. Vt paleſtræ exercitio iuuetur q̄ maxime opus eſt, ut inferiora fortius defricentur. Euocatus etenim de ſuperioribus reumatifinus, follicite ſuperiora loca, quę cum periculo attemptare poterat, derelinquit: & ſic ciuili medicinæ iam beneficio, ægritudini repugnamus. Vnguenta ſupra dicta cum opobalfamo temperata dabo: potionem uini, & mellis ex q̄quo, ubi rutam uiridem coxi, dabo. Ibi etiā pyretrum do: ibi piperis puluerem aſpergam. Interea cum nares occupauerit, admotis odoribus ex melanthio, mitigabo, & itidem frequenter cum unctiōibus ſuperioribus ungendi ſunt.

Si fauces inquietauerit, gargarifmatis ſtipiticis imminebo, quæ in primo Phænomeno ordinata tranſegimus, perſeuerantibus ſane adiutorijs, capiti totoq; corpori unguentis ſuperioribus. Si thoracem occupauerit, loci naturam, uel uicini pulmonis intuens follicitiuſ uifiſtabo, inſtans & cæteris ſupra dictis unguentis conſectis cum opobalfamo: quo de altitudine ad thoracis ſuperficiem reuocare poſſimus reumatifmū. Si tuſſicula ſuperuenerit, quæ mala uicinitate, quaſi quadam contagione follicitat: habita conſydratione, ſi humor ille in thorace diu reſideat, deponendus eſt: perſeuerantibus attamen prioribus adiutorijs, ſuperaddo, plantas eorū pice liquida tangi debere, & fricari unguentis ſupra dictis eam partem pectoris: admotis proxime carbonibus, quo plus aut euocare in ſuperficiem, aut loco ſiccare reumata ualeamus. Interea licet etiā contritiōis moleſtia ſæpe præualeat, ita ut phlegmata diſſi-

A
 κρις.
 βρονχ.
 φθις.

Podagra.

Cura Catarr
 uniuerſalis.

B

Cura Co-
 riza.

Bronchi.
 περιμετ.
 Autoris
 liber.
 Catarr
 pectoris.

Cilius egerantur, quorum digestio tussientes releuare consuevit, his ^{γυμνασ} uel porciones dari faciam, ex origano, thymo, ruta uiridi cum mellis crato, aut melle despumato confectas, & pinguium ficorum decoctionem cum oxymelle. Et si identidem, humoribus multum solutis, fluxus sputorum inquietudine, & uigilias procurabit, tunc ad eorum coagulationem, uel digestionem, succum pisanæ, uel alicæ dabo, aut lentem cum melle coctam. Dabo omnes pulres cum pipere. Dabo falsa menta quæ uolet. Dabo in nocte antidota, piper & myrrham, storacem, galbanum, apium, cum melle attico temperata: quæ & coagulare ualeant phlegmata, & somnos inuitent: quæque sui natura & soluta constringant, & beneficio præstanti, tussire minus faciant dormientes. Igitur quum diu pertinax reumatismus, adiutorijs medicinæ desistentibus, quod aut locorum, aut substantiæ, aut certe medicorum inopia contingere solet, pulmonibus uersionem fixerit, phthisin incurabilem facit. Huic nunc pro causæ magnitudine, uel præiudicio temporis, curam ut possumus, & diligentiam ordinamus.

¶ De PHTHISICIS. Caput VIII.

D PHTHISICVS & apoplecticus una sub sorte, uel conditione medicinæ desperat, quod & ueterum sententia sic fuit diffinitum. Vnde per initia eos ut possumus medicinæ remedio iuuamus. Chronicos uero plena sub desperatione, non iam ut medicorum medelis, sed magis amicorum solatio uisitamus. Ergo per initia, spe, sub qua futuros nos omnes labores impêdimus, hoc ordine phthisicos curabo. Februm ergo frequenter his, & necessitate accidētium tempora considerans, cibos & adiutoria ministrabo. Consueuerunt etenim sub quodam ueluti typico charactere, uel pertinis magis febribus commoueri, ut aliquando cotidie, aliquoties circa diem tertium moueantur. Cibos itaq; forbiles dabo: et si uirium alia nos cura constrinxerit, concedo etiā solidiores pulres, quas uolent, agnorū cerebra, uel hedorū, ungues caprarū siue porcorū, uel succū ubi supradicta decoxerint: aut certe apozima, ex salibus, oleo, & anetho, & aqua, ubi eadē ungulæ supradictę maduerint. Dabo caponum maiorū testes: dabo columbos matri subtractos: dabo pisces asprates: dabo conchilla in ^{ῥιμδρμυρι}, ex aneso, libistico, pipere, & similibus cæteris, melle, & aceto commixtis. Desistentibus aliquando iam febribus, etiam falsamētā ministro: tunc totius corporis exercitamentis, ut prius in palestra, pro uirium consideratione uti cōueniet: t̃p̃ maxime autē capitis, gutturis, uel thoracis adiutorijs immineo: sicubi, natura consentiente, corpus omne iam reumatismo plene possessum, aliquatenus ualeam desiccare. Dabo antidota ex pipere: dabo theriacam cū mellis crato: dabo diaprassion: adhibeo epithimata simili sub uirtute operantia, quæ calefaciendo loca desiccare contendant. Caueant uerni & autūni tempestates: caueant æstus & frigora. Et si sub summa desperatione iam eos ob-

Pisces asprates.

federit naturæ fragilitas, *ἡ ἄρα*, & cauteria partibus thoracis infigo: si forte patefactis iulnorum meatibus, eorum digestionibus releuentur.

S De SANGVINIS effusione interiorum. Caput IX.

SANGVINIS effusio, licet pro locorum qualitate aliquando salubris existat, attamen generaliter omnes, cum horrenda & terribili inspectione uisitantur. Fit itaq; locis diuersis sanguinē emittentibus sub trina uulneratione caussatio. Fit primo crepatio. Fit deinde putredo. Fit ex utrisq; superioribus, eiusdem loci uel uenę patulum orificiū incurabile. Locorum itaq; emittentium nomina, curis interpositis designabo.

Cum ergo ex miningæ partibus sanguis eruperit, qui uapore quodam, cum saltu uenarū, cum sudore, & dolore totius capitis publicatur, hoc pacto constringendus, uel cohibendus. Thuris, uel mannæ thuris, aut naxi, aut amyli, aut puluere terræ lemnæ aspergendus est: aut cum aceto mixto illiniendus. Huic fons ex oleo roseo infrigidato adhibendus est, aut de succis herbarum, & specialiter stipticarum: ut est arnæ glossa, & nigra portulaca, rubus, rosa sicca, uel cætera. Cibi uero calefacientes miningam prohibendi sunt. Cum de oculis hemorrogia emerferit: aqua frigida, uel pusca defricandi erunt: consequenter uero moris pinguibus inungendi sunt, & cæteris quæ in subiectis uenis crepantibus adhibuimus. Cū de auribus sanguis eruperit, aqua his, uel pusca frigida infundenda erit, & cætera quæ oculis facienda esse ordinauimus. Cum de naribus eruperit, Phenomenus libellus superior, omnem earum curam edocebit, & instructionem. Cum de faucibus, uel gutture, uel de palato eruperit, succis frigidis, uel stipticis insistemus.

Cum de uua, pusca primo frigida imminendum erit. Quæ si minime ualuerit prohibere, uirgulā auri, uel argenti igne calefactam, loco sanguinanti suppono: ut ex hoc cauterio protinus compescatur. Cum uero de stomacho obuenerit, dabo ad masticandū glycyrrhizæ surculum, dabo symphyti radicem, dabo gummi, dabo dragantum: dabo puscam frigidam, ubi naxi puluerē aspergo: dabo similiter amyli tritum, dabo rhaponticum, dabo etiā cum succis herbarū stipticarum, quas superius memorauimus, cibos stipticos, aut ex oriza, aut ex lente, uel succis eorum, in quibus illa stiptica coquenda erunt. Dabo interea mala citonia: dabo pira, corna, sorbaq; et castaneas, uel horū decoctiones. His etiam diacodion conuenit in nocte accipere. Nam & eclegmatia stiptica conueniunt: ut est aut diatheon, aut diastheacon, aut certe barbara, quæ de bitumine iudaico conficitur. Cum de thorace emerferit, quod sollicitate uisitandum est, Primum phlebotomus adhibendus, & cibi ordinandi sunt. Eorum uero articulos, uel extrema femorum, fasciculis compenter astringo: spongiam uero pusca frigida infusam, thoracis partibus adhuc calentibus superimpono. Imminebo huic adiutorio, diebus con-

A

ἡ ἄρα est instrumentum uulsionis: alias etiā cauterium dicitur.

Varia sanguinis emissio.

Miningæ fluxus.

Contra hemorrogiam oculorum.

Aurium.

B

Narium.

Faucium.

Gutturis.

Palati.

Vuæ.

Stomachi.

Pectoris.

Ctinuis quãdoq; frequẽtius imutando. Post uero emplastris uti nos conueniet, superius ordinatis de stomacho accidentibus: quibus cõmodius lanas succidas superimponimus, oleum quocq; myrteum, uel lentiscinũ mixtũ cum aceto. Si his adhibitis sanguinis adhuc perseuerauerit insolentia, detracto aceto, uinum est cõmiscendum. Accidentibus uero febribus, si etiam tussicula cõeperit inquietare, cataplasmandi sunt de subiectis: ut sunt dactyli, sorba, rosa sicca, flos malignanati, acacia, hippocystis, alumẽ. Omnia hæc simul, aut quę inueniri potuerint, in succis rosis syriaci coquunt. Horis uero quibus sanguinẽ detraho, ex decoctionibus supradictarũ specierum, aut immaturarũ uuarum, aut uitũ acerbarũ, aut polygonij, aut castanearũ ingero potiones. Cum aut de pulmonibus hoc emerferit, quod ualde periculosum est, sub gemina, uel trina sanguinis detractiõne, phlebotomũ adhibere cõueniet. Et his omnibus imminuendo, quę de thoracis partibus eminẽtibus ordinata sunt, tam in cibis, q̃ in cæteris adiutorijs. Hos interea cum aliquid proficere cognouerimus, unctiõibus quibus membra inania nutriantur, mediocriter perungimus. Cum de partibus sane muliebribus sanguis eruperit, his in inguina iniici quid expediat, libelli sequentis lectione disposui.

Pulmonis.

Vnum interea hoc generaliter edico, omnibus ex locis interioribus, ex quibus sanguis poterit eructare, per initia cuncta adiutoria, uel præcepta frigida, quę constringere, & glutinare poterunt, adhibenda esse; in sequenti uerò, cum humanior præuentus caussarum arriserit, calidis & nutrientibus imminendum est.

D

DE EMPYICIS.

Caput x.

EMPHYICIS.

EMPYICI frequenter fiunt, uulnere in interioribus, uel apostemate præpediti. Quibus cum febres superuenerint, temporibus cõsideratis, & adiutoria, & cibi parciore sunt ordinandi. Tunc cum maxime hora eos accipiendi cõegerit, cataplasmandi sunt. Interea ex hyssopi puluere, uel abrotani, mixtis seminibus, in decoctione pinguium caricarũ. Dabo frequenter melliscratũ simplex. Dabo etiã in quo pulegium, aut hyssopum, aut thymũ, aut rutam uiridẽ, aut marrubium decoctũ fuerit. Aspergo sane in melliscrato, ad uulnera interiora purganda puluerẽ Irios Illyricæ: & eclegmate utor, qđ ex lini semine fixo, cum nucleis, & melle despumato conficit. Hippocrates uero, nucleos cũ galbano, & melle attico, in his similibus caussis, ad depurganda uulnera dari præcepit. Similiter etiam terebinthinã mundam, in mensura unius cõclearis, ieiunis q̃ maxime, & uiribus iam reparatis, atq; his adiutorijs repleuatis. Etiã hyeram dari cõueniet. Iam tum etiã exercitiã, & fricationes, ad reparanda corpora adhibenda sunt, quibus reliquię caussarum possint mundari facilius. Hos etiam aëris mutatio multum iuuat. Cibus uero, siue pulres frequẽtius accipiant, quibus piper admiscendum est. Hoc etiam in cæteris dari conuenit. Nam & antidota quę forte de ex-

perimentis empyicis danda sunt, mixto pipere conficiuntur.

M De SYNTAXI, uel Atrophía. Caput XI.
 VLTIS præcedētibz causis, nascitur Syntexis, uel Atrophía. Fit ex uentris solutione proluxa. Fit ex febribus similiter chronicis. Fit ex uisione thoracis. Fit ex capite reumatizante frequēter. quæ licet difficile, attamen curari potest. Fit etiā per sanguinis emissionē, pulmonibus uulneratis, in quibus frequenter phthisis illa insanabilis generatur. Aliqui uero iactantiores habitū, ueluti suam peritiā uel diligentia diffamantes, ^{uirtutibus} curauerunt, quos phthisicos mentiebant. Nam & præter sanguinis emissionem hi syntectici, uel ^{arropoi}, ex proprijs accidentibus fiunt, quos tussicula exagitat perseuerās. Hos indeficiens sollicitat sudor, hos certe macies, & tenuitas corporis, circa dies singulos uires simul eliminando consumit. Quibus curā maiorem impendo, in illorum reparandis uiribus. Sic ut illis uinū leue, & albū, balneā, deambulatio, uel gestatio, unctio, uel fricatio, cibi aneleptici mediocriter administrantur. Frequēter enim mēbris & uiribus separatis, phthisis imminēs, uel hæc eadē perseuerans ægritudo, depulsa est. Iuuant locorū, uel aeris mutationibus; & his utilius longas peregrinationes indicimus. Dropaces, & cætera quæ ciclo consueta sunt adhiberi, partibus præcordiorū, & capitis uiribus separatis adhibeo. Aquis naturalibus uti plus cōueniet. Et si aliquod adhuc ex superioribus accidentibus perseuerauerit, syntoma superiorum ægritudinum remedijs adiuuabo.

Syntexis uariarum causarum.

A De ASTHMATICIS, uel Suspiriosis. Caput XII.
 ASTHMATICIS, uel Suspiriosis querela pulmonū est. Pingui etenim & frigido phlegmate pulmonibus adhærente, cauernæ, uel meatus, quibus naturaliter spiritus redditur & accipitur, concluduntur; & ex hoc impedimento, suspiriū, uel anhelitus molestissimus nascitur, ut sedendo magis quam iacendo respiraret. Hyeme senibus quam maxime hoc uitium familiarē est. Cōtingit aliquādo etiā medijs ætate, adhuc calidis: quos phlebotomo liberari necesse est. Attamen si etiā & a phlebotomo certa ratione prohibemur, tunc ieiunijs frequētibz, in uicem detractionis sanguinis uti cōueniet. Proderit etiā potandi continētia: proderunt cibi cum oxymelle, & pipere temperati. Dabo interea hyssopi, aut orizæ, aut rutæ, aut absinthij, aut lris Illyricæ, aut caulis decoctionē, ex mellicrato calidam. Item conficio ex his etiā eclegmata cōmoda suspiriosis. Conuenit etiam guttā ammoniaci dari, tritam cum mellicrato, uel oxymelle. Abrotani puluis similiter datur, & castorei puluis cōmodius operatur. Et illa decoctio, in qua scenogrecū cum uua enucleata, & rutā uiridē coquimus, frequenter danda erit. Sunt etiam troscisci magna approbatione diffamati, & cōficiunt sic. Anesum, sulphur uiuū, guttam ammoniacā, castoreum, & melanthiū, ex æquo omnia tunsa, cum aqua miscent, & fiunt troscisci: quos

Cura.

C postea tritos cum oxymelle dare cōueniet. Cubiculum his calidum, in superioribus procurandum est. relaxandis enim corporibus semper sunt inferiora contraria. Lectus accersendus est, & pectus eorum calidis unguentis, & uaporibus defricandum. Cucurbitas continuo cum detractiōe sanguinis admouebo. Proderunt per interualla amyctica: etiam dropaces adhibiti proderunt. Sinapismus proderit. Asthmaticos iuuat peregrinatio longior: iuuat uomitus radice cum oxymelle acceptæ. Conuenit exercitium: proderit currere cum uestibus laneis quæ maxime, si hoc in procliuitate procuret. Utatur emplastris circa pectus amycticis, confectis ex nitro, pipere, abrotano, & castoreo, & cyprino uel laurino cærotario. Ex quibus supradictis etiam potiones & unguenta conficio. Conuenit acētum scylliticum sorbere in nocte. Ex eodem confectum oxymel, potui dare plus conuenit.

¶ De EPATICIS. Cap. XIII.

Methodicorum errorem taxat.

E P A T I S indignātis, molesta querimonia est. Cuius ad curam adiutoria magis etiā stiptica cōueniunt. Sæpe enim nōnulli methodici, calidis tantūmodo, uel chalaisticis adiutorijs imminentes, ipsam epatis substantiā dissoluerunt. Oportet itaq; in fomētis, uel cataplasmatibus, cærotarijs et emplastris aliqua stiptica chalaisticis admiscere. ueluti cœnanthinū, nardinū oleum, uel melinū, mala citonia cocta, uel thebaicos dactylos, & cætera similia. Fit interea hoc cærotariū competens cerebrifmis. Nardini olei uncia. I. mastiches persicæ ÷ I. aloes, semuncia. I. Hoc epaticis non modo cōuenit, sed stomachi etiā solutione laborantibus: ita ut aliquando & uentris solutione, & uomitu, & frequēti nausea cōmoueantur. Quibus si hæc adhuc perseuerent, admisceo cærotario supradictō aut licium indicū, aut cœnanthinon facio in singulis semuncijs admisceri. Articuli eorum tunc fasciolis constringendi sunt, & stomachus aphitis cum uino cataplasmandus. Si illa indignatio epatis ex constrictione magis obuenerit, ut cum tensione, uel cum duriciā loci, dolor nimius partes inquietet, qui & iugulo, & omni parti dexteræ molestiam ferat, febres acutas commoueat, uentris quoque procuret constrictionem, digestionis licet ex leuibus cibis non exhibeat officium naturale, interea ructus frequentes insuauēs habeant, cum uisum fatigatio, one, pallore quoq; corporis deformentur: hos primo conuenit iuuari phlebotomo. Item oleo, ubi ruta, schæneanthon, papauer, lini semen coctum fuerit, calido fomentari. Cataplasmandi sunt tempore commotionis de hordei pollinibus, ubi diuretica aliqua commixta fuerint: ut asarum, ut petroselinum, aut pulegium, aut daucus, aut feniculi semen, & cætera similia in mellicrato, in quo hybiscus, uel ficus pingues prius coqui debent.

Epaticorum constrictorū accidentia.

Cura. Utimur centaurea post cataplasma, ex oleo samfucino, habente quippiam salis, uel nitri, uel nasturcij, aut sinapis: semper attamen samfuc-

ci necessarii omnibus epaticis fuere. Vti tunc cōueniet etiam diaquilon **A**
 chalaſtico, cui adipēs cōmiscendi sunt; aut certe diaspermato. Declinātibz uero accidentibz, tunc etiā malagmate imminebo tali. Guttae ammoniacae libra. i. nigellae ÷ iii. orobi ÷ i. myrti semuncia. i. cærae libra. i. olei cyprini siue irini ÷ viii. aceti quod sufficiat; in quo gutta ammoniaci & soluenda est, & terenda etiā. Tunc fricamentis, & exercitijs competentibus opus est; tunc potionibus, & decoctionibus absynthij, centauriae, rutae agrestis, siue petroselini, cyperi, uel hyssopi, thymi, & cæterarum diureticarum, æquis ponderibus. Quæ potionēs etiā uisiosis uescicis ordinantur. Sed etiam aloen solam tritam frequenter in mellicrato dedi. Declinante penitus uitio, hanc instanter potionem dabo. Castoreum, petroselinum, pipër album, cyperum, omnia æquis ponderibus tunduntur, cribellantur, & in mellicrato unius coclearis plenae, dantur. Omni probatione firmatum, frequenter etenim lupini iecoris combusti puluerem dedi. Aliqui uero amigdala amara, cum cymino & apij semine, æqua mensura omnia cum uino ieiunis dederunt, ad mensuram unius coclearis: & semen intyborū cum aqua calida, uel mellicrato similiter adhibuerūt. Sic & anethi succum cum mellicrato, & cætera quæ huic passioni alij collegæ proba esse fuerunt attestati. Nam & intyba frequenter comesta, semper epaticos iuuauere. Si duxerit longum tractū morbi neglectus, omnia adhibeo quæ difficultatem callositatis resoluerē ualeant, omni tēpore passionis exercitijs omnibus superioribus iminebo, oīa supiora lauacra concedo, salſos cibos & acres ministrabo. De oleribus aut accipiāt cauliculos, lapathū, radices quas raphanos appellamus. De piscibus aspratiles sumāt. De carnibus quę inueniri poterūt pinguiorēs. Oliuas colymbades, oīa falfamenta, capparon, uinum qđ mare transierit. Et oībz supradictis adiutorijs, emplastris, uel malagmatibus, unguētis, uaporibus, & cæteris uti cōueniet. His etiā ardor solis, cum aëris mutationibus multū prodest. Aquarū uero omnium naturalium, uel maris lauacris, eos frequenter iuuari assero.

Experimentum.

Collegæ Octauiani.

B

De ICTERICIS. Caput XIII.

IAM MULTIS in locis lētericorū descripsimus passionē. Fit enim ex epatis indignatione frequenter. Quorū nonnulla similia sunt accidentia, sed coloris deformatione sola determinant. Fiunt etiā ex stomachi uitio: fiunt plerūq; etiā ex uentre inferiore. Ergo cum febribz si de epate est lētericus, phlebotomandus est: & mox omnia epaticorū adhibenda sunt adiutoria. Si autē a felle fuerint lēterici, purgationibus cholagogis releuandi sunt, eusorbio, epithimo, aloe, petroselino, pipere. Hæc omnia ex æquo miscenda sunt, & ex eorū puluere, unū coclearē in mellicrato, uel oxymelle dari debet. Purgat eos etiā cicēris albi decoctio: utilius, si etiā ipsum cicē coctum accipiant. Iuuantur absynthij pontici decoctionibus. Iuuantur etiā, si aphronitra alba in uino so-

Ictericia.

Cluta accipiant: & sulphuris uiui puluerem in ouo ego frequenter etiam dedi. Sed forte aliqua ratio dare cathartica prohibuerit, quæ semper his nouimus non leuiter profuisse, saltem uel uomitibus releuandi sunt.

Sollicitius interea præcordiorum cura gerenda est, fouendo epartumens & incitatum, oleo nardino, melino, cenanthino. Ex lanis succidis fomentans, in balneis cataplasmando: interea admiscens seminibus, aut absinthium, aut rutam, aut centauream, aut cardamum; uel cætera, quæ epaticis ordinata sunt: quibus urinas prouocantes, tumore epatis possimus remouere. Vt specialiter etiam cyprino cerotario, admiscens terbinthinam, melilotam, irin Illyricam, & reliqua similia, quibus aut diameliloton, aut polyarchion confici consueuit. Cibis nutriendi sunt ut epatici, exerceri, similiter & fricari. Vitio adhuc perseverante doloris, omnibus amycticis iminere peregrinationis, & solis calidi beneficia sustinere suadeo. Aquis naturalibus æque uti conueniet. Si remotis accidentibus adhuc ille æmulus labor perseverauerit, naribus infundo elaterium, infundo elaterij succum. utrumque muliebri lacte comixtum.

Iuuantur interea utilius, si hæ digestiones uel purgationes in balneis procurentur: in balneis inquã, ubi quæmaxime potiones, & cætera semper adiutoria profuerunt. Nam & illic etiam præcordiorum fons continuo profuit, adhibitus, * & cortex colocynthidos in uino calefactus profuit. Et struthij puluis in cœnomelle similiter, & anchusæ puluis ad mensuram unius cochlearis cum aqua calida, & lapathij succus in mellicrato, & decoctio radicum feniculi, & cæterorum, quorum est præsidium diureticum. Hanc autem peculiarius portionem in balneis dare consueui. Euforbium, baccas lauri, nitrum, piper, ex æquo confusum, pro causa, uel uirium qualitate in mellicrato; & cum profuisset, in plenam sanitatem imminui.

¶ De SPLENETICIS. Caput xv.

IN PLÆRISQUE passionibus catholicis, siue generalibus curis, prius adhibitis, specialia uel particularia adiutoria melius adhibentur: unde Spleni nunc adiutoria prius ex catholicis ordinamus. Oportet initium curæ ex ieiunijs & patientia inchoare. Item cathartico, uel phlebotomo. Post uero his specialibus adiutorijs Splenem sic curare conueniet. Aceto, & oleo aqua mēsurā, comixto calido, infusis lanis succidis fomentandus est. Et spongijs pufca calida infusis similiter locus uaporandus, cui cinis ex foco tenuis aspergendus erit: & lapides molares ignificati, aceto extinguuntur, & operiti pannis loco imponuntur. Et facelli de salibus ignitis impositi profunt, & cataplasmata de hordei pollinibus in oxymelle, cui admiscendus est radices capparis tunsæ puluis. Et emplastrum hæc utilia superaddimus. Guttam ammoniacam, nitrum, mirabolanum, myrrham, synapi aqua ponderatione omnia miscenda, & temperanda sunt, cum pinguibus ficibus, prius aceto coctis & contritis.

* D

Alias, ex cortice colocynthidos calefactum.

Spleneticorum cura.

A Aliud emplastrum. Hordei farina unc. III. fœnogreci ÷ III. cartami ÷ I. herbæ paritariæ ÷ I. ficos pingues ÷ VI. cum aceto temperandum, sicuti superius ordinatū est. Aliud de expertis. Cardami ÷ I. Iris Illyricæ ÷ I. gutta ammoniaci ÷ I. quod mirabolanum appellamus, resinæ pituinæ frixæ ana uncia semis, sulphuris uiui, auripigmenti ana ÷ I. olei sicionij ÷ IIII. aceti unc. III. Datum aliud simile. Resinæ pituinæ, picis briciæ ana libras. II. auripigmenti, aluminis scissi, ana lib. II. aceti ÷ IIII. olei lib. I. tantum conficies, & uteris. Est cōsuetum aliud, & spleni, & epati cōueniens in seruire utrorūq; tum etiam præcordiorum. Crocamagmatis ÷ I. cēræ lib. I. olei rosei ÷ VIII. guttam ammoniaci lib. I. aceti quantum sufficit ad guttam ammoniacam dissoluendam. Hæc omnia emplastra, uel malagmata conueniunt splenibus indignantibus. Quibus expedit ab omnibus dulcibus abstinere.

Sane si splen duriciam adduxerit, quæ de hydropes superuētura plus terreat, etiam his potionibus imminendum est. Acetum scylliticum sub noctem ad mensuram unius coclearis forbi debet. Garum calidum bibant, ubi ferrum calidū igneum extinguitur. Aut de utrisq; pulcam reperatam accipiant, & utantur decoctionibus capparis, aut lapathij, aut tamaricis: aut ubi forte myrrham infuderis. Ad modū palestræ fricari eos conuenit. Cōmodius tamen, si saponē libentius sustinentes, suis q̄maxime manibus defricent. Gestationes, cursus, & cæteros labores appetere oportet. Dropaces impono tempore cōpetenti, & cætera quæ ciclo conueniunt. Vti lauacris falsis, uel bitumineis naturalibus expedit. naturæ etenim frequēter mare plus placet. Ieiunos acceptis radicibus cum oxymelle uomere cogo. Prouidebo omnes diureticos cibos. Vinum stipiti cum sumant. Dabo antidota diuretica, quibus & splen, & epar frequentius procuratum est. ut sunt apium, cicer, gramen, feniculum, aut semen eius, asarum, daucus, meu, petroselinum, pulegium, & reliqua, quibus antidota uel decoctiones conficiuntur. Febricitantibus spleniaciis, uinum, uel acetum parcius ingerendum est. Apyretos uero his subiectis potionibus iuuo. Lupini amari tribus diebus in aceto infundantur, & post ex eorum decoctione unum coclear, uel duo in nocte accipiant.

Hoc etiam ieiunis proderit. Purgati uirides lupini cocti, atque com busti satis iuuant. Aliud. Cortex salicis, arboris semper infructuosæ, in aqua coctus, & datus ut supra; continuo medetur. Thuris masculi puluis cauliculorum succo commixtus, loco appositus, perseverando satis proderit.

S De stomachi uarijs accidentibus. Caput, XVI.

STOMACHO, de quo nunc mihi tractatus interponitur, origo est, & occasio facilior uitiorum: quod omnium sortitus sit reliquorum membrorum sibi met famulantiū potestatem, quibus aut deficitur, aut res

Contra Splenis duriciam.

acupunct.

Accidentia
Stomacho.

Cae ualeatur. Hic, de subiectis accidentibus primo quantā molestiam sustineat, aduertendum erit. Patitur defectum caussis aliquando incognitis. Patitur etiam post ægritudinem. Sustinet constrictionem, dolorem cum indignatione uel febribus, duriciam, uentositatem, fastidium, solutionem, bulinum uomitus. Ex corruptela autem, & ex continua uentris effusione fatigatur. Item ex calore immēso, uel ardore: ut est caupon, unde sitim sustinet molestissimā. Frigore quoq; & singultu. Aliquando cum etiam cholera cum inflatione sollicitant. Ex eo lumbricorum origo frequenter fuit procurata. Quibus omnibus, ex ordine adiutoria sic ordinare curauimus. Ergo stomachicos, quos post ægritudinem prolixam, stomachi defectus tenet, et quod leue est, adhuc febriculæ infestæ, oleo absynthiaco calido fomētamus, aut nardino, aut sicionio, aut cenanthino, aut lentiscino, cum uino mixto. Item epithima impono unicū ex dialtheon, & mastiche, & nardino cærotario. Sic cataplasmo de dactylis, uel citonijs coctis in uino, cum stipticis speciebus, sicut in epaticorum ordinauimus solutione. Sed considerandum est præcipue, necubi ciborum sit præsumptio, quorum & qualitate, & quantitate lædantur, & ex quibus cibus uires nihil proficiant: intendendum itaq; ut & congruos, & moderatos temporibus cōpetentibus sumant. Sin uero nihil sub hac ciborū moderatione proficiant, purgatiōe opus est, qua humor quidem

Cautela.

Dille superius enarratos defectus efficiens, omni modo depurgetur. Hos etiam ex attico melle, uel oxymelle curo. His & scenogrecum in uino coctum, & tritū cum adipibus anserinis impono. Moneo interea, odores insuaues uitandos, stomachum semper peruerētes. Attestatione enim manifesta cognouimus, hos semper bonis odoribus iuari. Cum ergo sine febribus plena sanitate esse coeperint, uiribus consulentes, gestationes cōpetentes indicimus, uina, lauacra, & cætera quæ post ægritudinem possint corpora reparare. Quos uero repentinus dolor stomachi comprehenderit, qui cum grauedine etiam scapulis, & dorso immineat, faucium quoq; inclusionem, & ructus difficiles faciat, interpositis etiam febribus, his phlebotomo cōueniet subuenire. Item quietem & patientiam suademus, cibos uti febrētibus leues, proprijs temporibus subministro. Fouemus calidis & mediocribus stalticis, non tamen frigidis. Cataplasmandi sunt hordei farina, in melle citonijs coctis, uel dactylis immixtis: aliquando etiā meliloto. Item cærotario cyprino, habente mastichen, & castoreum. Vtior polyarchio, q̄maxime in dorso, uel scapulis, quibus partibus cōmodius adhibere cōueniet. Frequenter etiam cucurbitas uentosas imponimus. Declinantibus febribus, etiam portiones iam paragoricas dabo: ut cyminū frixum, cum apij semine ex æquo tunsum, uel cribellatum, cocleare unum cum aqua calida. Sic abrotanum cum uino dabo. Ipsi uero stomacho, pingues dactylos in ceno melle coctos & tritos impono. Si adhuc dolor remāserit: lac bubulū,

Stomachi repentinus dolor.

Staltica medicamina.

& asinæ, iisdem secundum consuetudinem confectum adhibeo.

A

Si nulla sane præeunte querimonia, repentinus occupauerit dolor, eosdem crebro post cibos uomere cōueniet. Tunc etiam uentosas accipere, & supradictis potionibus propensius imminere. Declinātibz uero doloribus, gestationes, exercitia, uel palestras, balneas, & uinum, cum moderatione concedimus, quibus uexatum corpus, ad plenam ualitudinē ualeat peruenire. Si duricia innata fuerit stomacho ex pri-

Stomachi duricia.

oribus languoribus, ficus pingues in mellicrato coctas, & tritas, feminibus misceo, & ex his cataplasmano. Cærotario post cū nitro, & salibus utor naturalibus. Vti cōuenit holeribus, cum cibis ceteris, nec non & uinum parcius dabo. Si uentositatis molestiam senserint, sicca fricatione iuuandi sunt. Ieiunos uomere conuenit, cibos pinguiorez & calidiores accipere: potiōes quoq; ex aniso, dauco, & castoreo, absynthio pontico, sine pipere, baccis lauri, ruta, cymino: contusis, aut singulis ammixtis sibi inuicē, aliquibus in aqua calida in modū cochlearis unius adhibeo. Etia epithimata cōfecta de seminibus potionū supradictarū mixtis, cærotario impono: dropaces adhibeo promptos in utroque. Tamen & cætera adiutoria cicli etiā in dorso uel scapulis applicabo.

Stomachi uentosas.

Fastidio incidente, locis conueniet habitare acri salubritate temperatis. Ab exercitijs, uel fricationibus cōmodis non quiescant. Absynthij decoctionē, uel uinum absynthites frequenter accipiant. Salsamentis omnibus nutriantur, acrimonijs, synapi, & aceto squillitico, et similibus cæteris, quæ stomacho hanc ciborum recusatiōem ualeant extergere. Præter consuetudinem uero edacibus, hoc est, *βουλιμίμοις*, ieiunantibus, somni procurandi sunt, largiores cibi, insuaues, & inflationem procurantes: & uinumeri potiones dabo.

Stomachi fastidium.

B

Si nauseando frequenter phlegmata & cibos incoctos excluderint, quo corpus non nutriendo tabidum fiat, hos cibis nutrio siccis, & acrimoniā habentia concedo. Potum frigidum per momenta parce dabo: ieiunos uomere cogo: per uentrem humorem deduco: catharticis, calidis unguentis omnia membra pertractio: absynthij decoctionem dabo. Succum stipticum malogranati, aut solius, aut hoc modo confecti. Succu mēthæ uiridis partem unam, tribus malogranati succi partibus admisceo, & coquo, ut paulatim pinguescat, & ex eo unum cochleare ieiuno pro eligmatio dabo. Si etiam choleram cum cibis uomuerint, omnia cum aqua frigida dabo, ubi myrtha uiridis cocta fuerit. Si nimia etiā uentris effusione fuerint fatigati, malogranata. x. citonia. x. in aquæ sextarijs quinq; coquuntur, ut penitus mollescant. Cumq; postea exuccata fuerint, separantur: succus uero qui remanserit, cum ad mensuram partem mediam mellis accæperit, coquitur, ut eligmatium fiat: & operabitur similiter. Aliud. Myrtha uiridis in uino coquitur, ut tertia remaneat: cui partem mellis similiter addimus, & conficimus, & utimur.

Stomachus uorax.

Nauseans.

Eclegma stomacho laborantibus utilissimum.

Stomachus nimis laxus.

Aliud Eclegma non ineclegans.

C natant, frequenter acefcunt cibi: his bubulam dari fuadeo, & cæteras agreſtes carnes fimiliter. Poſt quæ continuo aceti unum cochleare dari conuenit. Omnes amariffimæ ex abſynthio expediunt potiones. Item hæc. Piperis, & anethi ſemiunciâs ſingulas, cymini ÷ IIII. tunſas, & cribellatas reponimus, & ex hoc puluere unum cochleare cum aqua calida potui damus. Cum autem hijs profecerint, dabo pyciam. Exercitijs & geſtationibus competentibus imminebo, fricationibus, dropicibus, ſynapiſmo, quibus ſtomachus a phlegmate liberari poſſit.

Stomachus inflamatus:

Ex ſnâ Dioſcoridis euripice degne iunctori, refrigerans. Cauſon.

Piſſulæ, ſiue Collyria aduerſus ſitum.

D Aliud contra ſitum.

Stomachus frigidus.

Elegma ſtomachale.

Carion Dioſcor. uocat Caron, ab alijs aut Carioſem en: puto id eſſe quod Carui uulgo appellatur. Stomachi ſingultus.

Qui calore nimio inquietantur, ut hæc eadem inflammatio ſtomachum etiam & ſuperficiem faciet plus calere, ita ut etiam choleram frequenter emittant, his hoc remedio ſuccurrendum eſt. Maſtiche uncias. II. rutæ ſiccæ ÷ I. euripicen ÷ I. ut trociſci fiant, arnogloſſæ ſuccum admiſceo, & eos in ſingulis drachmis paro: ut ex his uinum cum aqua calida accipiant. Si nimius ardor fuerit, quem Cauſon appellamus, ſub quo anguſtijs interuenientibus, & februm augmenta ſunt, his aquam frigidam per interualla dari conuenit, & ſimiles cibos frigidos. Articulos eorum manibus calefacio: decoctiones dabo cytoniorum, meſpilorum, ſorborum, malogranati, menthæ uiridis, uel cenanthis. Si etiam ſitire uehementius cœperint, hoc remedio potiantur. Semen cucumeris dulcis ÷ II. draganti. I. in oui albo infunditur: & cum ſe reſoluerit, tunc ſeminibus ſupradictis puluis admiſcetur, & collyrijs ex eo factis, unum ſub lingua datur habendum: cuius paulatim humor uel ſuccus liquefactus, perueniens ad ſtomachum, ſitum compeſcere ualeat. Aliud eſt quod ardoribus expediat, quodq; cuiuſquam uexatione, etiam febricitantibus frequenter ingeſſi. Sub glycirrhizæ uncijs quatuor, unam ſemis ſupradicti pulueris miſceo, & o uo ſimiliter temperabo, & adhibeo. Nam etiam ſola oua cum uino data par beneficium præſtant. Quibus autem phlegmatis infeſtatione ſtomachus infrikerit, chalaſticis unguentis calidis curandi ſunt, & poſtione iuuandi ſuperiore ex maſtiche, mentha, & arnogloſſa: cui piperis & caſtorei ſingulæ uncia admiſcendæ erunt. Nam & cortex radicis, feniculorum, in aceti uncijs decem & octo coquitur, ut illic omnem ſuccum dimittat: & poſtquam corticem proieceris, huic aceto partem mellis miſces, & coquis, & uteris, ut elegmate. Similiter iuuabunt & oxyporia conſecta ut ſolent: hoc eſt, ammeos, careum, libiſticum, api ſemen, in uncijs ſingulis cribellantur, his miſcentur piperis uncia dua, & mellis deſpumati quod ſufficiat, ut pingueſcat: & oxyporium temperetur ex hoc: & ieiuo, & poſt cibos unum cochleare quotidie miniſtretur. Sane ſingultus frigidus, phlegmate in ſtomacho permanente, ſi obuenerit, conſectus puluis ex piperis uncijs tribus, & caſtorei uncia. I. ſimul commixtus, ad unum cochleare, in aqua calida dandum erit. Si de feſuore autem, etiam tempore digeſtionis, odor ſu-

mosus quidam, quem aliqui Carbunculum appellant, & dolor hos sine **A**
gultus procurauerit, continuo aquam gelidam bibentes, uomitus &
sternutamenta prouocent, & acetum si sorbeant continuo sedatur. Et
am papyri radix masticata, frequenter singultus compescit. Item ad sto
machi uaporem, in pulsa sex folia uitium trita impono.

Cum uero nigra cholera stomachum attentarunt, ut ex inflatione **S**
molesta, cum aliquibus melancholicorum accidentibus publiscentur,
continuo inter initia, spongiam cum aceto uiscido infusam, eidem sto
macho conuenit adhiberi, & hederę folijs in uino coctis, & tritis, ca
raplasmari. Cibis nutrantur competentibus, ouis, alica, iuscellis pin
guum gallinarum, & ungularum porcorum: phasianorum, uel per
dicum carnes accipiant. Si uero inflatio illa necdum digesta, adhuc
perseuerauerit densior, pulegij herbę decoctionem conueniet accipe
re, aut calaminthes, mixto melle despumato.

De LUMBRICIS Caput XVII.

CVM VERO corruptis stomachi humoribus incompe
tentibus, saepe quoque cibis praesumptis, seu per ægritudinem,
seu certe sine febribus, Lumbrici innati fuerint, qui aliquando eun
dem stomachum, aliquoties inferiora possident, hos sic excludendos
suadeo. Primo aduertendum est, tres esse differentias Lumbrico
rum. Sunt rotundi, & rubri, sed minus noxij. Sunt latiores, & albi
diores molesti. Sunt minuti, & tenues, ut uermiculi, sed sollicitiores.

**Lumbricorū
tres species.**

B Hi licet omnibus ætatibus semper nasci possint, attamen infantibus
frequenter familiares sunt: quibus dare conuenit centauream, uel la
bruscā, uel santonicum, & epomphalion ex lupinorum farina, aut
absynthium ponticum, aut melanthium, aut abrotanum, in mellicra
to temperata imponi: cui decoctio ficuum admiscenda erit. Dabo mi
xtarum decoctionem, & easdem mixtas comedendas permitto. lu
uenibus uero nasturtium cum melle coctum dabo. Raphanos expedit
accipere, & succum eorum. Dabo diamoron pro eclegmatio: & ea
dem hora conueniunt synapi, cum oleo tritum. Bene datur & hydro
mel tepidum, ex ueteri oleo temperatum. Et succus pisanæ, in quo
polypodium coqui debet. Et cornu ceruini combusti puluis, cum mel
ledatus, continuo lumbricos excludit. Sic menthæ uiridis decoctio,
sicerucæ, siccaulium, sic roris syriaci, & malogranatorum immatu
rorum. Cataplasmata autem adhibeo ex pulueribus, sicut supra, lupi
norum, absynthij, pennarum combustarum, abrotani, & melanthij:
& puluis eorum cum aqua calida datus satis iuuat. Epomphalion uero his ex
subiectis adhibeo. Fel taurinum cum melanthio, abrotanum tritum
cum lacte mulieris, ficus pingues, aut dactylos tritos cum melle despu
mato, commixtos: & cærotarium in quo cymini puluis, uel absynthij

**Lumbrici
rotundi.**

ἑπομφάλιον est
medicamen
tū, quod um
bilico applica
tur. Nam um
bilicus a Græ
cis *ἑμφαλῶ* di
citur.

- C**ommiscendus erit. Exercitia pro modo uirium adhibita proderunt. Cibi dandi sunt digestibiles: & per interualla clysteres acerbiores adhibiti, satis iuuauerunt. Si illi latiores infestauerint, hos myrrha pinguis accepta continuo excludit: & allium frequentius si comedatur. Sic his etiam omnia acria profuerunt. Nam & uomere cogendi sunt, & continuo scammoniae purgandi cathartico: ubi elaterion, euforbi-
um, piper, nitrum, coccum gnidium admisces. Ego uero & magistrorum experimento, & nostro, longo prolato iam tempore, cathartico cum his semper utor. Scammoniae ÷ III. combustarum pensarum puluerem unci. I. euforbijs ÷ III. nitri partem semunciae unius, & omnibus tunsis, cribellatis, cum mellicrato, aut uino dulci unum cochlear semper dedi. Salubrius autem contingit, si ante diem allium, uel caetera acria edant: allium quidem maxime comedere conuenit. & oleum bibere calidum, sed uetustum: ut superius significauimus. Minutos uero & tenues uermiculos, myrrha pinguis semper accepta excludit. His etiam clysterem expediet adhiberi, & omnes decoctiones superiores calidas, & oleum calidum acceptum, in roris syriaci succo, cum aqua calida. Et fefeli cum melle, infans felle taurino, uel cetino perungendus erit. Si stomachum uero diutius attentauerint, & ibidem frequenter inquietudinem fecerint, semper sales in ore ferre conuenit, ex quibus humor liquefactus, defluat in stomachum, qui & omnia intestina, a lumbricorum molestia liberare possit. Omnia itaque supradicta accidentia, quae cum suis proprijs remedijs exposui, aut indignanti stomacho obueniunt, aut quieto sedantur.

D De DYSENTERICIS, uel NEV-
TERICIS. Caput XVIII.

DYSENTERICORVM fit causa molestior, temporis prolixitate. Frequenter enim uentris effusio, corpora assidua uexatione debilitat. Est namque Dysenteria intestinorum uulneratio, cum reumatismo, quae conatibus, & ueluti desyderio, & egestionum suauium debilitate, membra consumat. Dysentericorum ergo adiutoria, ex subiectis compendiose percurram, & cibos, & potus, seu potiones, uel antidota, & caetera quae nonnullis ordinandi erunt. Cibus inquam conuenit, panis mundus, siccus, aut Cyprius, aut Alexandrinus, uel potius Africanus: succi alicae, milium, oriza: quibus concoqui debet, aut caprarum adeps, gummi, aut symphyton, aut ros syriacus, aut certe ichthior colla: sic etiam lac bubulum conuenit, oleum uiride his frequentius misceto. Expediunt caules decocti, plantago, portulaca, polygonon, symphyton. Horum omnium quammaxime folia, uel mellis cymi, ex oleo & aceto conditi: oua in aceto cocta forbilia conueniunt: et ex uitellis eorum patellae, perfusae cerebello puluere, aut gallarum, aut roris sy-

Lumbrici
latiores.

Experimentum
Autoris.

Lumbrici
minuti.

Dysenteria.

Cura.

riaci. Pisces, aut * Capones, aut lepores, aut mugiles, & cæteri sicciores. Caseus uetus proderit, nisi tibi magis recens libuerit. Lac asinæ in dyplongio coctum proficit, & bubulum schiston iuuat, & confectio ex lapidibus fluuiialibus. Sic lac caprinum syluestre facit. Si carnes dandæ sunt, iuuat phasianus in pusca decoctus, palumbus matri subductus, tur tur, & lepus, & cætera syluestria sicciora, maxime uolatilia. Quæ enim neque uillarum, neque urbanorum usum habent, natura profecto sicciora consistunt. Mala citonia conueniunt in uino cocta, mespila, malo granata, paulo imatura, amygdala, dactyli thebaici, & his similia. Potus uero, licet primis diebus aqua bibenda sit, parcius attamen comunicandum fuerit Tiburtinum, Surrentinum, Marficum, Siculum, in quibus primo ferrum ignitum infundendum est. Sin uero confici uina placuerit, fit myrthinum, fit cenanthinum, fit cum mespilis, fit cum sorbis, fit phœnicites. Quæ tamen omnia in uasis picatis reponenda erunt.

Omnia quidem de cibis percurri, sed melius, si unius speciei subministrantur. Nam si de singulis in simul commixtis, reponas, in stomacho digestionem impediunt. Potiones uero, uel antidota, cornu ceruinum combustum puluis, in aqua, aut in uino stiptico datus iuuat. Sic cõagulum leporis in uino similiter. Sic uenerum caponum, uel anseris, uel cæterorum agrestium, membrana combusta interioribus conueniunt, & ros syriacus tunsus, & roris syriaci flores, & malogranati, & succi herbæ polygonij, & arnoglossæ, acaciæ, hippoquistidos, ut tibi uisum fuerit, ministrandi sunt. Trochisci uero, aut emplastra, Andronius, aut Diaspermaton, & cætera de experimentis. Et si purredo uulnus attenta uerit, inijciendus est Athereus: uel causticus puluis ex auripigmento, calce uiua, sandaraca, charta combusta confectus, cum uino stiptico, uel succis herbarum similiter constringentium. Adiungitur frequenter etiam lac, in quo licium indicum soluitur, & uinum in quo cantabrum coquendum est, aut ros syriacus, & cætera similia prædictis. Potionibus uero superscriptis, conuenit aromatica commiscere quamplurima, quæ stomachi uires nutrant. Omnia etenim hæc, etiam uentris poterunt continere resolutiones. Et diuretica dysentericis opus sunt, maxime dum mensatus fit illius reumatis. Deriuatio etiam hypnótica conuenit, quæ somno * superatis uiribus corpora dimissa constringit. Semper enim importunæ uigiliæ, corpora reumatizantia fatigant, si his uisio innata fuerit. Eius remedium in Euporisto nostro inuenies. Nam etiam uinguenta dysentericis frequentius profuerunt ex oleo melino, nardino, cenanthino, mastiche, myrrha, cenanthæ, acaciæ. Et cætera similia commiscendo: cataplasmata ex dactylis, citonijs, & cæteris mixtis stipticis temperata: adhibeo, & emplastra, uel malagmata, ut diatheon, aut barbaron, & cætera exeranthica. Hæc omnia dysentericorum, etiam cõcoliacis conuenire manifestum est. Si cõmotiones, uel pondera perse-

A * Pro Capito-
nes, ego lege-
rem Capões.
nam sunt etiã
pisces Capo-
nes dicti, inter
præstantiores
marinos. Qd
si capitōs di-
cere uelimus
eos, qui hodie
in Italia Ce-
phali uocant,
qd perinde so-
nat, ac si capi-
tōs dicas, fru-
stra subiūgere-
tur, Mugiles.
hã antiq̃ mu-
giles dicebãt,
qui hodie Ro-
mãnis Cephã-
li uocantur, et
ab Hispanis
etiã Mugil-
es uernaculo
sermōe dicti.
Itē p̃ lepores,
aliud uerbum
substituendum
est. Nã lepus
marinus inter
uenenã acerr-
ma ab oĩbus
scriptorib, nu-
merat, sic ut a
mensa morta-
liū merito ar-
ceant. Ego itã
q̃ p̃ lepores,
lupos legere.

B Vel sic * Que
somnia, defe-
cta uiribus cor-
pora constri-
git.

Potius γαυρί-
πικα. ἀπὸ τοῦ
γαυρίπλου.

C uerauerint, quæ Tenasmones appellamus, hæc frequenter procurant uentris exponendi suauitatem: sæpissime mitigata sunt hijs, quæ aut in scœnogreci decoctionibus, aut althææ radicibus conficiuntur. Nam & cærotario hoc, frequenter curati sunt. Ex adipibus anserinis, cæra, & butyro, & pice bricia, sæpe sedentibus post uaporum fumigia profuerunt. Inijciendi sunt aliquando oleo roseo, uel myrteo, &

Locus est deprauatus. Videtur tamen hoc uel le inuere. Post iniectionem illos in balneo aluminoso constitutos esse, superimposita lana succida. &c.

Nota ἀναδίσσω, ἀπὸ τοῦ ἀνὰ, quod est ligō, reuincio.

* incontinenti luminoso supponendi sunt, in basilicon, infusi cærotario ex oleo plumbeo confectio. Lanam interea succidam superimpono: quam anadesmos ex more continere debet. Iuuabunt sane etiam saccelli, uel cataplasmata, eodem anadesmo perseverantia, de dactylis in passo tritis, aut hordei pollinibus cum oxymelle. Lac bubulum potui datum, ac lintheolo umbilico impositum, sine mora medebitur. Lienteria si obuenerit, quæ ueluti quendam limum intestinis obducit, transitu reumatismi, ex quo nulla penitus ciborum solennis ualeat digestio celebrari, sub alio nobis ordine curanda erit. Vtor acerbo clystere ex succis ptisanæ, ubi aut colocynthides, aut betæ coquendæ sunt, aut scammonia soluenda. Vtor cum his catharticiis. Dabo cibos acerbos, & cætera quæ fuerunt acria. ut allium, & raphani, & cepæ, napæ, synapi, piper, & omnia fassamenta.

Imminebo interea exercitijs quibus uoluerō. Impono uentri cærotaria ex oleo laurino, cyprino, uel sicionio, habentia rutam uiridem, cyminum, baccas lauri, nitrum, uel certe castoreum. Impono polyarchion, aut diaspermation, quæ tunc iam conueniant: aut naturale sulphur, uel bitumen, & dropaces, & synapismi, & cætera staltica adhibenda sunt. Ex dysentericis etenim lienterici facti, & uirium fatigatarum intuitu, & temporis prolixi præiudicio, difficile sanabuntur. Nam ex his hydro-

ἐνδύματα ἀπὸ τῆς ἐνδύσεως, quod mitto, traho. &c. significat.

κατακλινῶν.

¶ De HYDROPICIS. Caput. XIX.
HYDROPICI, uel Cachectici simili sub diligentia uisitantur. Qui enim prope ex similibus accidentibus fiunt, æquali sub indignatione tumescunt. Hydropicorum ergo difficile, & periculosum negocium est: eoque difficilior, si indigestio totis corporibus superueniat. Labore attamen nimio, & continuis quassationibus exercitiorum, forsitan curabuntur. Hos frequenter febres peritiales comitantur, quarum opportune temporibus seruientes, nos etiam adiutoria ordinare conueniet. Febribus itaque sub hac obseruatione desinentibus, iam exercitijs ex paruo labore crescentibus, imminendum est: subinde fricationibus, solaribus quammaxime, & cæteris. uaporibus sudorem prouocantibus: sub quibus omnibus uimentibus locis nitrum, aut sales tritos aspergo. Post exercitia, uel la-

Fricationes solares puto eas dici, quæ ad solem feruentem fiunt.

borea continuo oxymeliten dabo, aut raphanum eodem infusum. **A**
 Quibus acceptis, ex parte uomere cogendi sunt. Lauacris tunc uti
 conueniet, sed marinis, quibus ueluti membra laborantia foueantur.
 Interea acra omnia, & salfos cibos conuenit accipere, caules elixos
 cum salibus. Parcitas cibi, & potus quammaxime continentia instet.
 Etenim his procuratis, si animosius sustineatur, grande remedium est.
 Vinum, licet per interualla, austerum tamen, & quod sit diureticum
 dandum est.

Si uero multus humor ex putrefactis eorum carni-
 bus aggregatus, uentrem satis adimpleuerit, membris cæteris minu-
 tatis, faccellos ex tostis salibus, uel milio similiter, sub umbilico locis
 admoueo. Et de arena calida in littore, hæc loca detergere maximum
 interdum est beneficium. Aliqui etiam tritico sic tecti, iuuati sunt. In-
 terea acetum scylliticon frequenter dedi, & siccis fricationibus immis-
 nui. Imposui emplastra reuocatoria, amyctica, maxime autem infan-
 tibus competenter adhibenda cataplasmata, desiccantia, ex flore ma-
 logranati, & cæteris stipticis, cum lenticulæ pollinibus, passo, & a-
 ceto temperata. Aliqui uero scarificauerunt furas eorum, & alio-
 res plagas fixerunt, de superioribus humorem deriuare cupientes, &
 sub umbilico paracenteses frequentius adhibuerunt: per quæ conue-
 niet exinanire paulatim, ac per interualla dierum, ne subitanea effu-
 sio, secundum Hippocraten, continuo periculum faciat. Sane po-
 tiones, uel emplastra probata sæpissime profuerunt, ex quibus ali-
 quod compendiosius designabo, Emplastrarum quod etiam splene-
 tics sæpe profuit, hoc est. Fœnogreci pollinis ÷ IIII. hordei ÷ II:
 II. stercoris columborum ÷ IIII. resinæ frixæ libram. I. cæræ ÷
 VIIII. acetum quod sufficiat terendo pulueri, qui postea solutis ad-
 miscendus erit. Aliud. Semen miricæ, & galbanum ex æquo tunc
 sa miscentur, superaddito quippiam olei, ut emplastrum temperies fi-
 at: quod perseverantius adhibendum est. Aliud. Pilæ cypressi in
 uino coctæ, & tritæ, axungia ueteri colatæ ex æquo miscentur, &
 imponuntur. Quod si permanserit, satis iuuat. Aliud. Ficus pin-
 gues tufas libra una, & nitri, & absynthij unci. III. hyssopi caroto
 admiscet: ut emplastrum temperetur, & uteris. Nam & stercoris bu-
 buli puluere, hordei pollinibus mixtis, & cum oxymelle coctis ca-
 taplasmas. Similiter de caprarum stercore frequenter adhibui.

Et unguenta sunt utilia hæc, quæ tumentibus partibus, sub sole
 adhibita profuerunt. Cymolia in aceto contrita, boum stercore cum
 nitro, & oleo sicionio mixta, & quippiam uini.

Nam etiam has potiones accipientes, sæpe iuuati sunt. Sambuci
 radicis succus, cum oxymelle datus est, & continuo purgando pro-
 fuit competenter.

Et euphorbij granum, in ouo datum cum pane, corpora hydropico-

παπαλιτρίσις
 est ferrū, quo
 chirurgi utun-
 tur, ad curam
 aperiendam.

B
 Emplastrum ad
 hydropin.

Nota hoc etiam
 num quidam
 ex empiricis
 utuntur.

Crum, aliquoties similiter depurgauit. Aliud maius purgatorium. Stercus columborum drachma. i. rutæ semen drachmis duabus, in oxymelle similiter datur. Inter hæc omnia adhibenda erunt, perseuerantibus exercitijs & laboribus, catholice salutem procurantibus, sub quorum perseuerantia, hydropum poterit abigi periculum.

¶ De RENVM uitijs, & Vesicæ.

Caput xx.

RENIBVS longo tempore dolentibus, semper uapores, fomenta, & cataplasmata paragorica conuenerunt. Diuretica uero sub initijs obfuerunt. Indignantibus etenim & reumatizantibus renibus, positionum transitus aduersatur. Declinantibus uero doloribus, beneficij primo catholicis adiuuandi sunt, fricationibus, & unguentis paragoricis, & siccantibus: etiam ciclicus ordo percurrendus est. Adiutorium emplastri polyarchion, aut diaspermation sæpe conuenit. Calamintha tunsa cum axungia, & imposita, multum profuit. Dabo etiam potiones ex storace, galbano: uuam passam, pinguem, purgatam: mixtis diureticis aliquibus, ut petroselinum, ameos, asarum, cyperum, daucum, amygdala amara, cum mellicrato. Dedi ego frequenter etiam hyoscyamon. Interea oportet aquis uti dulcibus, & naturalibus, & cibis nutriti omnibus digestibilibus. Dabitur etiam hæc potio omnibus uescicæ, uel renum caussis, & pectinis. Semen lini, papaueris dulcis, draganti, in uncij singulis, amyli in duabus tunsis, & cum aqua diuretica temperatis, ut trocisci fiant in drachmis singulis. Sit autem aqua diuretica omnibus probata, in qua coqui oportet radices feniculorū, apiorum, gramen, & cicer uenerum. Sæpe etiam mastice de superioribus speciebus, quas ad tempus, aut locum habuerit. Aliud, quod & uulnera curet, & urinæ difficultatem aperiat. Ozimi, & agrestis maluæ semina, in drachmis semis, & apij seminis uncia. i. amygdalarum, uel auellana rum semuncie singule. Omnia trita, melle temperentur. Sunt & cætera potiones sub renum & uescicæ occasione, etiam splenis, uel epatis, aut hydropis molestiam refrenantes, quarum in his omnibus experisum efficaciam. Phu. ÷ i. celticæ ÷ i. dauci ÷ i. cinamomi ÷ i. piperis drachmæ. vi. i. meu drachmæ. vi. asari ÷ i. petroselini drachmæ. vi. opobalsami dr. vi. croci ÷ i. liquiriciæ dr. vi. picis indicæ dr. vi. cassiæ dr. iiii. amyli dr. vi. uuæ passæ ÷ i. draganti dr. iiii. uino & melle potio temperatur, & dabitur. Interea licet ex omnibus diureticis speciesbus superius comprehensis, omnes uescicæ uel renum caussas posse curari significatum sit: attamē cum speciale sit & hoc uitium, uidelicet urinæ conclusionem sustinere, huic etiam adiutoria specialia ordinanda sunt. Herba parietaria aqua cocta terit cum pauco oleo, & renibus inligatur.

Portio in morbo Renali, etiam aduersus Hydropin utilis.

Hoc etiam de gramine semper factum est, & samfuco in aqua cocto similiter. Nam ex his omnibus etiam sedentibus, uaporem pati conuenient. Cotilidon herba in uino cocta, potui datur, & continuo diffusuriam sanabit. Nam etiam mulieribus butyrum uetustissimum perpersum adhibitum, diffusuriam curauit: & mellicratum in quo immaturi ætherei, & feniculorum radices, & carduus coquitur, & datur ad urinarum impedimentum.

¶ De ARTRITICIS, PODAGRICIS,
& ISCHIATICIS. Caput XXI.

EX VNO FONTE uittorum, hæc passiones deriuatæ sunt, sed locorum uarietate, & nominibus determinantur. Nam Artriticis omnibus, ex articularum commotationibus, subito initium passionis emergit. Podagricis uero ex uno prius articulo est principium. paulatim uero serpendo, grauius omnes postea neruos, et articulos possidens dominabitur. Ischiaticis autem, ex uno coxæ articulo tormenta suppetantur. Fit itaque reumatismus, licet de phlegmate speciali, natura frigida quammaxime fiat, attamen alijs ex humoribus calidioribus aliquando efficitur, & sic effectus, calefacientes aliquando commotiones exuscitat. Frequenter autem hoc phlegma licet natura subpingue sit, uelut est uulnerum sanies, attamen cum se inter articularum coniunctiones, usu commotionum uiscauerit, tunc tardi gressus, tunc dolores uittandi, tunc tormēta grauiora succedunt. Curantur autem hæc omnia contrarijs suis: ut quod forte & sensu, & tactu calidum commotum fuerit, frigidis interim adiutorijs ab augmentis prohibeatur. Postea uero cessantibus commotionum temporibus, calidis, chalaisticis, & amycticis recuperentur hijs, quibus ille humor uiscosus, & pinguis interiora iam possidet calefactus, uel tenuatus ab articulis per commotiones frigiditibus: quibus uero tumor est semper inflatus & pallidus color, calidis supradictis adiutorijs, & amycticis imminendum nobis erit.

Monitum te interea uolo, amice charissime, quod quando generaliter interioribus membris dolor iuuatus, nexu quodam, ex collisione humoris uentositatique colligatur, tum in frigidis plerumque difficulter deprimi poterit, uel depurgari: ergo quum uariæ emergunt species motionum, quæcunque expediunt, medicorum coniecturis, uel iudicio, indulgenda erunt. Licet iam ex consuetudine sibi adhibita, melius is qui patitur possit iudicare, quem frequentes commotiones, & adiutoria famulantia, medicum effecerunt. Quanquam autem rationabiliter omnia adiutoria, quæ ueluti calidis commotionibus adhibentur, uirtute chalaistica & paragorica esse debeant, quo neruorum & articularum nutrirī, & foueri ualeant loca, concedo tamen, ut ea frigida interim adhibeantur quæ turborem magis in tempore, quam mitigationem præ-

A

Corrupte scriptū est ætheri: puto autē legendū, Cgdri des, uel Citreos, de hijs em apud Diosco. reperio, q̄ in stranguria atq; diffuria adhiberi soleat.

Artritic.

Podagrici.

Ischiatici.

B

Cura uniuersalis.

Cautela.

Frigida nervis
contraria.

C stare possint. Quibus quidam, ut ille ait, primo releuari videntur, postea grauius, uehementiusque affliguntur. Hoc etenim etiam nostri Hippocratis nos instruxit autoritas, quod nervos omnes, semper frigida nocuerunt. Ergo quoniam & caussas, & origines compendiose digessi, curæ nunc rationabiles, & adiutoria ordinanda nobis erunt. Est namque in professo, quod omnes ægritudines particulares, sub corporibus membra nexu quodam familiari amplectuntur, mysterio naturali, ut in singulis, totius corporis substantia constet, & altera alterius auxilio gubernetur. Ideoque nisi præceptis, & adiutorijs catholicis primo iuuentur, aliter particulares caussæ curari non poterunt. Qua de re, erit nobis nunc curarum, præceptorumque exordium in sequenti etiam particulis disponere. Conuenit in principio Artriticis, Podagricis, uel Ischiaticis, quibus de capite reuma resolutum descendens has passiones fecit, prius ipsum caput oleo roseo frigido, uel cæteris similibus stipticis fomentando constringi, & solidari: dehinc inferiora transitu eiusdem reumatis, uel sedulitate uexata, aut ex oleo calido resolui, uel depurgari. Item cucurbitis, uel fricatione, uel perunctione phlebotomum præueniendo, uno penitus, uel pleno anno utendum est.

Cura.

D Sic a carnibus politrophis, sic ab usu uenereo continendo, stomachi præ omnibus bona ualetudo custodienda est, quo accepti cibi facilius transigantur. Vomitus hos, non longa per interualla multum iuuat, aliquando post consuetos cibos, aliquoties etiam ieiunos, acceptis radicibus cum oxymelle. Hoc modo etiam bulbi ex aqua cocti operabuntur. Hoc si etiam post cenam allium accipiant, quod paruo interuallo aqua calida accepta uomitum faciet. Mutationes aeris, uel prouinciarum sæpe conueniunt. Aquæ naturales calidæ, uel uapores earum similiter. Exercitia sane, & labores, uel fricamenta totius corporis & procuranda sunt, & appetenda utentibus. Etenim humores supradicti pinguiore effecti, etiam uexatis articulis dominantur. Igitur quo modo hæc adiutoria compendiose digesta sunt, ita moneo & suadeo custodiri debere. Experti enim sumus, quod plerique ea cautius ab initio custodientes, podagræ uenturæ, seu potius iam præsentis uolentiam uitauerunt: præiudicantes uero iam tempore, & manifestis podagricis, cataplasmatibus semper his caussis competentibus, unguentis quoque, uel emplastris, seu cæteris adiutorijs consuetis uti rectius est: uel certe aliquibus physicis magnam semper potestatem præstantibus.

Quo quidam
podagram de
pulerunt.

Nunc uero transactis præceptis, uel beneficijs catholicis, quibus custoditis, etiam adiutoria singulis partibus laborantibus ordinabo.

Cura Ischiadicorum.

Ischiaticis conueniunt præ omnibus uomitus, & cætera præcepta omnium superiorum. Coxæ uero dolenti fots olei sicionij, rutacei, uel laurini adhibendus est: cataplasmata quoque natura calidiora. Cucurbitis uentosis frequenter locus releuandus est, acerbius clystere injiciendū.

Ex hoc enim frequenter sanguis prouocatus, Ischiaticos liberauit. His phlebotomus in talo adhibendus. Vaporibus, uel saccellis imminendum est, ex pulegio, salibus, uel milio falso. Si uero uel stare, uel ambulare potuerint, acopis calidioribus, sole sub ardenti fricandi sunt, in quibus & pix liquida, et oleum sicionium, uel cætera superius comprehensa miscenda. ut sal ustum, tapfia, nitrum, uel opopanace. Itineris interea laboribus cōacti iuuandi sunt. Expedit etiam equi uectatio: expedit iniectio in modica quantitate ex oleo amaracino, aut syrino, uel laurino, uel glaucino. Si uigiliæ sane interuenerint, doloribus perseverantibus, soporiferas ingero potiones. Cum uero minoratis doloribus causa mollior fuerit, tunc uelut per dialemma, dropacibus, synapismis, & cæteris causticis imminendum est. Dabo hyeram, dabo per cibos elleborum: quæ omnia prodesse poterunt, si catholicis præceptis rectius seruiatur. Hæc etiam Phcealgicis rite conueniunt, quibus lumbi dolere consueuerunt. Igitur quoniam hijs passionibus supradictis, ex una origine descendentes, ueluti diuersas cognouimus euenire commotiones, ut aliquando calidas, aliquando frigidas patiuntur, singulis hæc adhibenda erunt. Quibus uero sub calido tactu, pedum dolor obuenerit, caulium folia in aceto cocta, & contrita, & ouorum coctorum media duo, pro cataplasmate adhibita, ueluti commotionis uaporem retemperant, superaddito quippiam olei rosei: sed sapius tepefacta immutanda sunt. Et si cataplasmati consueto hyoscyami folia elixa, & trita superaddas, par beneficium præstas. Aliud. Ad impetus eorum uapores, draganti uncia. i. ex pridie in aqua infundes. Item alia die teris, et superaddes æruginis, & aphronitri albi uncias singulas, & impones.

Aliud. Lenticulam coctam teris, cum oleo roseo mixtam, & similiter adhibebis. Nam & lactucarum folia trita cum infuso pane, & adhibita, magnum ad refrigerandum beneficium præstant. Et opium, & crocus æqua mensura, cum lacte bubulo, uel caprino contritus, & impositus, similiter operatur. Et si ex oleo roseo cærotarium misceatur,

hoc idem erit. Hæc de uapore dolentibus ordinaui: cæterum refrigerantibus commotionibus, uapores, cataplasmata, unguenta chalastica, uel paragorica, omnibus & nota sunt, & consueta.

¶ FINIS LIB. II.

Ποιόχυμος δicitur
tur lumbos dolentes
ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ, id est, lumbis,
καὶ ἀλγῶν, quod dolere significat.
Contra Podagram calidā,

B

C **I**N OCTAVII HORATIANI LIB. Tertium,
ad VICTORIAM, Depassionibus Mulierum, &
curis earundem, PRAEFATIO.



INTELEXISSE te non minus nobis arbitror VICTORIA, artis meae dulce ministerium, omnem mei operis efficaciam, in quo inemor non sum praefationis meae, quando duobus Libris pares causas proposui Euporisto, officium uidelicet meum, in logica disputatione: sed non longe abest, ab utroque gynaecearum uisus ratio. Et quoniam haec ratio tota medendi indiget diligentia, solitaneum libellum confeci de Mulierum curis: solitaneum inquam, & remotum a publico spectaculo. Et ego quidem te scientia iuuabo. Tu uero, cui communis arridet sexus, & secretum facile inuenit tua conscientia, cum fiducia exerce sedulo gynaeceam propositam meo tractatu, & tua diligentia adhibeto medicinam.

CAPITA LIB. III. Gynaeceia dicti.

- 1 De Mammillis post partum dolentibus.
- 2 De Praefocatione, quam uocamus *ιερταει πιγαν*.
- 3 De Inflatione, uel tensione matricis.
- 4 De Artriticis.
- 5 De Conceptione.
- 6 De Abortu.
- 7 De Fluxu sanguinis, seu hemorragia matricis.
- 8 De Vuulneribus matricis.
- 9 De Fluxu reumatis, quem *ρευμα* appellamus.
- 10 De Gonorrhia, hoc est, spermatis effusione.

D

COCTAVII HORATIANI GYNAECIA, seu LIB. III. De Mulierum passionibus.



C De MAMMILLIS post partum dolentibus. Caput I.

MAMILLAS cum tensione tumentes, uel dolentes, quod post partum quae maxime mulieribus euenire consuevit, quas ex eo etiam grauis dolor inquietat, hoc ordine curare debemus. Per initia mediocriter constringentibus uti conueniet. ut est spongia mollis, infusa in pusca, quae leui anadesmo continenda erit. Sic etiam dactyli, cum pane in pusca infusi, & contriti, saepe par beneficium praestiterunt. Si uero certa ratione lac prohibendum erit, cataplasmati superiori admiscendum est, aut alumen scissum, aut herbae pulicaris semine, aut coriandrum, aut portulaca. Nam & unguenta ex solis earum succis

Cura.

frequenter adhibuimus, cum penna molliore loca tangentes. Si indigatio illa, his minime potuerit prohiberi, & lactis aggregatio, maximū feruorem locis incusserit, tunc cataplasmatibus chalafticis conueniet imminere, ut est panis in mellificato infusus, et cum oleo dulci contritus. Si militer etiam de seminibus tam lini, q̄p̄ scenogræci, uel hordei farina, alijs quando singulis, aliquando cōmixtis, & cum adipibus sæpe porcinis recentibus, in mellificato temperatis. Sane si pondus cataplasmatidis tolerare non potuerit, spongij mollioribus infusis in aquis chalafticis, dulcibus, & paragoricis, quæ ex hybisco, & seminibus lentis, & scenogræci conficiuntur, loca tantummodo uaporanda sunt: & impositis continuo lanis, oleo dulci calido infusis, fouenda erunt. Si saniem forte collegerint, iam suis temporibus, & proprijs adiutorijs maturata, aperienda erunt: ut sub una egestione possint penitus percurari. Si uero minime percurari possint, transacto impetu, uel indignatione mammarum, simplex cærotarium adhibendum est, usque in plenam sanitatem.

Sane si eadem infantem nutrire minime decreuerit, tunc cærotario supradicto puluerem confusi lapidis molaris admiscebo, anadesmū quoque mediocriter stringo, lactis impetū prohibiturus. Quod si lactandi arripuerit uoluntatem, tunc anadesmus laxior, tunc fomenta chalaftica adhibenda erunt, quæ lactis non prohibeant copiam ministrari, sed magis præeuntibus fomentis, & uaporibus supradictis, cypero, ouo, & croco in unum contritis, mamillas ungendo adiuuabo. Alij pumicem cum oleo cyprino tritum imposuerunt. Alij cymium cum aqua contritum. Alij uero fabæ pollinibus uiam passam purgatam, & confusam miscuerunt, & ex his cataplasmando, lactis auxerunt fecunditatem. Sic sesamo trito cum oxymelle, sic cantabro cocto similiter in oxymelle, sic de hederæ folijs contritis, sic de ficis pinguibus tunsis, sic de cauleis recentibus, tritis cum oxymelle, cataplasmata confecerunt. Quibus omnibus lactis secundum officium procuratum est. Si lactis interea nimium pondus, etiam duriciam procurarit, folijs apiorum, uel mentha, uel caulium cum pane tritis, & mellificato, illam duriciam resoluiamus. Ergo per initia generaliter omnibus mediocriter stipticis obuiandum est: per augmenta, uel impetus, chalafticis uel paragoricis: & licet hac lege medendi omnibus seruiendum sit, attamen māmillarum mollium intuitu, omnia moderatius sceminis adhibenda sunt.

Mammillæ sanie tumentes.

Cura Mammillarum lacteseruantium.

Contra Mammillarum duriciam.

¶ De Præfocatione MATRIS

C I S. Caput II.

SUNT VARIÆ & diuersæ causæ Matricem frequentius attentantes, quæ licet sub duabus præcipue principalibus passionibus, constrictionis, uel laxationis comprehendantur, tamē etiam partim sub certis accidentibus, alias causas efficiunt: Huic ergo sub definita lege

C profefsionis, quæ constricta sunt soluo, resoluta uero (quibus quam maxime & lassitudo sociatur) stipticis potissimum, atque mediocriter frigidis stringo. Quibus autem repentina commotio Matricis innas- scitur, hæ musculorum omnium contractione, & totius corporis do- lore nimio quatiuntur: & hac ui sæpe interceptum uocis officium, sub horrore casus, ueluti paraliseos mentitur imaginem: quam pafsionem in græco opere *ὀστρίκων νόσον* appellamus. Quo tempore ad illa duo præ- sidia principalia, omnibus conclusionis necessitatibus subuenientia, re- curremus, phlebotomi præsens beneficium, & uentris purgationem. Specialia uero fomenta olei dulcis calida, & aquarum consueta chala- sticarum cataplasmata de seminibus paragorica, cum mellicrato. Em- plastra, ut diaquilon, cærotaria simplicia ex adipibus temperata, & me- dullis. Pessaria ex melle & butyro. Item libianum, & cæra, quorum con- fectiones subiectis adiungo. Ex encolpismis succis, aut prifanæ, aut scæ- nogræci, aut olei dulcis. His articuli & calefaciendi sunt, & mollius constringendi. Ventosis quoque admotis inguinibus, uel femoribus, recurui, uel inclinationi matricis occurremus. Fumigijs bene olentibus, ad inferiora matricem prouocabo. odoribus enim grauibus reper- cutitur. Minoratis uero supradictis accidentibus, plena quoque decli- natione, manifesto conuenit iam exercitijs aptis sexui commoueri, & aëris, uel locorum mutatione iuuari. His cibi humaniores, his iam laua- cra concedenda: uinum attamen sub moderatione.

¶ De inflatione, uel tensione **M A-**
TRICIS. Caput III.

D **I** N F L A T I O N E M, uel tensionem si longo tempore Matrix ægra concaperit, omnibus superioribus chala sticis & aptis constricti- onibus imminebo, superaddens cataplasmatibus ficus tunsas, absynthij puluerem, uel eius decoctionem, epithimata amyctica ex puluere lauri baccarum, pyretri, castorei, nitri, & cæterorum similium, cærotario cum mixtorum. Expedit frequenter polyarchion uti. Encatismata uero, uel uapores ex decoctionibus stafilini, dauci, pulegij, uel cæteris simili- ter diureticis procurabo. Inflationibus diu permanentibus, artemisia admiscenda, aut marrubium, hyssopus, aut bacca lauri: aliquando ca- sia, & celtica: ex quibus etiam pessaria conficienda erunt. Nam ex ruta uiridi, trita cum melle. pessario semper utor temperato. Superaddo ni- trum, uel aphronitrum, pulegium, ficus pingues purgatas, & contu- sas, cyminum: sed ad eorum sensum mordacem, & calidum temperan- dum, lactis temperabo commixtione. Si uero duriciam contraxerit, quam alibi mylen appellamus, hanc primo sicuti contra inflationem ordinando contexuimus, adiutorijs chala sticis imminens soluere labo- rabo. Omnibus supradictis constrictionum accidentibus minora-

Matricis com-
motio.

Græci opus
Autoris.

ἡνκολίσμῳ ui-
det esse uoca-
bulū a re ipsa
deductū, nem-
pe ἡπὸ τοῦ κόλ-
πῃ, quod sinū
significat, ut
scilicet ἡνκολπί-
σμος dicat in-
fusio, quæ fit
in sinū, quod
alias per pes-
sum, aut na-
stale medici si-
eri præcipiūt.

ἡνκατισμάτι.

μύλην.

tis, iam conuenit ex paruo leues attentare gestationes, & sub certa de-
clinatione passionis, appetere lauacra, cibos humaniores præsumere,
& post resumptionem corporis, anechicis temporibus, omnes ex ordi-
ne ciclicas disponere curationes, inguinibus adhibendas.

Hæc semper perfolidabit etiam lauacrorum fri-
gidorum consuetudo disposita.

De ARTRITICIS.

Caput IIII.

CONTINGIT interea frequenter certa, & specialis passio
fœminarum, ut aut naturaliter aliquando clausæ nascantur, aut uul-
neribus præeuntibus, ac cicatrice interueniente clausæ fiant, aut præ-
senti indignationis interuentu penitus concludantur. Si ergo ex
caussa præsentis indignationis obductæ fuerint, omnibus chalaisticis
adiutorijs, ex lege resoluendæ erunt. Sed si ex uulneribus obductæ
cicatrices, aut nescio qua illa lege nascendi clausæ fuerint, quod tam-
en aut digitis, aut oculorum possit fide probari: tunc a chirurgicis con-
siderata mensura, referandæ erunt: ea tamen intentione, ut hæc pate-
factio, lintheolis, aut alijs adiutorijs patefacientibus diutius disternes-
tur, ne obductæ in se identidem scissuræ recentiores, occasi-
onem claudendi protinus sortiantur.

Artrtica
passio.

De CONCEPTIONE.

Caput V.

ALIQVÆ mulieres, quæ uoto posteritatis longo tempore
desyderatæ, afficiuntur, medicos accerferunt, quas effectus elaboratæ
conceptionis, felices & peritas exhibuit, Nosti itaque o Victoria, pro-
fessionis cōmunis hoc magis esse necessarium ministerium, quæ ex offi-
ciji sedulis in his magis rebus experimentum habes, quantum aut gra-
tiæ, aut gloriæ accrescat * medicæ promittenti, si suscepta conceperit.
Vnde licet inficia non sis huius curæ, conceptionem procurantis, attam-
en disposita tibi, consideratis omnibus ordinauim, per quæ curandum
erit. Prius inquirendum est, necubi officium matricis, aut inclinac-
tum sit, aut conclusum: unde aut modicis purgationibus aperientibus
impeditur, aut tempore purgationis, internorum dolore nimio con-
quassatur. Quod si forte ita res habet, phlebotomanda erit, de talo t̃p̃
maxime: quo ad inferiora uicinior materia prouocetur. Sic deinde ad
ordinationem curæ aduertendum nobis erit, quæ conclusum prius mo-
derate orificium patefaciat, ut purgatione solenni citra offensam dispo-
sita, & desiccari, & calefieri matrix possit. His etenim rebus ita dispositis,
conceptionis uota facilius subsequantur. Si phlebotomo adhibito,
necdum tempus sua secreta cognouerit, tunc oleo dulci, uel anethi

Alias, * aut
medicæ pro-
mittenti, aut
susceptæ con-
cipienti.

Cno, uel rutaceo inguina fouenda erunt: & post lana, in eodem oleo calido infusa, contegenda. Tunc cataplasmatibus chalaisticis calefacienda: quibus admiscebo aut artemisię puluerem, aut dictamni: quarum etiā in aqua coctarum frequenter uapores exhibeo. Nam & fumigia uaporatis partibus supponi conuenit ex supradictis herbis, lapide gagathe adiuncto. Si his omnibus rite adhibitis, naturalis circa purgationem ordo permanferit, matricis officio mediocriter relaxato, iam adiutorijs conceptionem procurantibus imminuendum est. Continuo igitur cum se purgatio citra offensam transegerit, ex diaquilon, uel libiano, pello cum nardino, uel roseo prius resoluto, encolpismo uti cōueniet. Et post matricis delanationem, ex eodem medicamento, & pello priore, pessarium adhibere continuis diebus triginta conueniet, usque in diem uenturam alterius purgationis. Quibus transactis, libiano nitrum conuenit commiscere, quod adhibendum erit: post encolpismum, ex subiectis speciebus disponendum. Cardamomum, dictamnium, artemisiā, irim, rutā, semen, omnia contusa & cribellata, oleo dulci & plurimo miscenda sunt: ut ex his ante pessarium fomentum adhiberi possit. Commodius interea fiet, si huic fomento recentes porcinos adipēs, aut anserinos admisceamus. Post quod continuo pessario tali uti expediet. Ficus pingues in aqua decoctas, & tritas, melli misceamus: & ex hoc pessario injiciamus. Desuper uero libianum superimponi conueniet. Deinde intersecti nitri glebam accipimus, & in modum balani collyrium factum, molli lana contegimus, quod super illitum libiano injiciemus. Nullo etenim remedio meliore & magis innoxio, aut corrigi marrix poterit, aut purgari, quam usus nitri suppositione. Postquam uero his adhibitis, quę sufficere arbitror ad omnia corrigenda, quę impedimento conceptui esse possunt, iam uti conueniet his duobus sequentibus pessarijs aromaticis, conceptionem maturantibus. Fit autem prius hoc modo. Cera alba, adipe gallinarum, terebinthina, & nardino oleo. His omnibus ex equo solutis, cōagulum leporis admiscemus, & hoc post encolpismum supponemus. Aliud uero omnibus experimentatum uisibus, sequens hoc est. Cassiam fistulam, solum, spicam indicam, amomū, in uncijis singulis, omnia cribellata cum staphilino, aut nardino oleo, accepto cōagulo leporis admiscemus: & hoc pessario, ordine adhibito, rite est maturata conceptio. Iam nunc & superiorū pessariorum conuenit subiungere compositionem.

Pessarium Diaquilon contra omnes conclusiones utilissimū & probatum. Lini semen, altheam, scenogracum, omnia æquis ponderibus in uas nouum mittimus, ubi oleum dulce, & aquam aqua mensura adjiciemus, ut semina pertegantur. Quę cum molli uapore coqui & bulire coeperint, undatio, uel spuma quę supernatauerit colligitur. Cui anserinos, uel gallinaccos adipēs, & cætera iungimus, ut

Nota apud
ueteres aliud
fuisse Nitrum, quod
nunc uti
mur. Idcirco ex
hoc loco satis
deprehendit,
tum etiā quod
an dixit de gle
ba nitri. Cum
hodie quod uocatur
nitrum, sola decoctione
terra eliciat,
expurgeturque.
Pessarij Diaquilon
compositio.

Pessario moderamentum faciamus. Sic nos Diaquilon pessarium conficimus, quod sollicitius si fuerit temperatum, unguentum magnum chalciticum, uel paragoricum faciet. Libianum uero sic facimus. Caræ ponticæ ÷ IIII. masticis ÷ I. storacis ÷ I. adipis anserini ÷ III. butyri ÷ III. medullæ ceruinæ ÷ IIIII. nardini olei ÷ IIIII. Hæc omnia secundum consuetudinem tunsa, soluta autem miscebimus, ut pessarii temperies procuretur. Hæc est ordinatio curæ, omnibus mulieribus adhibenda concipere cupientibus, quam breuiter conteximus. Sunt etiam alia quamplurima, ab alijs uarijs coniecturis composita, quæ magis causticis adhibitis, forsitan possint purgationem sanguinis extorquere. Commodius est autem sic impendere officium medicinæ, ut cum susceperim causam curare cœperis, alia non creetur. Sunt alia duo genera pessarium: at ego magis blandis, quam causticis, conceptionis causa procurandæ, purgationem sedare uolo, quam extorquere: quibus etiam magister meus, & purgationem absque offensa se procurasse frequentius testabatur, & conceptionis officia perfecisse. Ea sic conficiebat. Opobalsami ÷ I. peucedani ÷ I. aristolochiæ ÷ I. myrrhæ, & croci semuncias singulas, medullæ ceruinæ, & adipis anserini semuncias singulas: semina seorsum quæ addenda sunt cribellantur, & soluis ex more miscentur, & sic tulus pessarium fiat. Hoc primo pessario exim pro, mox tempore secretorum post balnea supponendum est: quod dum abus horis continendum erit. Aliud pessarium, cuius sequens ista confectio est. Opobalsami uncia. I. opopanaxis ÷ I. thuris masculi ÷ II. cinami ÷ I. I. myrrhæ ÷ I. costi semuncia. I. croci, cassiæ ana semuncia. I. hæc similiter contrita, oleo irino commiscentur, ut paulo pingue fiat: cum uero utendi tempus aduenerit, post purgationem & balnea, & pessarii prioris usum, uteris necessario linimento. Peregisse me arbitror quæ plurimas sub constrictione mulierum ægri tudines, & quibus si quas forte minime comprehendimus, sub uno & simili relaxandi beneficio uisitantæ erunt. Variæ etenim pro causarum temporibus, adiutoriorum species poterunt adhiberi, eadem autem tamen medendi omnibus uirtus.

A

Libiani compositio.

Magistri testis, monum. citat.

B

De A B O R T I V I S.

Caput VI.

ABORTIVVM dare nulli unquam fas est. Ut enim Hippocratis attestatur oratio, tam duri reatus conscientia, medicorum innocens officium non decet maculari. Sed quoniam aut matricis uitio, aut ætatis impotentia, sub qua præpropere frequenter partus euenit, scemina periclitantur, expedit pregnantibus in uitæ discrimine constitutis, sub unius partus sepe iactura, salutem mercari certissimam. Sicut arboribus arefcentium ramorum accommodatur salutaris abscissio: & naues

Comparatio pulchra.

C pressa onere, cum graui tempestate iactantur, solum habent ex damno remedium. Vnde breuiter huic loco adnectenda, continuo designabo.

Pecus ueteres
abortiuū, seu
foetum imma-
turm uoca-
uerunt.

Nōgura hic
uocat aborti-
ua, eo qd re-
center nata
sint.

Confectio Cē
roti hyssopi.

Sternutamē-
ta ad excludē-
dum foetum.

Si ergo necessitatibus, aut etatis immaturitate, aut uitij superius com-
prehenlis, pecus molliter subtrahendum erit, his quammaxime consen-
tio faciendum, ut cataplasmatibus chalasticis artemisiæ succos, aut tusa
puluerem misceamus: dictamni quoque similiter. Sic aristolochiæ, sic
rutæ seminibus: sic & fomentis, & supradictarum specierum decoctio-
nibus factis uti conueniet, quæ scripta sunt in cura conceptionis, ac
sanguinem innoxie prouocantibus. His uero sequentibus aliqui usi
remedijs, duris forsan corporibus minus obfuisse uidentur, qui sangui-
nem extorquentes, simul etiam uenientia pecora pertraxerunt. Suc-
cum rutæ uiridis potui dederunt, ad neophyta excludenda. Hanc ean-
dem rutam uiridem, cum rancidis nucibus, & cum melle tritam dede-
runt, asseuerantes pro pessario apponendum. Interea etiā myrrham, &
artemisiā, & leucosemen, ex æquo cum succo menthæ, potui similiter
post balnea dari debere asseuerauerunt. Item lupinorū amarorū pul-
uerem, myrrhæ, & leucosemen: quæ omnia ex æquo cum menthæ fue-
co temperauerunt, ut trochiscos conficerent: quos cum decoctione arte-
misiæ, aut dictamni dari constituerunt. Alij radicem panacis, myrrhæ,
aloes, ex æquo, similiter succum menthæ uiridis temperauerunt. Alij col-
lyrium suppositorium facientes, sic se hæc innoxie extorxisse testari sunt.

D Myrrhæ, & absynthij, irios llyricę, radices panacis uncias singulas, gum-
mi ÷ II. quas in succo scenogreci infuderunt. Ex quo mixto cum pul-
uere supradictarum specierum, collyria, uel balanos confecerunt, quos
post balnea supponebant. Nam dictamnium cum uino tritum post bal-
nea potui dabant, & continuo pene immaturas animas excludebāt. Sed
& ouium fel, in mellicrato dederunt, æque uiolentum. Sic fel taurinum
cum nitri combusti puluere, hyssopi ceroto miscuerunt. Aliud, Hyssopi
cerotum. Nitrum tostum, ciminum singularum uncia. i. ficus pin-
gues albas bene tritas ÷ II. cum lacte muliebri pessarium supponendum
temperauerunt. Sed & nostro pefso utebantur, ex solis pinguibz ficu-
bus tuis, balanos, uel collyria supponentes, quibus nos etiam speciem
nitri admiscuimus: sed innoxie etiam purgatio procuratur hoc modo.

Aliud exclusorium uiolentum. Myrrham tritam, & elleborum felle
taurino miscentes, & temperantes pro pessario supponebant. Aliud.
Myrrhæ uncia. i. ficus pinguis trite lib. i. galbani ÷ i. aphronitri ÷ i. ii.
omnia trita, tusa ficui commiscebant: & cum usus forte fuerat necessa-
rius, cum melle pessarium ab iisdem temperabant. His etiam ptarmica
adhibuerunt ex elleboro, struthio, castoreo: ut membrīs omnibus ex-
agitatis, pecus facile extorquere ualuissent. Coacti etiam aliorum scri-
pta elegimus, inelyta quidem sub illis necessitatibus, si saltem uel non im-
portunis mensibus ingerantur. Sed quoniam his inconsiderate fre-

quenter ita rebus gestis, ui & uapore adhibito specierum, hemorrhoidae **A**
 uenerunt, per quas, & uulnerationis pene incurabiles fluxus, lasas fe-
 mina occupauerunt, ad hæc nos quibus ualemus tandem
 adiutorijs salubribus obuiamus.

¶ De HAEMORRHOIA ma-
 tricis. Caput VII.

HAE MORRHOIAE matrix (licet etiam ex alijs fieri so-
 leant) attamen, quoniam omnes una lege medendi curandae sunt, sub-
 iectis earum causis, adiunctisque omnibus, ut arbitror, sub constricti-
 one passionibus, eisque pertractatis, ad resoluta, & sub effusione labo-
 rantia descendimus. Quae, quamuis sepe chronicarum more causarum
 difficile liberentur, uaporibus constringendae sunt, ex decoctionibus spe-
 cierum omnium stipticarum, quas etiam nunc subiectas admoveo. Myr-
 ti uiridis flore, malogranati cortice, & arboris pini, siliquarum folijs, uel
 baccis lentisci, similiter rosa sicca, & galla, rore syriaco, & ceteris simili-
 bus. Item encolpismis imminere conuenit ex croco, hippoquistide, aca-
 cia, omphacino, lapide hemathite, lemnia sphragide: omnibus tulsis, &
 mixtis decoctionibus supradictarum specierum, aut succis polygoni,
 uel arnoglossae temperatis. Post uero, spongia infusa in pulca, & sup- **B**
 posita, muniendae erunt. Inguinibus uero, lanas infusas succis supradic-
 tis imponi suadeo. Expedi interea omnibus superioribus locis us-
 que in mammillas, cucurbitas stalticas ignitas imponere: sic etiam inter
 scapulas diu perseveraturas, sed molliter detrahendas. Epithimata uero
 staltica, quae dysentericis ordinauimus, imponenda sunt, quammaxime
 ex dactylis thebaicis, in uino uel aceto decoctis, ex carota-
 rio commixtis, speciebus quoque, quas nostri
 competenter posse constringere,

¶ De Vulneribus M A T R I-
 CIS. Caput VIII.

SI VVNERATA ex his Matrix fuerit, quibus uulneri-
 bus interius putredo frequenter sociatur: aduersus ex egestionibus, qua
 tenuis debeas causae succurrere, adhibendo aut trochiscos ex auripigmen-
 to, calce uiua, sandaraca, puluere chartae combustae, & ceteris similibus:
 quos ita conficito & temperato, ex succis omni-
 um specierum supradictarum.

¶ De Fluxu R E V M A T I S, quem poen appellamus. Caput IX.

SI EX HIS fluxus perseverans sanguinis, uel humoris, calo-
 rem uariantis, molestiam fecerit, quem nos poen appellamus, his omni-
 bus superioribus imminendo constringendus erit, uel desiccandus.

C Si quis uero etiam potionibus curare uelit, habet has potiones, a nobis similiter ordinatas, in his autem qui sanguinem uomuerunt, aut dysenteriae uitio laborarunt, si humanius res profecerint: ut uelut in chronicis mos erat, aliquando commoueantur, aliquando sub blanda dimissione releuentur: quo tempore cicli nobis iam omnis ordo intendendus erit, & arripiendus. Vomitus prius frequentior adhibendus, quam maxime per radicum acceptionem. Exercitijs paulatim crescentibus imminendum est. Aeris mutationes appetendae. Locis ijsdem psilotra, paropteres, dropaces, & synapismos appono: quibus omnibus perseverando, uim magnam reumatis, magnis ualeamus adiutorijs superare.

Sane si sanguineus & cum dolore fluxus fuerit, etiam phlebotomo eas expediri releuari, omnibus supradictis stipticis imminendo.

E De GONORRHA, id est, spermatis effusione. Caput x.

D EFFUSIONE aliquando etiam spermatis spontanea, & impropria foeminae fatigantur, quod in grecis nostris *γυναικία* appellamus. Haec quae in uiris, hoc uitio laborantibus, superius ordinata sunt, etiam foeminis conuenit adhibere. Ordinatam gynciarum dispositionem, sufficere arbitror principaliū passionum constrictionis, et relaxationis causis, ex paruis omnibus adiutorijs, competenter adiunctis. Caetera uero quae artis officio parturientibus aut disponenda sunt, aut facienda, usu magis quam lectione debes aduertere: ut intelligas quae pertineant ad salutem mulierum.

¶ Tertij LIB. Finis.

¶ OCTAVII HORATIANI LIB. III.
ad Eusebium filium, De PHYSICA
SCIENTIA.



SCRIBENTI MIHI de Physica scientia, qua te maxime delectari intelligo, sufficere arbitror Menandri comici insigne argumentum. Apud ciues suos cum studiorum annis, magnae scientiae laboraret inuidia, produxisse in theatrum fertur suum, partu plenam (hoc enim in loco celeberrimum Atheniensis eloquentiae auditorium erat) produxisse inquam, expectantibus auditoribus, plenam suam, ibique eius exectum uterum in euripto fuisse proiectum. Cumque interfecti pene, ductu tamen naturae agerentur, Athenienses, inquit, uiri, si in paruis annis scientiam meam miramini, istos natare quis docuit? Hinc aduertere datur, Eusebi dulcissime filiorum meorum, gratum mihi testimonium. Valde enim in te amo laboris mei opera precium, & quod tu mihi nunc scribenti contigeris auditor. Di

Menandri historia.

xi, datur aduertere, quantum naturæ uis pateat in omnibus elementis, eorumque semine, atque animantibus, cuius uirtutes non frustra inter se dissentiunt, aut secum copulantur. Alcyonio herba pastæ oues periclitantur: mox radice eius assumpta liberantur. Mulorum sanguis potus, uenenum est: carnes eorum cibo datæ, sunt remedio. Medentur uentris tormento canes, pastæ gramine. Et horrida sus nebulam discussit, campo pabulara: & iacta per dictamnum excluduntur tela. Et cerui longæui uita, adæsis mutatur cornibus. Et communes Chelidoniæ, communibus herbis, pullorum suorum declarant oculos. Ad postremum, natura omniparens, ueluti adiuncta charitate, cuncta animantia prosequuta est. Quæ enim nascendi sortem tribuit, uiuendi ac ualendi substantiam non negauit. Est enim in omni mundo natura, quæ operetur grande secretum. Sed illud mirari non desino, cur irrationabilia, & uagæ aues, & agrestes feræ, ad beneficia naturæ propius accedant. Supra contexti dabitis mihi ueniam operis, Patres, Priores. Disputationum enim uestrarum rationes, morbidorum animalium genus, & his similis ætas mundi rudis ignorauit. Pythagoras Aegyptiæ scientiæ grauis autor, scribit singula nostri corporis membra, coelestes sibi potestates uendicasse. Vnde fit, ut aut contrarijs quibus uiuuntur, aut proprijs, quibus placantur, conemur. Hinc est, quod & Romani, Febri ædem statuerunt, & quod Quartanas Saturni filias affirmauit antiquitas. In quarum curatione, Democritus inquit, pollutione opus esse: ut sunt cædes, & culpe, & menstrua mulieris, & facrarum auium, uel uetitorum animalium carnes cibo datæ, & sanguinis potus. Nam & epilepsin, quam hieran noson appellauere, sic curare præcipit: efficaciam potentiam præferens, & uitans inquiri rationem. Sed hæc non nos primi prodimus: fateri non pœnitet: communia sunt, quæ cum ueteribus sentio. Atqui mea quæ scripsero, in hijs duntaxat & nos magis posteris placebimus. Nec mirum, si nulla circa uiuos fama est. Sua tempora lector non amat. Hinc est illud clarissimum Sætyri distychon,

Parua coronato plaufere theatra Menandro,

Riseruntque suum secula Meoniden.

Nam & Magister meus, quo me usum esse præceptore præmiseram, dum uiueret, bellus habebatur, qui nunc orbe toto Vindicianus celebratur. Et profecto nullius unquam uirtus, digne suo seculo honorata est: uel quod inuidiæ, fortunæque locus inter uiuos maneat, uel quod a miseriæ orto desyderio celebretur post fata probatio.

Herba polygono coronatus, quam quis Luna decrescente fustulerit, dolore capitis caret. Similiter etiam herba illa, quæ forte inuenta fuerit in capite ænearum statuarum.

Nam & reliquias bouis potantis si quis biberit, molestia capitis releuabitur. Spu-

A

Naturæ
secreta.

De Chelidonia herba nota est fabula. Vocatur autem & aues, & herbæ ipsam communes, quod ubique fere reperiant.

Sermonem uertit ad priores, uidelicet philosophos, atque phylicos.

B

De æde quidam Febri statuta, uide Plinium libro. 2. cap. 5. Quod autem quartanas Saturni filias uocatas ait, ob eorum morbi tarditatem maliciamque dicit. Nam Saturnus iter planetas reliquas natura pingeratque maliciosus ab astrologis esse perhibetur.

Vindicianus hic fuit architectus Valentiniani Imperatoris.

Ad Capitis dolores.

- C** ma uero eius fronti illita, lege secretiore naturæ, graues inquietudines capitis sedat. Et cornicis cerebrum, quolibet genere acceptum, paria facit. Similiter etiam muris cerebro comesto, natura omniparens, magnum remedium caput dolentibus præstitit. Ferulæ quoque combustæ cinis, oleo mixtus, fronti uel capiti illitus, inquietudines capitis sæpe sedabat. Tantum etiam de uulturis cerebro, mixto oleo perunctum caput, frequentius liberatum est. O quantum naturæ uenerationis debetur. Nam magnes lapis admotus capiti, ex altitudine latentes morbos eripuit: & nidis hyrundinum mox expositus, atque cum aceto contritus, frontique illitus, par beneficium procurauit. Hæc Physica remedia sufficere arbitror caput dolentibus, & hinc etiam de epilepticis quædam ordinauimus. Remediorum recte adhibitorum efficacia, semper causarum bonos exitus confirmauit. Latentes epilepticos, Gagathis lapidis admotum fumigium, semper repentinis casibus publicauit. Hoc de araneis parietum, hoc de stercore canum fumigium similiter facere constat. Nam & opertos caprarum pellibus, si in aquam ingredi facias littoris, infusis plantis, & tectis, epilepsiæ passio commouebitur. Similiter etiam si nares eorum opobalsamo tangas, sollicitius epilepticos publicabis. Et acaciæ pulueres si cum aqua calida acciperint, & si continuo correpti fuerint, insanabiles erunt. Sin uero febrierint, facilius liberantur. Hoc de prodendis, uel cognoscendis epilepticis scripsimus remediorum, nunc opus est ordinatione.

Contra Epilepsiam.

D Peoniæ radix magnū præsidium præstat, si continue potata, frequentius odoretur. Sic Alicacabi, sic nycteridis radices medentur. Ex corio frontis asini, facta ueluti fasciola, eorum articuli constringendi sunt, & dextri eius pedis ungulæ portatus circulus, pari conditione medebitur. Interea caprinas tunc tantummodo carnes comedentibus, camelorum medulla, oleo roseo resoluta, tempora capitis, stomachus, & totum pectus matutinis horis perungendum est. Ex sanguine mustelarum unguentum commode adhibitum, par præstitit beneficium. In ipsis uero commotionibus, si sanguinem de eius pedum digitis elicias, quoquo pacto, & eius frontem ex eo tangas, & labia, continuo exurgit. Tunc etiam asini lotio aspergi conueniet. Addo interea, quod ille ait, si mihi fas audita loqui, quod necessitas procurandæ sanitatis extorquet, eodem lotio asini potari eos debere, & hyrundinum sanguinem, cum thuris masculi puluere, sub aqua ponderatione, cum oxymelle similiter sumere. Sic alij ueteriores sub certo secreto naturæ, excepto capite ac pedibus, cæteras mustelæ reliquias, atq; partes corporis obtulerunt, ex cuius cibi beneficio, molestiam passionis frequentissime declinauerunt. Aliud. Vina multum acria horis matutinis data, diebus triginta continuis profuerunt.

Pari forma, etiam ex testa cerebri asini combusta cinis datus profuit.

Sic althææ succus, sic cōagulum leporis, in modum grani erui per dies xxx. ministratum, horis matutinis, epilepticos liberauit. Nam & mulieribus menstruantibus, hoc uitio laborantibus, cōire conueniet. Hæc epilepticorum præcepta, et probata remedij cura disposita, deinde reliqua, ut potero, uaga, & disseminata remedia collecta designabo. Hybiscū, & caricas discoctas, & tritas diligenter, ubi admiscueris, admiscēs pāsī calicellum plenum, modicum axungię porcinae, quasi unciam, & polū linem de hordeo, ita ut hybisci, triti, uncias. II. caricarum unci. II. non febricitanti admisceas, cum quantum merum est. Febricitanti autem, aequam de hybisco, & caricis ubi bulierit, hoc cataplasma impones, & usque in alterum diem mane habeat. Et item alia similiter facias, per dies quinq;. Postea diameliton solues cum cæroto, & pones: deinde iunges in ipsa diameliton, etiam aliquantum despermaton: & cum melius habere cœperint, das potionem athanasiam in aqua calida, & cochlear unum mellis, & cochlear unum aceti. Hoc per triduum facis, & si usus exegerit iterum repetis cataplasma. Ad Vesicæ autem dolorem, coquis aquam de scenogræco cum hybisco, & fomentabis super pectus, de aqua calida, ita ut ante oleo calido omnia loca quæ patiuntur perungas. Quæ cum facis, sedebis super peluim maiorem, & leuiter fomentabis: ne loca contendantur. Postea detergis diligenter, & facis cataplasma de scenogræco, & lini semine, & polline hordeaceo, in aqua & oleo, ac modico melle cocta, cataplasma inducis, et ponis. Omnia loca cum ipsis quoque testibus percooperis. Hoc tamdiu facis, donec dolor recedat. Deinde decoquis adarcem, origanum, & petroselinum, & sic dabis potionem cum modico melle. Medicamen autem diameliton solues cum cæroto mollissimo, & cum adipibus pollinis, uel porcellinis, & medicamen basilicon, ita ut ante clysterizes cum qui patitur, exinaniendo sterus totum, & sic curabis eum. Confectio medicamenti ad matricem curandam, uel menstrua prouocanda. Primo diffumigatur mulier sedens, de storce, ante quinq; dies quam menstrua ei solent uenire, et encolpizatur pigmentis, quæ inferius scripta sunt. Diaquilon unc. I. basilicon semuncia una, cæræ puniæ ÷ I. adipis anserini ÷ I. oleo libyacio quantum necessarium fuerit. Species autem solues cum oleo liliacio, ita ut medietas cum aqua supra focum buliat, & alteram medietatem cum super predictis medicamentis & olei uapore facias calefcere, ut sic soluantur. Et cum cœperis uelle encolpizare, antea uentrem eius cura de succis ptisanæ, fortiter discoctæ, immixto clysteri oleo anethino. Et post istam iniectionem, si purgatio Menstruorum plena non fuerit subsequuta, dabis ei puluerem picræ cum uino, & melle, & calide permixtum. Sed ante quartum diem consuetę purgationis, ita cura, ut antequam encolpizes, primo de succo ptisanæ decoctæ cum anethino oleo, uentrem cures, & sic encolpizes: & hoc usque in diem purgationis, si necesse fue-

Ad Vesicæ
dolorem.

Ad Matricē,
& Menstruo-
rum prouoca-
tionem.

Crit, bis in die facies, & nunquam anhelitum uel dolorem stomachi patietur. Hygna dicitur solutum collyrium. Et dicitur Panchrifton. Facit autem ad multas passiones, & est approbatum. Ad synanchem, penna illita faucibus, eam soluit. Vlcerebus uero aurium prodest cum melle at tico, & uino, æquali pondere solutū, calefactumq; , ad aures immissum, & non effusum. Vlcera locorum omniū emendat, præcipue tamen oculorum foris illitum: duricijs etiam palpebrarum sic confectum quoquo modo se habeant, si penna molliter inungatur, uel tangatur. Asperitates uero deintus ueteres palpebrarum sanat: albedines, suffusionis membra norum, de oculis expurgat omneis. Morsus omnium serpentum curat: siue intrinsecus potu datum in uino, & oleo bono. pari mensura quantum sufficit calefactum: seu de foris penna illitū, bene sanat. Cuius compositio talis est. Aeraminis combusti unc. ii. mysi assati semunciam, myrrhæ trogloditis unc. i. croci semuncia, passi cretici heminā, piperis communis semunciam, uini aminei candidi quod sufficit. Vniuersa cum dimidio uini in mortario teris, per dies numero, xxij. Proinde reliquum uinum permiscens cum passo cretico coque. Agitatū transcolas in trullionem, sed immittis simul supramemorata de mortario, in ipsum trullionem: tunc uero leuioribus carbonibus impositum trullionem, omni

Dhora agitas, ne illa quæ grauiora esse uidentur, in fundo remaneant, & comburantur: ergo mouenda sunt sine intermissione. Et quum feruendo, in modum mellis deuenerit, infrigidatū uase uitreo seruare debes.

Ad Conceptionem.

Ad Conceptionem. Leporis uulnam assatam teris, & dabis in uinero, in balneo sabanis infidenti bibere, ieiune. Si ipsa die uel nocte acta fuerit a uiro, concipiet. Ad conceptionem experimentū. Nardum asianum, uuam uero passam creticam purgabis, ut tollas grana quæ habet, & myrrhæ trogloditis modicum, teris diligenter more collyrii. Sic enim probabis. Ad rostrum applicas, & labia inde fricas, si dulce est: sic mulier utatur. Si uero amarum, adauges uuam passam, et cum lana pelsarium factū suppones per dies. xxx. Etiam si *stupa* est, concipit. Et pariter præparamus uiro. Rutam agrestem tere, & inde ueretrum line, statim exalescit. Postea si non pausauerit ueretri tensura, idem ueretrum oleo unges. Inguina si a caballo indoluerint, oleo rosaceo tanguntur in balneo, & extra balneum. Si autem cum rubore nimio, aut uisura fuerint, cum cerussa permixta liniantur. Ad Perniones. Alumen scissum in aceto acri infundis, & post diem agitabis, & pedem perunges.

Ad Perniones.

Ad Lumbricos.

Ad Lumbricos. In ollam fictilem mittis mentham usque ad medias, & desuper myricas, usque ad summum, & implebis ipsam ollam aqua, & decoques omnia. Bibere dabis habenti lumbricos ieiuno, omnes per inferiora egerit. Ad Menstrua mulieri prouocanda. Ruta succi cyathum unum calefactum ieiuna bibat. Fortius autē prouocat, si ieiuna lauetur, & sic biberit, antequam balneum intret. Sanguis si huic cur

Ad Menstrua prouocanda.

rere cœperit, furculus ipsius rutæ, de cuius folijs succus expressus est, in
 ignem mittatur, & sanguis se stringit. Potio ad Luem. Cucumeris syl-
 uatici radicem quantum habueris, mittis in mortarium, & teris cum fo-
 lijs tenerioribus semperuiuæ, apij, & coriandri. Cum bene triueris, ad-
 dices mel, & grana piperis imparia, quot uolueris, & uniuersa tempera-
 bis, & statim seruabis, & ieiunus uteris. Et si quis apprehensus fuerit,
 hanc potionem cum acceperit, statim foris exit omnis lues ab illo, & sa-
 nus erit. Sed & qui epulatione usus fuerit, aut qui seruierit ei qui lue te-
 netur, nunquam noceri poterit. Chalasticum quod ostendit Titia-
 nus uir clarissimus, imponendum in aluta pedibus dolentibus, & ligan-
 dum fasciola, & desuper udones induendos. Cæræ punicæ unc. i. resi-
 næ frixæ, p^o. i. resinæ terebinthinæ ÷ i. axungia porcinæ sine sale, de
 porcella uirgine, uel etiam de pluribus p^o. i. hæc omnia in cacabo sol-
 uis: mittis postea cæram, & desuper nitri alexandrini bene triti ÷ i. &
 agitando bene commiscens, seruabis in fictili. Ad Hemitrytim, un-
 de fiunt chardiaci, & phrenetici. Mala cytonia sicca trita lauato, & mit-
 tes in ollam nouam cum aqua fontana, & decoques, & ipsam aquam bi-
 bere dabis. Antidotum Diarobum facit ad pectoris dolorem, & sto-
 machi, & iocinoris, splenis, uesicæ, ad hemoptoicos qui sanguinem uo-
 munt, uel expuunt, ad indigestionem, inflationem stomachi, tussim
 siccam: & ad tussim suspiriosam, id est, qui fortiter suspirant: nausæ
 prodest, & saluus abundantibus. In his necessitatum uniuersis dolori-
 bus, cochleare plenum ieiunus manducet: per triduum senties benefi-
 cium. Cuius compositio talis est. Mastiches, petroselinî macedonici, o-
 xypiperis, quod in usu est, uncia singulæ. Item hyssopi cretici, irios Il-
 lyricæ, rutæ uiridis uncia binæ, nuclei pinei unci. iiii. Quæ sicca sunt
 rundi & cerni debent: rutam autem cum nucleis pineis, & mastichem,
 in mortario fictili aspero detere. Hæc, quum bene fuerint malaxata,
 postea quæ sicca sunt iungantur, & terantur simul. Desuper autem mit-
 ti oportet mellis summi, quantû sufficit: uniuersa confecta in uas uitre-
 um missa, signataque seruari debent. Decomai antidotos Terentij
 Eutichiani diateffaron. Facit ad digestionem, & ad urinam prouocan-
 dam, & colum. Cuius cōfectio talis est. Petroselinî macedonici, piperis,
 innulæ, feniculi semina æquis ponderibus tusa, & cribellata, melle bo-
 no sufficienti despumato terendo iunguntur, & dolio uitreo signata ser-
 uantur: cum necesse fuerit, dabitur ita. Ad digestionem cochleare ple-
 num comedendum. Si autem mane stomachum indigestum habet, si-
 militer cochleare plenum comedat. Ad urinam uero prouocandam, in
 balneo, uel in sole stanti, cochleare plenû soluis, in duobus cyathis aque
 calidæ, & bibendû dabis. Colicis quoq; in aqua calida, ubi apiû fuerit
 decoctû, solum, plenû cochleare bibere dabis: tridû tribus post cy-
 this aquæ salis. Antidotos faciens ad omnes dolores interaneorum,

A

Potio contra
luem.Titianus me-
dicus.Ad Hemi-
trytin.

B

Antidoton
Diarobi com-
positio.Antidotum
Terentij.

C Hyssopi cretici ÷ II. calaminthes creticae, pulegij sine fumo, petroselinij macedonici, siseleos uncias ternas, apij seminis unciam .i. libistici semunciam, thymi Hispani florum ÷ .i. piperis semunciam, gingiber semunciam, tusa & cernita cōmifces cum melle bono despumato, & confectum, uitreο signatū seruabis. Ex hoc ieiuno dabis cochleare plenū. Diamor-
 ron *ἁπλῶν* .i. simplex. Mora syluatica, triduo in cacabo mundo habentur. Postea exprimūtur ex his sextarij sex: quibus iunguntur mellis sextarij tres cōmixti: simul colantur, & in cacabo stannato coquūtur ad tertias. Seruatur in dolio uitreο. Datur ex hoc ad uulnera faucium, dentium dolori. In acerrimis febribus constitutis, tēperatur ex aqua calida, uel ex frigida. Sed in aures hulceratas ad cochleare fundes, et obturabitur lana.

Diamoron
simplex.

Diamoron
Sebasti.

Diamoron Sebastij, id est, succus de moris syluaticis, quę collecta in cacabo triduo sint, quarta die exprimēdi: ex his sextarij sex, croci unc. II. alumnis scissi ÷ II. corticis malogranati ÷ II. succus de moris, & mel, & succus labruscę bene cōmifcentur, et colant, & desuper imponunt trita, & cribellata, et iungunt. Crocus ante triduū infundit in succo labruscę, ut facile teri possit. Decocta simul usq; ad tertias, uitreο seruāda sunt. Facit ad faucium uulnera, & totius oris: sed & ad carnes quę supra dentes nascuntur. Acopum dyacissum. Baccas lauri numero. c. pilas cypressi numero. xx. herbę sauinę foliorū libram. I. resing pituinę lib. I. germinis

Acopum
Dyacissum.

D hederæ unc. IIII. olei sabinensis lib. IIII. focnogręci sextariū. I. cęra rubræ lib. I. præter hæc gummi, resinam, & cæram, in cacabo infundis in aquę fontanę sextarijs, II. & olei libris, IIII. per triduū: quarta die decoques, quę infusa sunt, leui foco, quamdiu aqua absumatur. Gummi uero teres cum oleo modico iam cocto, usque ad leuitatem: Resinam autem, & cætera cum reliquo oleo resoluta leui foco, colabis, & tepescam supra gummi immixtum, agitabis de ferula. Quod medicamen, dolio uitreο seruabis. Facit autem ad totius corporis frigidorem: & ad Ischiām, & podagram utilissime prodest. Ad sanguinem uomentes.

Ad uomitum
sanguinis.

Semen falicis unc. I. tritum cum uino austero, permixtum ieiunus accipiat. Sanguinem restringit, et uitium emendat. Confectio Saccomellis. Vuę acerbę succum sextarios, II. quem succum cacabo stanneo per triduum seruabis, supra missis grauis salis marini tribus, ita ut omnes fæces in fundo resideant. Exinde mittis succi limpidi sextarios, II. mellis despumati sextarios, III. Coques leui foco usque ad tertias. Quod de ferula agitabis, frigidum factum, uitreο seruabis. Facit ad nauſeam restringendam, & uentris fluxum, et initia eorum qui sanguinē uomunt. Sed & dysenterię incipienti, cum aquę purę mensura dabis: febrientibus tepidum, cæteris frigidum. Ad sanguinem de ano fluentem. Malogranati corticem tusum, & bene cribellatum, in aquę calidę cyathis II. totidemque uini, & cochlearia singula pulueris per triduum dabis bere, & restringit. Ad dysentericos. Ouum gallinacium cum aceto

Confectio
Saccomellis.

Ad Hemor-
rhoicos.

Ad Dysen-
tericos.

friges, & das manduacre ei qui patitur per dies septem. Ad dysenteriam. Fragmenta de mola ignifera facies: & cum bene incaluerint, lapides ipsos in lacte caprino extingues: & illud lac bibere dabis. Ad eos qui cum tormento urinam faciunt. Sisymbrium ex aqua coque, & tere limpide, & da. Bibat cum careno ieiunus, ex aqua supra memorata.

Ad Lumbricos. Herbam centauream decoques ex aqua, in olla noua, & dabis per triduum: bibat cyathos ternos, uel quinos. Ad omnia etiam interanea facit. Ad capillos in capite rasos, ut spissi renascantur, qui ex infirmitate graui ceciderunt. Caput nouacula eradendum, & liniendum ex hac unctione, cuius compositio talis est. Thus Dacicum, gallas, inulam, myrti nigri seminis uncias singulas, omnia tundis, cribellas. Post ladanum in uino uetere infusum, unc. ii. per triduum desuper in mortarium missum adijcis, & simul conteris usque ad limpiditatem. Cumq; spissare coeperit, tantum nardi boni campani desuper mitis, ut in modum cæroti strictioris deueniat. Perfectum plumbeo reponitur uasculo. Vteris post rasuram quousq; capilli densentur. Ad denigrandos capillos. Gallas acerbis numero. x. spicam celticam, muscum gallicum, myrti nigri semuncias singulas: oia coruina tria, gallas, spicam, semen myrti, tundis, cribellas, et postea in mortario medicinali teris, cum uini ueteris quartario uno, per triduum: quarta die desuper adijcies oia, & in uino commiscebis. Confecta plumbo seruabis. Quando uti opus est, oleo lentiscino, & uino ueteri resoluta infectione uteris, ita ut solutior sit, & possit omnibus adhærere capillis. Sane sub hora infectionis, oleum intra os habendum est, ne dentes nigrentur. Medicamentum Phisophiani, quod dicitur Cysofarmacum, unice faciens ad passiones has. Ad ulcera chironia, ad ulcera recentia, ad luxatum, ad præcisuram, ad scabiem in capite, ad parotidas, seu glandulas, ad ulcera naturæ, ad contusionem & tumorem, ad deiecta, et fracturam, ad carbunculum, et furunculum. Etiam si in mammillis mulierum ulcera, uel duricies natæ fuerint. Ad faucium tumores aforis, ad scabiem, ad ragadium, ad exochadium. Cuius medicaminis compositio talis est.

Ceræ rubæ, & ceræ punicæ, libras singulas, opopanacis uncias. ii. Oleum autem secundarium, pinguiissimum tantum mittere debes, ut pigmenta tegantur: resoluta in cacabo mundo colabis, et ad supra memorata uteris. Diaherpillum acopum. Serpillum, scenograicum, iunci radices, rorismarini libras singulas. Hæc omnia in uini ueteris sextarijs quinque infusa sint diebus quinque, die sexto olei sabini mittis sextarios quinque, leui foco impositum, eo usque coquitur, ut uinum absuratur. Postea mittis ceræ punicæ, uncias. x. Facit autem podagricis, artritidis, spine dolori, Ischiaticis omnibus mirifice prodest. Et Diacitrium acopum, cuius confectio talis est. In cacabo aquæ feruentis deponitur alia ollicula ærea, ita ne aqua illic intret olliculæ: cui hæc mif-

A

Ad difficulter urinantes.

Ad Lumbricos.

Vt Capilli crescant.

Ad Capillos nigros.

B

Compositio Phisophiani medicamēti.

Acopum Diaherpillum.

Diacitrium.

- C**enda sunt. Citreum uiride acerbum, peucedani uiridis p^o. i. olei fabis
ni sextarij. II. sub ipsa die simul coquuntur ad feruorem aquæ bulliens
tis: ollicula habeatur, ubi citreum est cum cæteris. Postquam hæc deco-
cta fuerint, oleum colatur in cacabo, & desuper mittitur cæræ punicæ li-
bra. i. agitur quousq; soluatur cæra. Confectum in uas uitreum repo-
natur. Facit ad ea ad quæ & Diaherpillon, id est, podagricis, artritici-
cis, spinæ dolori, & ischiaticis. In aure uulnus si fuerit, excauas malū
granatū, et mittis illic myrrham, pediasimos, mel, & acetum, & ad dimi-
dium coquis, & eo mittis tepidū, per foliū lauri, oteniten, sanat. Alij pro
myrrha aphronitrū mittunt. Ad Hydropem. Vituli masculi stercore
cum aceto acri permixto, spisse uenter liniendus est, ita tamē, ut ante ipse
hydropicus toto corpore dropacetur. Ad Hydropem. Squilla, id est,
bulbus sub prunis furno assatur. Deinde circumpurgatur, & medietas
eiusdem bulbi in aqua coquitur: posteaquā coquendo colorem mutaue-
rit, tollitur. Ex quo bulbo scrupulus unus, & dimidiū teritur cum oxy-
melle, tribus cyathis calefactū, bibendum datur. Oēm calamitatem per
urinam euacuat. Ad Hydropem. Lomentū fabacium bene cernitum,
& cineres de fornacibus optime cernitos, æquis ponderibus adunatos,
in aqua calidissima conspergis, & facis crotum in modum cataplasma-
tis: inducis pannis duobus, ita ut unū habeat in ante, et alterū retro: oēm
calamitatem humoris, aut per anum digerit, aut per urinam. Ad Hy-
dropem, quod monstrauit Leoparda. De lupo, si uiro, de masculo: si
mulieri, de lupa, remedium faciendo, cor seca totum, & pulmones. O-
mnia simul cōburis, ita ut carbones fiant: quæ teri, cerni, id est, cribellari,
& in puluerem redigi debent, & uitreo seruari signata. Cum necesse fue-
rit, uinum bonū, sed non uetus mittis in ollam fictilem nouam, & de pu-
legio quod fumo tactum non est, facies fasciculum, & ex eo facis agitari
ipsum uinum. Posteaquam perbullierunt, facies potionem, & tepefacta
potione cochleare plenū pulueris das bibere ei qui patitur, per triduū.
- Ad Hydropem. Quod monstrauit uxor Nomenclatoris. In ollam fi-
ctilem nouā mittis unam radicē de costo, et de folio malobathro tres sur-
culos crassos, & fasciculum qui de publico emi debet feniculi: bulliant
hæc omnia in olla cooperta. Ex eo mane unā potionē bibat, & sero qua
hora se collocat unā. Ad Hydropem, potio experientata Cornelio.
Scyllæ purgatæ, id est, bulbi crudi minutatim concisi p^o. i. uini aminei
uetustissimi sextarios. III. in fictili per triduum infundis, & uas die quar-
to foco leui imponis, & coquis quousq; uinū ad tertias ueniat. Sublato
uase de foco, partes scyllæ proijcis expressas, succū uero uitreo seruabis.
Ex hoc quando opus fuerit quartariū hydropico ieiuno calefactum da-
bis. Locis autē externis tumentibus, aut inflatis, aut humore plenis, ster-
cus bubulum cum parte aceti resolutum, spisse imponis tamdiu, quous-
q; ad limpidadam sanitatem patientia loca perducas. Sane de succo pri-

Oteniten uo-
care uidetur
morbū auris,
ἀπὸ τοῦ ὠτὸς,
id est, auribus
efflato uoca-
bulo.
Ad Hydro-
pem.

ore ter singulos quartarios dabis, id est, triduo, intermissis singulis diebus. Ad Hydropem, quam frequenter experimentauit Eugamius. Confectio. Columbi agrestis, uiui, integri, cum penis suis exusti, in olla fictili in cineres cōuerli: et ex hijs quantū tribus digitis leuare poteris, & herbe fabinae, tusce, cribellatee tantundē, & myrrhe trogloditicee quantum tibi uidebitur, in uini meri aphri calefacti cyathis duobus, ieiunō digesto bibendum dabis. Primo tamen die sentiet beneficiū potionis, ita ut per urinam satis mittat. Alij incipiunt subito, & per nares mittere humorem. Ad dolorem uentris, & ad tortionem experimentatū a Cornelio. Calaminthe, nam sic est herbe nomen, pulegij sicci sine fumo, Petroselinij, libistici, uncia singulae: sileleos, apij semen, gingiber, iuniperi, thymi Hispani, piperis, quod in usu est, uncie binæ, mellis optimi despumati quantū tibi uideatur, omnia hæc tunduntur, cribellantur, & in melle despumato coniungunt. Reponuntur in uitro. Quando uero opus est, in aquæ calidæ cyathis tribus, ubi apium fuerit decoctum, dandum antidorū modo nucis auellanae. Το δισκοριον, si sub hirco scabies exierit, aut duricias facit, & ad loca dolentia uniuersa, præcipue tamen ad humores, & duricias, et apostemata prodest: æque carbunculis, clauulis, et furunculis. Cuius compositio talis est, Spumæ argenti, olei cōmunis, libras singulas, galbani ÷ IIII, ceræ rubæ, resine terebinthine libras singulas, hybisci radices fasciculos, IIII. Spumā argenti cū oleo in mortariū mittis, et teris usq; ad summā limpiditatem. Resinā, cæram, cū galbano, foco leui imposita soluis in cacabo: deinde colas, & iungis cū spuma argenti, et oleo detritis. Hybisci aut radices detergis, & postea lotas in pila tundis, & in mortario fictili, pistillo ligneo teris, quousq; bene sit detritum. Paulatim iungit cum supra memoratis, & terendo adiuuant: confecta in fictili seruatur. Muscæ trochisci uirtus prodest his passionibus. Capitis dolori, & oculis sepe reumatizantibus, si ex aceto resoluto, tota frons liniaetur. Auribus humore plenis, aut uulnera habentibus ex uino austero, & melle resolutū, auribus infundit. Gingiuis putridis, aut sanguine plenis, uel dentibus luxatis, in puluerem detritus, aut digito, aut melle intra os mittitur. Nariū ulcera inueterata diuturno humore, ex uino austero resolutū, et intermissum sanat. Vlceribus omnibus forensibus, cum lintheolis linitum, & impositū prodest. Fluxui uentris ex sanguine assellantibus, seu rasuram cum putredine facientibus, ex uino austero cocto in myrto, quantum estimaueris, uel certe quasi merum, per pessarium in his, mirifice prodest. Ad ulcera chironia lintheola infusa imponuntur: & ad carcinomata, & ad omnia uulnera uetera. Ad naturam dolentem in aqua tritus spissus liniatur, & lintheolum infusum ponitur. Paronychijs ex aqua tritum sæpe inunges. Cuius trochisci compositio talis est. Aluminis scissi ÷ IIII, aloes indicæ ÷ IIII, myrrhæ ÷ II, croci ÷ II, croci comagmatos ÷ III, calchanti, II, malogranati caliculos qui primi nascū-

A

Ad uentris
dolorem.

B

Compositio
Dialtheæ.

Trochiscorū
Musæ uirtu-
tes.

Trochisci
Musæ.

C tur, anteq̃ poma fiant ÷ IIII. aris floris ÷ II. Cortices tūdis & teris: cro cum aut uino amineo, aut phalerno infundis. Quod alio die tollis de ui no, et in mortario teris. Cum tritū fuerit, adijcis & ceteras spēs desuper, & ad mensurā cochlearis cōteris, cū melle sufficiente, et uino bene subar ctū. Ex eo trochiscos facis siccatos, et in aluta molli seruabis, et loco siccō reponis in uitro: ad supradicta de experimētis. **Ad Lumbricos.** Cor nu ceruinū secas, et scobē ipsius cū melis modico, in aque calide cyathis tribus dabis bibere. **Ad profluuiū,** a me tertio hæc duo remedia sunt experimētata. De capillis ipsius mulieris, qui excidunt qñ se ornat cum mataxa, facit in medio nodum, et in arbore quacuncq̃ pomifera liget de ipsis capillis unū nodum, q̃s capillos illic relinquat in arbore aliena. Mu lier manifeste sanat, arbor autē arida fit. **Ad Vesicā.** Carbones de ar bore persicæ ÷ I. pice p°. I. resina p°. I. oleo ÷ II. ceræ ÷ II. acetī potio nem, laminā cyprinam ÷ II. quæ terenda sunt cū aceto in mortario me dicinali per triduū. Quarto autē die decoques. His in cacabū missis, ac resolutis, et cum oleo transcolatos, misceri illud oportet: qđ in mortario fuerit tritū, adunatum exagitur, quousq̃ in modū emplastri deueniat: lintheolo inducū ponitur. **Ad Epar, & Splenem.** Eupatorium, co stum, gentianā, aristolochiam longā, aristolochiam rotundā, baccas lau ri mūdas sine cortice, piper, oīa æquis ponderibus tundis, cernis: uitreo seruabis. Cū necesse fuerit, dabis in tribus cyathis meri uini, ueteris, cha lastici, cochleare plenum. Si autē feбриunt, in aque calide cyathis tribus. **Ad Coli dolorē.** Thymum hispanū tundis, & molliter cernis, & das die primo cochleare. I. die secundo. II. die tertio. III. Si feбриunt, in aqua calida: sin minus, in uini ueteris cyathis trib. **Ad dysentericos.** Conthi liū, anchusam, amyli alexandrinū æquis ponderibus tusa, et cribellata, in ouo sorbili cochleare plenū ieiuno, et post cenā dabis. Aliud Euse bij, ad Dysentericos. Vuæ syluaticę adhuc acerbæ, folliculos cū granis suis, piectis uero succis, sicca utraq̃ tundis, cernis, et in uitreo dolio ser uabis: ex hoc in trib. cyathis uini ueteris meri cochleare plenū. Febrien tibus uero cū omphaco & melle. **Ad idē.** Membranā exterioris uētris gallinaci, quā coci semp proijciunt, ad solē siccabis, ita ut sint. xxv. tun dis, cernis cū gallis asianis. II. ex quibus puluerē factum, pariter miscbis cum amylo alexadrino: cochleare plenū semel. **Ad Colum.** In balneo posteaq̃ te lotus p̃ sabana uestiueris, et sederis, dicito intra te, per te dia cholon, diacholon, diacholon. **Ad Calculū Porphyrj.** Brassicā bene siccātā teris, et piperis pondus duplū: itaq̃ cribratis, et in se mixtis, co chleare plenū dabis in potione. **Ad fluxū sanguinis de naribus experi mentatū.** De ipso sanguine nomē eius cui fluit, literis latinis in fronte scri bis ad cannā, et statuisi. **Ad idē experimentatū.** Calchitide trita si lintheolū in cortinæ extremitate tetigeris, et intra nars miseris, statuisi. Hoc & si de diacharto feceris, idē ualet. Si autē nimius sanguis currit,

Ad Lumbricos.

Ad Profluuiū mulierum.

Mataxa lyricū dicit. Forte al iudit ad Fila sericia, quibz foeminae ca pillos coer cent.

Ad Vesicam medicamen tum.

Ad Epar, & Splenem.

D

Ad Coli do lorem.

Ad Dyse ntericos.

Ineptia ma gica.

Ad Calculū. Ad fluxū san guinis mariū.

hoīs pedes in aquam frigidissimā depone, et statuisti. Ad idē experimentatū. De cacabo, siue æreo, siue fictili, fuliginē tritam per cannā infusam, si intra nares miseris, statuisti sanguinē. De Cōmai, ad hordioliū qui in oculo ab se nascit̃. Galbanū, thus, et māna in se ex æquo pondere cōmīscēs, in lintheolo inductū pone. Ad Epar. Coctum eupatoriū, lupinū crudum, æquo pondere tunsū, creta cōmixta dabis cotidie in uino cochleare plenū, in trib. cyathis mellicrati calidi. Ad idē. Guttæ amoniacę ÷ III. costi ÷ I. petroselini macedonici ÷ I. feniculi ÷ II. Hęc quatuor tundunt̃, cernuntur. Mellis autē Attici libras. II. semotim bulliunt, & sic desuper supramemorata mittunt̃. Ex eo ieiuno danda sunt II. cochlearia. Intermissis duobus diebus, accipiunt usq; quater. Ad Lateris dolorem, ad perfrictionem, sed tamen recenter bibendo. Hyssopum, organū coquis pultario nouo. Bulliat ter, aut quater. Et mittis acetum in mortarium cum melle, et mane cochlearia duo, uel tria sumat.

Ad Calculos expellendos, etiā infantibus. Vnum calculum porci, semen cauliculi, cymīnū, baccae lauri sicce mundæ, piperis unc. biznæ: hæc separatim tundunt̃, et bene cribellata in unū rediguntur, in doliō. Interea dabis cochleare plenum in * coctera mixto cyathis tribus.

Ad Cordis dolorem, etiā si spina doluerit. Laseric cyrenaici granaria, detrita, mellis, & acetī: æquo pondere, ut faciat cyathos tres, bibat.

Ad Auriginosum. Herbam aristolochiam, muscum de testō, quē fūmus non tetigit, in se teris, et spargis in corpore: uel puluerē ipsū dabis cū uino ueteri bibat. Ad Auriculę dolorē. Malumgranatū siccū exinanis, et mittis mellis cochlearia duo, et acetī glutū unum. Bulliat in se ipsū malumgranatū: de argilla deforis linis, ut bene bulliat: etiā tepidum per foliū lauri mittis in auriculā. Ad Intestinorū dolorē. Brassicam britānicā conteris, et succum eius in aquę calidę cyathis trib. dabis bibere: aut cymīnū hispanū dabis. ¶ Corpus igit̃ hoīs diuidimus in quatuor partes, Caput, Pectus, Ventrem, atq; Vesicam. Si autē incipit circa Caput caussa cōsurgere, necesse est, ut tenebrę malæ, et dolor capitis consequantur. Supercilia sunt grauia, et cerebri, & tēporū pulsus. Oculi mane lachrymantes, hos caligo cōplectitur, aurīūq; pulsus. Quādo igit̃ aliquid horū indiciorū ostenditur, cōuenit adhibere capitis purgationē sine ullo medicamine cathartico. Namq; aut hyssopi comam, & organī, et pulegiū in melle, uel in mulso datā, ad mēsuram hemīnē dimidiā gargarizare expedit. Hęc em̃ nulla circa caput lenior potest esse medicina. Tantū ergo mēsuræ colatū in mulsis tepidū gargarizari expedit ab hoīe ieiuno. Negligentibus autē hæc indicia, consueuerūt ista contingere. Imbecillitates luminū, aures rumpunt̃ extrinsecus, strumę in confinio colli, in cerebro pulsus, p̃frictio, suffocatio in guttur descendēs, uua distillat, glandula inflat̃, capilli destituūt, caput ulceribus implet̃, consequit̃ etiā dentīū dolor.

Quando autem circa Pectus caussa obdurata est, constat ex pluris

A

Ad Epar.

Ad dolorem laterum.

Ad Calculū.

Alias * dia-
codio.
Ad Cordis
dolorem.
Ad Aurigi-
nosos.

B

Ad dolorem Intestinorū.

Partitio, & ob-
seruatio par-
tiū Corporis
humani.
Caput.

Pectus.

C mis, & hæc permonstrari solent. Primum superius in pectore, & lingua crassior solito, & sputa fellita. In lateribus autem, & in scapulis, dolores sine ullis præcedentibus causis, oscitationes assiduæ, sed & alia suffocatio & sitis. A somno autem anima non læta, pulsus pectoris, in brachijs, & in manibus tremor, & sicca tussis. Quisque aduersum hæc sapienter instans, hanc consuetudinem seruet, ut a cœna uomat sine ulla medicamine. Conuenientes sunt etiam uomitus, quos & ieiunii facere solent, quibus noxius insidens pectori humor extrahitur. Conuenit igitur maiore uomitu, tenues radices manducare, carthamum, semen eruce, confusam semper, & tepentem aquam superbibere. Indicia autem negligentes harum causarum, hæc ægritudines consequuntur: pulmonum labor, phthisis, & nigri fellis iræ, acutæ febres, & semper pestilens somnus.

Venter.

Cum autem circa Ventrem ualetudo consurgit, quæ multifariam constat, ista prænunciat. Torquetur uenter & turbatur, cui se importune febris infundit. Potus autem in uisceribus amarescunt, & ex ipsis dolor in omni corpore, nulla necessitate, torpedio in uiribus, & quædam subtilitas febrium. Quando igitur hæc indicia præcesserint, conuenit uentrem sine ullis medicamentis procurare molliorem. Est autem curatio uera tibi præscripta, nihil derelinquas, aut lapathum ueteri, aut mercuriali herba, quæ Virginalis uocatur. Est enim indignationi uentris accommoda. Si autem superior causa protraxerit, quodcumque sit illorum indiciorum, oportet decoctum urticæ haurire succum. Est enim cæteris sæuior, & periculosa res. Illa quoque utilis ratio curandi est, ut caules in mulla aqua decocti penitus exudent: horum aqua melle dulcatur, asperso sale, usque ad heminas. **IIII.** Modicum utile est bibere. Hæc autem negligentes causæ ualetudinum consequuntur. Fiunt cœliaci, sine fine profluit dysenteria, sequitur iliaca, apoplexia, & in inferioribus defluens sanguis, & hærens morbus articulis.

Vesica.

Quando autem per uesicam uentura est causa, æque & ipsa multifariam constat, & prænosci solet. Ab escis, plurimus uentus emititur. Crebra eruptio, fœdus corporis color, grauis somnus, collectum decoratum, quod tamen difficulter effunditur: circa uentrem tumor excutatur. Quando ergo horum indiciorum aliquid fuerit deprehensum, futuram causam conuenit præuenire. Maxime autem ante dies decem. Quibus curam oportet adhibere, feniculi & aprij radices, maceratas in uino candido, & bene olenti da ieiuno. Duobus cyathis conuenit bibi: debet tamen aqua permixta esse mensuræ. Quos modice urina persequitur, ex hoc indicio causæ ingrauescunt, hydrops, iecoris dolor, phrenesis, straguria sicca. Scripseram autem tibi de temporum curriculis, quæ quæ recurunt, per maxime certa indicia ualetudinem in hominum corporibus ostendunt, unde illis adhibere obseruantiam oportet: ut scias quibus rebus utaris, et quibus rebus abstineas. Faciamus igitur exordiū ab hyberno tempore.

Partitio & ob
seruatio qua-
tuor tempo-
rum Anni.

Solstitiū est. iiii. Kalen. Ianua. ex qua die corporibus humor increſcit. Quā cauſſam hybernium æquinoctiū præſtat. Vtere igitur calidiſſimis, & optimis, et indulge uino: ne peperceris ueneri. Sunt autē ex ſupra ſcripta die, in æquinoctiū uernum dies nonaginta duo. A ſexto autē Kalen. April. die, uſq; ad memoratū, incrementa gignunt. Vtere igitur bene olentibus, et acerrimis cibis, ut impleatur humor. Tuncq; a ſupra ſcripto æquinoctij die, quo ſol oriē, dies quadraginta octo demonſtrat. Ortus enim Pliadū pridie Idus Maias habentur. Inde ſanguis increſcit, febres humoresq; gignunt, in æſtiui temporis permutationē. Vtere dulcibus, & minime conſucta uenere exercere, & ieiuna. Sunt autē uſq; ad permutationē æſtiui temporis, ab exordio pliadum; dies quadraginta tres. Incipit tempus æſtiui. vii. Kalen. Iulij. Ipſa hora incrementū ſellis admittitur: quod creſcit in æquinoctium Autumni. Frigidis utere, & dulcibus, et cunctis bene olentibus, & minime ieiuna: et conſuetis ueneris in totū abſtine, in dies nonaginta unū. Aequinoctium autē Autumni a ſexto Kalen. Octob. intenditur. Ipſa hora uis nigri fellis auget, humorū craſſitudo conſequi, in occaſum uſq; pliadum. Vtere calidis, & acerrimis omnibus, et abſtine a Venere, minimūq; ieiuna. Sunt autē in occaſu ſupra ſcripto dies. xlii. Occaſus pliadū quarto Idus Nouēb. Ea dem hora ruſſus hominibus ſanguis increſcit. Conuenit igitur & te reliquis uti, & indulgere uino, conſuetis Veneris inſiſtere. Dies ſunt in tempore hyberni. xl. Iſtis ſi uteris, ut miſſa ſcriptura demonſtrat, integra ſalute reliquū tempus facile tranſiges, ſine uallatione medicorū. Ad Capitis dolorem, ut in ſole non doleat, radicē pulegij poſt aurem ſiniſtram baiulabis. Item quando te lauaueris anteq; ſolium deſcendas, de manu ſiniſtra haurito aquā, & ſupra cerebrū ter mittito. Item aliud. Papyrus tenes in manibus tuis, & nominas ſeptem uiduas, quas noſti, & facis ſeptem nodos in eo, & in fronte ligabis. Item uitis albæ corticem comburito, & miſcens cum uitello oui, linias in fronte.

Ad morſum ſerpētium. Gentianam, ariſtoloſchiam rotundam, lauri baccas purgatas, myrrham, æquis ponderibus tuſas admiſces melli optimo. Ad hemicranion. Canis mortui capillos de capite tollis, de duobus digitis, & pulli mortui, & die ſequenti minimo in lintheolo, de licio in collo ſuſpendis. Itē radices falſas raphani teræ, quæ adhæſerint tolle, & tere cū aceto acri, et lini hemicraniā. Ad grauedinē aurium. Fel caprinū, mel atticū quantū & fel fuerit, myrrhā, oleum roſaceū ſimul in carbonibus calefacis, & in aurem mittis. Ad Vermiculos qui in auribus nati fuerint. Amurcā calefacies, & mittis in aurem. Ad auriculæ dolorem. Porri ſuccū, intybi ſuccū cum nardo calefacies, et intus mittes.

Ad auris dolorem, & uulnera. Herbæ ſanguinarie ſuccorū cochlearia duo, mellis cochlearia. ii. olei cochlearia. ii. ſicci porri uirginis cochlearia. ii. hæc omnia ſimul cōmiſces, coquens igni leui, & intus mittis.

A

Hyems.

Ver.

Aestas.

Autumnus.

B

Ad capitis dolorem.

Superſtitioſum.

Ad morſum Canis.

Ad Hemicraniam.

Ad Aurium grauedinem.

C
Vt infirmus
dormiat.
Ad Tussim.

Ad infirmum, ut dormiat. Semen sesami cum aqua teris, & facies grana minuta, in modum ciceris, & ad caussas supradictas. ut dormiat, grana bina uel terna glutiat. Ad tussim. Semen canabis, fabam combustum, pulegium, irin Illyricam, piper, hyssopum, semen de urtica, & anethi radicem, omnia hæc ad scrupulum semis mittis, & teris in aqua calida. Ad tussim. Herbam marrubium decoques ex aqua ad tertias, & cum melle despumato, dabis bibere. Ad tussim electuariū. Petroselinū unciā. I. gingib. ÷. I. pip. ÷. citoniorum coctorū pondo duo, mellis. II. pariter omnia cōmises, & coquis, dabis ieiuno cochleare. Ad tussim. Nuces grandes sine nucleo coques in olla n̄bua, & aquam quam tam uolueris, dūmodo sextarium bibat ex uino, sanabitur. Item synapi alexandrini unc. friges, & piperis unc. atq; in unū conteris, et contritum in pultariū mittis, adijciens mellis pondo. I. et coques usque cum spissum sit, & refrigescat: ex hoc ieiunus sub lingua teneat, & dum se cœperit soluere, transglutiat. Hoc & noctu cum dormire cœperit, faciat. Ad idem facit, & maximum remedium est. Equi saluiam, ex aqua calida bibat per triduum: is qui tussierit, uiuet, equus morietur. Ad idem. Anethi feminis cyathis tres, piperis scrupulos. XII. mellis sextarium. I. tundis, & cribras, in melle commises, & sic uteris, mane cochlearia tria, & alia die similiter.

D
Ad Coli do-
lorem.

Ad idem. Irin Illyricam drachmā. I. mellis quod sufficiat, quousque sit eliquata spissitudo. Ad coli dolorem. Azymū panem tundis, & per cribellum cernis, et das die primo in uino cochleare unum, die secundo duo, tertio tria, febrietanti in calida, sano ut dictum est, in uino ueteri. Ad colum. Siliquas aphras tres, piperis albi grana. XXI. costi scrup. IIII. post omnia hæc trita, et cribellata, in uino ignito potionem facis, et dabis ei cochleare unum. Hoc per triduum si dolet, ignitum ferrum sic in uino extinguēs. Item Canabis radicem combures, grana. LXXVIII. in mortario teris, in uino, & dabis potionem diebus. VIII. Item lignum nodosum sambucinū mittis in focū, & dum cœperit exuri, paulatim fauillam de eodem extinguis: colligis in uasculo mundo: & rursus apposito ligno ad ignem, iterum & frequentius hoc faciendo colligis, usque ad cochleare plenum: cuique pulueri adijciens canabis grana. XIIII. cymini grana. XVIII. Contrita simul cum puluere adijciens, in calida portione facta, da ieiuno, ut bibat plurimis diebus. Item testas ouorum gallinæ, cum primum oua fuerint supposita, post exclusionem collecta: omnia uris, & teris diligenter in mortario: adijcies piperis grana. XXI. simul diligenter conteris: & dabis in aqua calida cochleare plenum: hoc facis per triduum. Item caput sardi decoques diligenter in aqua nymphali, quam colatam calidam dabis ei bibere. Item sanguinem anguillæ, cum rubello uino, æquis mensuris cum aqua tepida mittis. Item ad Colum. Aphronitra matronalia duo, in aqua dabis.

Ad Colum.

Ad mammillarum dolorem. Terrę tubera uiridia, et axungiam ueterem sine sale tunde, & panem: facies cataplasma, & impones. Quibus ungues dolent, siue ad Paronychia. Mel coquens despuma, spumam argenti, & æris florem tritum simul cōmiscens, & unguibus in lintheolo impones. Ad eructuationem, uel stomachi inflationem. Myrrhæ nigraë baccam contritam dabis cum uino ueteri. Ad stomachum confirmandum diateffaron. Ciminū, rutam, baccam lauri æquis ponderibus trita, melle mixto, cochleare plenum ieiunum bibat. Ad formidinem cordis, & spasmū. Folia perfici trita ponantur ad cor, & succus horum. Item rutam ex aceto & melle, cum farina hordeacea pectori impones. Ad cordis dolorem, etiam si spina doluerit. Laseis cyrenaici grana tria, detrita in melle, & aceto, æquo pondere, quod faciat cyathos III. bibat. Ad formidinem cordis & spasmum. Rutæ fasciculos in rosaceo oleo, & aceto decoquito. & unge eum, ut sudor desinat: quia cordis, uel animi angustię sudorē frigidum generant. In uino mero spongiam macera, & sinistra māmille imposito. Ad fluxum uentris. Galam, & testam de locusta teris, & mittis in ouum forbile, et dabis ad uentrem. Betam ex aqua mulsā decoques, sparso nitro. Cum manduca uerit, aquam ipsam bibat. Ad Lumbricos. Coriandri semen cū melle dabis manducare. Ad fluxum uentris. Lenticulæ agrestis semē teris, & dabis in aqua calida, & mox restringit. Etiam si infans lateris patitur dolorem, bibat nutrix ex hoc, & lactet infanē, & statim infans sentiet. Ad uentrem faciendum. Rubricam mittis in aquam calidam, iuxta modum potionis: dabis potum, etiam si lumbrici sint subsistent.

Ad eos quibus uenter iuxta consuetudinem non facit. Blitum, uirginem herbam, siue Mercurialem, apium, damnaescena quinque in aqua nymphali discoque: quam diligentissime colas, & facies ex ipsa aqua potum, in quo modicū olei adijcies, datur ei. Ad duriciam uentris. In tribus caricis pinguißimis, exprimis lac, et dimittis in ollam, ita ut pene sit plena, dabis hoc manducare. Qui sunt pinguißimi corpore, ut extenuentur. Osisfragi auis uentriculum siccum ad uentrem alligabis, ita ut corpus cōtingat, et cum homine maneat: ad extenuationē quantum uoluerit, ueniet. Ad uentris strictionem. Castaneæ coria tria, et mali, ac piri, & rosæ flores, in aqua calida dabis bibere. Ad solutionem uentris. Ouum, & butyrum in se coques, et in lintheolo inductum, ad præcordia imponis. Ad suspirium. Lapidem modicum de fluuio qui terri potest, de manu sinistra tollito, et in uino dabis: aut certe tria grana alij ad tertias decoquito, et bibat. Ad suspiriū. Aquam quæ in arbore inuenit in lacunis, cauisq; corticibus cōsistens, suspirioso potum dabis.

Item betonicā cernis, cernitā repones, cum opus fuerit drachmas tres cum lacte caprino ieiunus accipiat. Itē centauriæ herbę succum, nucis auella næ magnitudine, in oxymellis cyathis tribus da: bibat, sanus erit.

A

Ad Paronychia.

Ad eructationem.

Confortatiui Stomachi.

Cordis.

Ad fluxum uentris.

Lumbricos.

B

Constipatos.

Ad corporis extenuationem.

Ad Suspirium.

C Ad lateris dolorem, & ad perfrictionem, attamen arcentem nimium, Hyssopum, organū coques in pultario nono, bulliat ter uel quater: acetum mittis in pultarium, & mel, & mane cochlearia duo uel tria sumat.

Ad dolorem
Lateris.

Ad lateris dolorem. Petroselini fasciculos sex semis, piper tritum dabis in uino, & in ipso latere recumbat. Item semen absynthij tundis, & facis puluerem, & cōmises cum axungia ueteri, inducis in pannum, & imponis. Ad lateris dextri dolorem, & ad epar. Piper, costum, apij semen, æquis ponderibus tundis, & cribellas: in aqua calida potionem dabis, mittis autē cochleare unum. Ad lateris dolorem, & si quis pondus leuauerit. Sulphur uiuum, picem, resinam maculosam, bitumen tritum, in charta per se imponis in balneo in loco ubi dolet, si quidem multum dolet, & postmodum triduo a balneo se abstineat. Ad lateris dolorem. Herbam chelidoniā tritam cum axungia imposito. Item tritam

Ad Epar.

cum uino, da ieiuno, bibat, sanus sit. Ad Epar. Linum, eupatorium, costum, gentianā, aristolochiam longam, aristolochiam rotundam, baccas lauri mundas sine cortice, piper, hæc omnia æquis ponderibus tundis, cernis, seruabis. Cū necesse fuerit, dabis in tribus cyathis meri uini, ueteris calefacti cochleare plenum. Si autem febricitet, in aqua calida, trium, cyathorū mensura. Ad Epar. Costum, eupatorium, lupinum crudum, æquis ponderibus tundum, cernitum, cōmixtum, ex hoc dabis in

D tribus cyathis mellis crati calidi cochleare plenum, per triduum. Hæc portio danda est ieiuno. Item gutta ammoniacæ ÷ IIII. costi ÷ I. petroselini macedonici ÷ I. feniculi ÷ II. Hæc species tunduntur, mellis autem atticci libra. I. semotim bulliat, & sic desuper memoratæ species tunduntur. Ex hoc ieiuno dantur cochlearia duo: intermissis iterū duobus diebus, accipiant, usq; quater. Item piperis grana. xxx. baccas lauri mundi sine cortice, grana. x. simul in mortario teris, et dabis in uino ueteri cyathos tres, & in eo latere recumbat. Hoc per triduum si febricitauerit in aqua calida dabis. Item corticem rasum auellang, in uino terito, et dabis. Item uulpis splenem siccas, & dabis tritum ieiuno incondito. Aut certe costum, scœnogræcum, orizam, piper, æquis ponderibus tundis, & condita dabis. Ad spleneticos. Ficus, & pilulas cypressinas decoque cum aceto, & facis cataplasma, & imponis. Item *pulegium, quæ prius nascitur, teritur, et in uino dabis. Item radicem ebuli siccam, aut certe radicem salicis in aqua coques, & dabis ieiuno uinū uetus. Stipticem nouissime purgatum bene combures, & puluerem facies, & dabis.

Ad Spleneticos.

Alias, * polium.

Si infanti, uel maiori ad affellandum intestinum descenderit, facies hoc. Stercus asini comburis: inde facto puluere in olla ipso puluere intestinum aspergis: de aqua non lauas. Posteaquam puluerem asperseris, uidebis ipse, ne intestinum detergas. Hoc assidue facis, usq; dum cesset descendere. Ad Intestinorum dolorem. Brassicam britannicam conteris, & succum eius in aqua calida cyathos tres dabis bibere.

Ad exitum
Intestini.

Si infanti, uel maiori ad affellandū intestinum descēderit, siue sanguine puro, siue cū stercore affellatus, sublaueit se de aqua suprascripta cum acacia. Postq̃ delotum fuerit, mittis saui hircini calefacti, in aqua calida, cochlearia duo, uel succi orizæ cochlearia duo, & acaciæ cochleare dimidium, in clistere cōmixta mittis. Ad locinoris dolorē. Lupi cor siccum teris cum pipere, costo, petroselino, ieiunus ex mero bibat. Itē Betoniæ fasciculū, & mellis sextariū decoques ad medias, et dabis per tridū.

Ad nauseas, & uomitū. Oleum coctum tritum ex melle, et cochleare manducet: uel anethum ex aqua mulsā dabis. Ad sanguinis uomitū. Glutinis libram, ex aqua potionē dabis, bibat, & curatur sine periculo.

Qui escā non continet. Stercus passeris parietarij teris, dabis in uino ueteri, ad potionē cochlearis unius, mox escā tenet. Ad Renum dolorē. Picem, bitumen iudaicū, sulphur uiuū, nitrū, trita omnia mixta in se imponis. Item herbā artemisiā a pridie ubi nascitur inquires, & alia die ante solis ortū, inclinatus de sinistra manū euelle, sine nodo contingis tē. Ad hyrcosofos. Thus masculū, et alumē tere, et ascellas hyrcosofas lineā: aut myrta sicca. Ad Renum dolorē. Ieiunus puscā tepidā bibat, et inambulet: aut certe seuum bubulū manducet, aut certe suinum uirginē, ad renem ligabis. Ad Dysentericos. Conchidium, anchusam, amyllum alexandrinū, hæc omnia æquis ponderib. tinsa, cribellata seruabis. In necessitate dabis in ouo forbili cochleare plenū, mane ieiuno: in ouis tribus singula cochlearia, hoc est, per diem unum, ouum unum.

Item cōagulum leporis ex uino uetere delotū, tepesactum, dabis ieiuno bibere, & continuo sanat, etiam si carnes mittat. Item uuē syluaticæ adhuc recentis folliculos cū granis suis, prolatis succis siccas, utraq̃ tundis, cernis, in dolio uitreo seruabis: in necessitate dabis ex hoc tria cochlearia in uino ueteri mero, frigido, uel tepido. Febricitanti cum omphacino melle modico, ut supra memorat. Item mēbranas exterioris uentris gallinaci, quas coci semper projiciunt, maxime de plurimis pullis, has sole siccabis, ita ut sint. x. xv. tundis, cernis, cū pilulis quas dicimus anagallidos numero. v. ex quibus puluerem factum, pariter miscebis in uino, et æque amyli alexandri cochleare unū. Permista omnia in uas uitreo seruabis. Cum necesse fuerit, in ouo forbili dabis cochleare unum in die semel.

Si autē ita fuerit solutio uentris, ut cum stercore soluto, sputa remaneant, & generent conatus & libidinē, tunc oleum, siue uermiculus ad hæc dirimēda datur. Et huius clisteris cōpositio talis est. Maligranati corticem, rubi cymas, myrtasq̃ leues, rorem syriacū: omnia hæc mittis in ollam, & excoquis, in uino supramemorato, cochleare mittis cum puluere. Cuius pulueris cōpositio talis est. Acaciæ nigræ puluerem factū conteris ÷ I. struthij. I. seminis asparagi ÷ I. ligamen hederæ ÷ I. rheuponticum ÷ I. rheupontici cum pulegio ÷ I. omnia tundis, et cribellas subtilissime, dabis cochleare unū cum melle calido. Ad Ge

A

Ad dolorem
Iecoris.Ad Nauseā,
& uomitum.
Ad sanguinis
uomitionem.
Vt esca con-
tineatur.
Ad Remum
dolorem.

Ad hyrcosofos:

Ad Dysente-
ricos.

B

C Ad dolorem
Geniculorū.
Ad Interanea
& febres.

Ad Tibiarū
uulnera.

Ineptia de-
lyra.

Ad tumorem
Talorum, &
plantæ.

Ad Luxatū.
Ad Ventrem.

Ad Hemitri-
tæum.

Superstitio-
sum.

Ad Febres.

Ad Somnū.

Ad Auri-
ginem.

Ad Panni-
culum.

Ad Sircu-
losos.

niculorum dolorē. Genestam, tunsam, uel semen eius cum axungia ma-
laxata impones. Ad omnē passionem interaneorū, uel febres. Spinæ
minutæ flores, & rosæ, succo colligato, & siccato, atq; conterito, & melli
cōmisceto: grana etiā piperis parce adiungito pariter. Si nō febricitat, in
uīno dabis: si uero febricitat, in calida aqua. Ad impacta tibiæ uulne-
ra, aut coti, siue geniculo, ijs occurrendum erit. Lomentū fabarium cer-
ne, & acetum simul immixtū, & diligenter cōagitatum: ut cœperit siccare,
ex ipso suffundis usq; in diem tertiam. Si autē cotis separata fuerit, re-
ponenda est, & non temere mouenda: et hoc superimponendum quod
scriptum est: ita, ut cum cœperit siccare, acetum suffundendum sit.

Ad strophum dicis hæc uerba. Quid irasceris? quid sicut canis iactas
te? Quid sicut lepus resilis? Quiesce intestinum, & sta crocodyle. Ad
talorum tumorē & plantæ. Pampinum uitis uiridem aqua feruētī per-
funde: quē conteres, & superimpositum colligabis. Ad luxatum. Pu-
micem combures, facies cinerem, & cum oleo maceratum, calidum im-
pones. Ad uentris dolorē. Minoris altilis pullos, qui sanguinem ha-
bent teris, & potui dabis. Ad febres, uel hemitritæum. Oua frangis re-
centia, uinū & oleum rosaceum agitas in se, & cataplasmas uentrē ei, qui
patitur: superimponis lintheolum, & cum siccauerit, aliud imponis.

D Ad hemitritæum, & ad omnē ardorem. Oleum rosaceum, & addis a-
quam, quā ad focum facies ut ferueat: supermittis lini semen triū bene,
ut fiat quasi carotum: & in pannū inducis, & ad media imponis, & cur-
rabis. Ad febres. Accipis adipem de anfore, aut certe de porcello, cro-
cum, oleū rosaceum, & chamemelinon. Adipes bulliant, & oleū per lin-
theolū colas. Ea omnia in mortario teris, & linis omne corpus ei qui pa-
titur, & de sabano tergis. Ut non infirmeris. Violā cum uideris, digi-
to medio & pollice decerpe florem, & unū deuorato, deinde alterum, et
tertiū. Quotquot annis hoc feceris, non agrotabis. Ad febrem discuz-
tiendam. Nitrum & thus teris, et adijcies oleum, & uinū tepidum, & sic
perunges. Ad febrem medullarē. Lacertum prendis die Iouis, ocul-
los ei tollis, et in lintheolo ligas per singula genua. Ad somnū. Vitem
succides, & aquā eius suscipies ad potionē, & calidam adsumes cum ui-
no temperatā. Item caput canis comburito, & puluerē eius ad caput
ponito. Ad auriginem. Herbam aristolochiam, & muscum de testio,
quē fumus non tetigerit: in se teris, & spargis in corpus ipsius: uel pul-
uerē ipsum dabis cum uīno uetere, ut bibat. Item gith quod nascit in
segete, friget, & in testa teris, & bibere dabis. Ad panniculū. Meu, &
cedriā cū axungia imponis. Itē palas cypressi, si decoques bene, quasi
carotū, & semen eius deintus proficies: cætera teris, & axungia sine sale
in se diligēter panno nigro imponis: aut spargit, aut rūpit. Ad sirculo-
sos. Radicē syriacam da in balneo. Manducet autē de aue syluatica, & in
friget. Ad tūciosos. Oleo de perna uetere facto, illi caluariā linas, tinea

as capitis perfaniat. Item facias ei caluariam, & de stercore bubulo linias caput tiniosum, etiam capillos restitues, ut ualitudinem deterges. Et si adipe ursino sæpius caput ungas, & muscarum sanguine perfrices. Aeris floris præsegmina, aluminis scissi, unc. ii. acetum acerrimum. In quod mittis squillam, & rutam syluestrem, & corticem pini interiorem: his omnibus diligenter contritis, & in unum redactis nudum perfricabis: similiter & tertio facies. Et illud quod primum imposueris, spongia deterges, & iterum fricabis, similiter & tertio facies, post hæc oleo rosaceo perungas. Item ad eandem ualitudinem, ubi et uulnerati sint, etiam si caua sint uulnera, & medicamine replentur, & ad sanitatem perducuntur. Cersæ lapides, cortices rorismarini, spumam argenti, æquis ponderibus tundis in puluerem delicatum, & ex eo puluere uulnera curabis. Etiam omne corpus perfricabis, sic sanus fiet. Ad ignem sacrum. Caseum mollem, coriandrum teras, & linas. Iterum bitumen iudaicū, et acetum bonum in mortario teris, et de penna linas. Si quis hemorroidas patitur, uiridia mora manducet, & cessat dolor. Item stercus bubulum, calido cum aceto mixtum illinas: et si post laueris, iterum linas, & sanus efficitur. Vulneribus antiquis, quibus humor affluens, medicamentis impositi beneficijs obstat: facies hoc. Ex albo oui puluerem factum, ulceri imposito usque ad sanationem. Ad Furunculū. Dactylos, & saponem teris, et pro cataplasmate calefacies, & imponis.

Ad uulnera pedum. Heracleam carpis, folia septem sicca teris, & in uase plumbeo condis: et cum coeperit humor ille curari, puluerem eius in uulneribus spargis, et ad pennam fricas, & saluus efficitur. Ad uulnera pedum, si in tibia, Bulbum liliaciū coques ex aqua donec fiat quæ si cærotum. In ollam nouā mittis bulbum, & teris, oleum rosaceum adijcies, quasi cærotum, et inducis, & ponis ad uulnera stercus caprinum arsum, ac cum uino impositum, quamuis a medicis desperata ulcera per sanat. Ad solutionem membrorum. Olei pernæ elixatæ p^o. i. adipis taurini p^o. i. hyssopi succi scrupulos. iiii. medullæ ceruicæ scrupulos. vi. semis, olei cyprini p^o. i. cæra uncia sex semis, resinæ albæ p^o. i. 5. panacis. ii. casei caprini recentis ÷ i. facies cærotum, & perunges loca quæ uidentur esse soluta. Ad somnum. Non dormientem saluabis sic. Opij ÷ iiii. myrrhæ & rutæ, thuris singulos sextarios, & cæra mixta paruos stillos scrupulares efficias, & pro chalaistico umbilico imponas: tam somnum præstat, quam etiam uentrem mouet. Serpentes fugantur. fusu cornu ceruini. Idem facit sandaraca, & galbanum, et adipis caprini. Sane non erunt in ædificio serpentes, si absinthium circa ædificium * feras, uel artemisiā herbam, uel abrotanum. Si autem uasa calefacta, in quo putaueris loco suffoderis, ita ut uasorum labra terræ æques, omnes illuc serpentes conueniunt. Quos cum incluseris, & obuius feras, ne intremueris ad scorpiones, & cætera similia: ipsi enim reme-

A

Nota ad tinea capitis optima remedia.

Ad ignem sacrum.

Dioscorides mora naturæ astringens esse, præsertim uiridia scribit. unde & coeli cis dantur. Ad Hemorrhoidis. Ad uulnera antiqua.

Ad Furunculos. Nota Dioscorid. oibus Heracleæ spibus, quæ alias syderitis dicit, uim glutinatosi tribuit, quare Heracleam hoc loco lego.

B

Cærotum bonum ad membra soluta. Somniferum unguentum mirabile. Ad effugandos Serpentes.

Alias, * teras.

- C** dijs pelluntur quibus alia. De pilis oculorum. Euulsus oculo pilus niger, canos nasci non sinit, si sanguis eius loco pili euulsi imponatur. Ad renum dolorem. Muria renum dolorem tollit.
- Pili oculorū.** Ad caliginē. Fel testudinis melli mixtum caliginem tollit.
- Ad caliginē.** Dentes. Ad dentium dolorem. Iuncus appositus dentium dolori subuenit.
- Stomachum.** Ad stomachum. Ursi natura, stomachi dolorem curat: & digestio- nem præstat, si concauitate, qua gracilius est, caput lupi ex auro acci- piat, & uasione circa stomachum suspenso collo, lino portetur, ita: ut nec aqua contingat, nec terra ipsam naturam ursi. Ad conceptum. Gramen corio canis curato, ut oportet, illigatum, steriles concipere fa- cit. Idem efficiunt mercurialis, & uerbena, herbæ quæ tam masculinæ sunt, quam fœmininæ. Ad Dysentericos, qui nimium fluxum uentris patiuntur. Semen de lapatho agresti teris, & mundas, & in ui- no uetere nigro dabis. Quotiesq; assellatus fuerit, totiens postea ex ista confectio- ne dabis. Item cochleam cum testa & carne comburis, & teris, & lentem nostratam et ipsam comburis, & teris, piper simul tritum mit- tis, & dabis potionem in aqua calida. Ad Dysentericos, uel quibus nimium uenter fluit, ita ut fatigati ad periculum perueniunt, facies, ad- miraberis: Mora syluatica tempore suo colligis cum suis folijs, et repo- nis. Quo tempore aliquis necessitate retinetur, in cacabum rudem mit- tis, coques illud diligenter usque ad tertias, & das ei potum, et continuo stringit fluxum sanguinis qui in uentre est: Ad Dysentericos, et qui sanguinem uel muscilaginem assellant. Gallam rubeam, et gummi al- bum alexandrinum, æquis ponderibus tundis, & cernis, et dabis cochle- are unum in ouo forbili. Idem ex herba argemonia facies, ut eius suc- cum uino mixto accipiat. Etiam si aliquis ferro fuerit percussus, cum axungia tunsa curabis. Idem plantago facit, ut acoto coquatur, si mo- dicum exinde bibit. Ad calculum, Brassicam siccam, & piperis pon- dus duplum, utrisque cribratis, & simul mixtis, cochleare plenum das in potione, caræni cochleare pariter. Ad calculos expellendos, etiam infantibus. Vnum calculum porcinum, seminis cauliculi, unci. II. pi- peris. II. hæc separatim tunduntur, cernuntur: & posteaquam in ui- num rediguntur, seruantur in dolio uitreo. Cum necesse fuerit, tribus cyathis mixtis calidis, caræni plenum cochleare dabis.
- Ad Calculū.** Item calculum quem primum miserit, tolle, & tere, et nescienti in a- qua calida dabis bibere. Item semen de herba personaria tere, & da- to siue oxymelle, siue in aqua. Ad calculum, & colum. Semen passif- nae siccae uentilatum diligenter purga, deinde uigessimam partem pi- peris optimi in mortario teris, & in dolio uitreo conde, et signa. Ex hoc, si dolorem febrium habet, in aqua calida quantum tres digiti capiunt, ieiuno dabis. Sin uero sine febre fuerit, lauet, & ea die in piscinam non descendat, & in sabano incondito sedeat. In diebus triginta ter hoc ac-

cipiat, omnino nunquam dolebit. Item semen Cleomæ: nascitur autem in locis humidis, & similis est synapi. Cuius semen quantum digitis tribus poteris comprehendere, cum triginta granis piperis immittas in calida aqua, & da: babat ieiunus per plurimos dies.

Item semen cauliculi, cyminum, piper, baccas lauri sicca, munda sine cortice, aquis ponderibus singula tunduntur, & in uinum miscentur: desuper adijcitur lapis qui in uesica porcina inuenitur, & ipse teritur cum supradictis speciebus. Confectum seruetur in dolio uitreo. Cum necesse fuerit, dabis in tribus cyathis cægni, mixta calida per triduum cochlearia singula. Item herbam, quæ appellatur græce petrocorpos: nascitur in petrosis locis: hanc tundis, & ipsam dabis cum aqua bibere ei, qui necessitate sustinet, & expellit lapidem. Huius autem experimenti gratia, ipsam herbam in uesica porcina cum lapide, quouis modo liga: maneat illic triduo: & post triduum aspice, & inuenies uirtute ipsius dissolutum lapidem.

Item ad calculum, uel qui cum tormento urinam facit. Lotium præ montanæ bibat, & sanabitur. Ad calculum & colum. Petroselinum ÷ I. saxifragæ ÷ I. iuniperi ÷ I. asari ÷ I. cassiæ ÷ I. pyretri ÷ I. ammoniaci ÷ I. squinanti ÷ I. prassij ÷ I. rorismarini ÷ I. rutæ ÷ I. betonice ÷ II. zinziberis ÷ II. samfuci ÷ I. costi ÷ I. piperis ÷ III. inulæ ÷ II. opij ÷ I. spicænardii ÷ I. ameos ÷ I. rheupontici ÷ I. baccæ lauri ÷ I. tritis, & in unum redactis, nudum perfricabis. In loco in quo erit, tepidum facies, & illic quod primum imposueris, spongia detergis, & iterum fricabis, similiter & tertio facies. Post hæc oleo rosæ perunges. Fabæ scemina si in coitu mulieris præstantur, ad sexum cui appositæ fuerint, iam lectæ uirides bonæ sunt. Nam sponsæ sceminalis uis magna est, si quidem ex paucis infrascriptis noscitur. Fabæ florentis summitates lectæ, ac tritæ, & uasi terreo mandatæ, & post nonaginta dies extractæ, caput infantis pene cruenti ostendunt. Quod si per suprascriptos dies retexeris, corpus muliebri formatum deprehendis. De eruca. Eruca uitæ inclusæ, cum feceris uirides farinas, si diu maneant intactæ, licurcium cum uite formatum ostendunt.

De lotio. Lotium humectum aqua pluuiali, & madefactum, ita custoditum, ut non siccetur, firmatur in muros.

De ozimo. Ozimum luna primâ tritum, & missum in ollam nouam florebit, permanens usque ad plenilunium. Quod si duplato tempore supradicto, condatur in nigra terra, generat spiphiones.

Ad coli dolorem. Coli dolorem auertis, si caudæ lacertæ summitatem ipsam, auro clausam ligaueris circa umbilicum: & si restem intuleris, in qua suspensio quis finierit uitam.

Ad morbum regium. Regio morbo tentus, asinum diu & frequenter intuens, medicabitur. Mustelas a pullis auertit, os de armo asini ca-

A
Est autem Cleomæ Helenium siue Inula Cæpana. Vel aliud herbæ nomen huic uicini, & conforme pronuntiatio reponatur.

Experimentum contra calculum.

B

Ad Coli dolorem.

Ad morbum regium.

C su inuentum, et in domo, uel in uilla collocatum. Ad scabiem equorum. Equo scabiem tollit, si uituli marini adipe, contra pilū unxeris, aut anethum cum piculē pari mensura æreo coquas uase, et eodem inducas modo. Ad rigorem. Antacotis lapis omnem rigorem ligatus auerit.

Ad oculorum equi dolorem. Suffusionem oculorū equi tollis, si succo hedere, et melle attico inungas. Ut equo pauorem tollas. Equo pauorem tolles, si in dexterā auris summitate, caudam caponi uiuo sublas tam, suspenderis. Ut uinum bonum fiat. Vinum insuaue bonum facies, si decimā dulcis aque addideris, et coquas fortius ad focum, donec ad tertias coquitur.

Oleum clarum.

Oleum bonū & clarum fit, si in fundo anethum, & salem colloces. Oleum nigrum & sordidum clarum reddis, si niri libram coctam, carbonibus tunfam, et cretam in uas miseris. Si autem uis idem iam bonum reddere, oleastri folia cōmode tunde, & massam libralem in uas mitte. Si autem suauissimū uis facere, folia uiridia oleastri tunde, & in lintheolum mitte, et per idem lintheolum oleum colato.

Eodem modo iterum oleastrū tunsum macera, et patere dies aliquos permanere, & traice. Ut putorem oleo tollas. Si oleastrum sine semine tunsum, diligēter uasi submittas, & in sole colloces, ut calefiat, et post

D

in aliud uas transferas. Pili ne nascantur. Corpus pueri, uel puellæ, priusquam pilos emittant, ouis Ortigarum linito, in perpetuū nitidum præstas, si sæpius in locis consuetis perfrices. Confectio liquaminis. Mororum partē unam, duabus uini dulcissimi permisce, liquamini bonum saporem facies. Confectio passi. Hyssopi fasciculum, mala orbiculata decem in melle coque per triduum igni lento, ita ut tribus horis diurnis ferueat. Ad hemicranium. Hemicranium pausat, si uermes pari numero sinistra manu lecti, et in aceto optimo permixti, eadem manu linantur loco dolenti. Ad alopitias. Muscarum capita caluis locis capitis illita, uestiunt capillis. Item muscarū capita combusta cum melle, alopitias tollunt. Murium etiam stercus aceto tritum auxiliatur.

Ne pili crescant.

Orriges, conturnices sunt.

Liquamen.

Passum.

Ad hemicranium.

Ad Alopitias.

Si aut uolueris auxilium fortius dare, canis uenā ceruicis solue, & accepto sanguine inducis. Item de muscis superscriptis induciū caluo, etiam capillos restituet. Ad dentitionem infantium. Catuli dens, si cā su decidat, dentientibus infantibus auxilium præstat. Et equinus dens, seu canis, uel uituli auxiliatur. Et si muri uiuo licium per acum in ore traheas, & per intestini postremam partem adicias, & ficium collo sustendas.

Ad dentitionem.

Semen quid.

S E M E N quid sit, & unde nascitur. **A**LEXANDER amator ueri, appellatus discipulus Asclepiadis, libro primo de semine, spumam sanguinis eius essentiam dixit, Diogenis placitis consentiens. Itē Erasistratus, et Herophilus, essentiam seminis dicunt sanguinē. Hoc idem Stoici philosophi de ma-

teriali semine senferunt, et demonstrationes alij alias deferentes, quasi in unū cōprehensas enarrāt. Primo igitur ut Herophilus ait, abruptio corporum hoc testatur, quam græci anotomīn uocant. Etenim seminales uasculorū interiora atq; secretius remota sanguinolenta uidentur. Sequentia uero, siue secunda, plurimum a præscriptis demutata sunt. inferiora ac proxima seminis colorem habentia: quo probatur, in seminales uias sanguinē uenire, sed earum uirtutem albescere, atq; mutatam in se mīstrans ire qualitate: sicut etiam in foeminis post partum, si quid sanguinis nondum fuerit uteri nutrimento consumptum, naturali meatu suo, in mammas, & earum uirtute albescens, lactis accipit qualitatem. Secundo, cum illi qui frequentius usu uenero depurgantur, sanguinis sustineāt per seminales uias emissionē. Siquidē celeritatis causa essentia sanguinis in seminales uenire nō sinitur uias. Tertio. Summum quicquam ex summo fieri necesse est. Summum est autem semen ex omnibus in nobis liquoribus: summus est sanguis. Semen igitur ex sanguine generatur. Quartum. Quicumque phlebotomati, sustinent post sanguinis detractionem pallorem, tenuitatem, debilitatem. Hæc etiam peracta uenere corpora comitantur: siquidem semen ex sanguine fieri uidetur. Quintum. Semen matrici appositum congelatur: ut declarant temporis abruptiones: quod est signum seminis, atque essentia de sanguine uenientis, & ad suam originem redeuntis, quippe præter sua uascula constituti. Sed his omnibus Diocles, sectator Hippocratis, quem Athenienses iuniorem Hippocratem uocauerunt, assertionibus respondens, contra primam dixit: quomodo una atque eadem materia descendens per quosdam uiarum meatus uspiam phlegma fiet, uspiam fel, id est, cholera rubea, uspiam melancholia, uspiam sanguis. Fit etiam sanguis semen ex nutrimine, id est, ex cibo & potu, ex quibus & ipsi quatuor humores nutriunt, & non specialiter sanguinis eius mutatur initium. Alioquin debuit etiam in pueris seminis substantia seruari, cum materia sanguinis non desit.

Item contra secundam, hoc est, quod frequentē uenere tiexati, sanguinem quidam excludant, dicendum: quod iugi adfricatione aliquæ interioris coli uig sanguinē uideant. Deniq; illis maxime urinā facientibus, partiū mordicatio sequitur. Contra tertiam, quod in nobis magis summus uideatur spiritus, non ut illi putant sanguis, qui neque per se moueri potest. Contra quartam dicendum, quia phlebotomati non solum sanguis egeritur, uerumetiam spiritus: & eosdem non pallor, siue fatigatio, uel cætera sequi uideantur. Hanc igitur essentiam seminis dixerit fel, aut stercora.

Contra quintam dicendum, quod sæpius conceptione declināte purgationes fiant, et propterea si quid sanguinis in matrice remanserit semine congeletur. Ipsum denique foras effusum, & non in matricem uenit.

A
Herophili rationes.

Semen ex sanguine.

B
Dioclis responsio.

Cens nuncq̃ in sanguinis reducitur qualitātē, aut congelari potuit in similitudinē sanguinis. Diogenes autē Apollonij, essentiam seminis similiter spuinam sanguinis dixit libro physico. Etenim spiratione adductus spiritus, sanguinem suspendit: cuius alia pars carne uiuit, alia superans in seminales cadit uias, & semen facit, quod nō est aliud quā spuma sanguinis spiritu collisi. Aristoteles autem, semen inquit aliud principaliter uocari, aliud participio. Cuius primum semine feruens quidam in liquido spiritus, atq; in complexum uenereum profiliens, sit cum liquore, qui sit similis igni terreno, est enim corruptiuus. Ille autem qui diurnus atque æthereus est, si quidem sit nutritibilis, germinum atq; animalium, clauso feruore seminis in liquido, comparabitur. Participio autem dicunt appellari semen spumam ultimæ digestionis nutrimentū. Primum etenim consensum cibos in ore accipit: secundum in albo: tertium cum in sanguinem mutatum est. Igitur superantia supradicta non inutilia, ut urina, uel stercora, sed ut illud quod in panificio separant panifices, fermento relicto, alterius panis confectioni profuturo.

Quærunt etiam, qua causſa conferuens atque crassum, post digestionem, aquatum atq; frigidum fiat, cum necesse sit. Attendunt esse ex duobus, hoc est, aut terrenum, aut aquosum.

D Diocles his assertionibus respondens, ait in libro trigésimo octauo. Hippocrates, quem primarium medicorum appellamus, suo testimonio affirmauit de seminis natura: eo quod ex nutrimento, quod græce trophîn appellamus, sicuti & omnes humores, ut musculi, nerui, nœ, & arteriæ, uel reliquorum membrorum, seu cordis, & cerebri, ubi principaliter anima consistit, suum alimentum, uel nutrimentum percipiunt ex cibo & potu: sic itaque & seminales uia, quas græce spermaticos sporos appellamus, ex nutrimento replentur, & sic calefacti, incitati a uenere, deriuatio seminis fit. Quæ & ipsæ uia seminales, a cerebro initium alimentū percipiunt, ad conficiendum animal. Ad hæc consentiens Diocles ait. Cur Aristotiles definiuit terrenū, aut aquosum esse semen? Inanem atq; uacuum definitionē opposuit. Sed si aquosum, cur feruore nostro crassescit? cum liquida magis frigore post digestionem soluatur. Etenim terrena feruore solidantur, nec tamen frigore soluuntur. Sed hanc questionem differens, ait semen contineri terrenum æque liquoris & spiritus essentia. Efflato autem feruore suo, aquosa remansit qualitas, sed gelatur: si quidem terrenam quoq; habebat substantiam. Album si quidem sit spuma. Deniq; culpandum inquit historiographum Herodotum, et Thesium medicum. Historiographum Herodotum siquidem, quod dixerat semen ethicorum nigrum uideri. Thesium uero medicum, quod elephantorū semen ita post egestionem solidari dixerit, ut electri similem substantiā sumat: sanguis etiā non paruus, et ita ueniens in uentrē motus, ut a plerisq; epilepsia minor diceretur. Quo fiet, ut melius

Diocles in Aristotelem.

quicquid dixerit, quod sit quiddam alba spuma, sed non solida. Lac enim quoque **A**
eius coloris ostendit, nec tam ilico seminis essentia, seminis deriuatio.

Ad hæc Diocles. Quippe cum sit omnis spuma levis, atque fistulosa, & inanibus capillis uacuata, & facilitate scissibili solubilis: semen aut ut a cunctis prospicitur, uel intelligitur, est graue, tractuosum, glutinosum, & non facile solubile, neque fistulosum: ostendo & alia multa, non esse semen essentiam sanguinis. Omitto plurima, & a plurimis animalia sine sanguine memorari: ut puta, pùlpas, sepias, lollia, ostrea, spondulos, perneceas, profacines, qui sua uirtute nauim bellicantes, opposito ore, uel mordente immobilem retinent. Nec tamen hæc omnia sine suo semine procreari possunt: quomodo etiam in usu uenero spuma generari. Persuadent autem cadentibus membris, cum in apertionibus corporum, quas anatomas uocamus, passus in suis uasculis reperitur. Asclepiades autem consentiens, ait essentiam, atque **B**
seminis uniuersalis hominum, uel animalium, item principalis corpusculi intellectu sensam: subiectam autem sibi pastilitatis cruditatem, hoc est, nouum cibum acceptum, siue noua subinde nutrimenta. Vult enim ex crudis fieri redditiones: ut accepti cibi dissecta materies in corpusculis minutata, seu cocta, & in lacteum humorem mutata, omnes per corporis partes, ac particulas discurrat: atque ita in nares ueniens, mucilentum faciat liquorem, in uesicula iecoris. Fel non aliter etiam in seminales uias cadens, ea cum naturali uirtute, siue fabricatione semen fieri, ut beatissimus Hippocrates affirmat.

Lapidem dicit Hippocrates in uesica generari superatione feruoris, cum attracta, seu descendente urinae terrore in uesica resident, ex feruoris densitate nimio perfusa liquore, seu calore: sicut inquit uidemus fieri etiam in fictilibus uasculis, quæ humecta admixto liquore molliore fornacibus ingeruntur: tunc desiccata feruore, in lapideam soliditatem ueniunt. Quæ & ipsa uesica uelut uentosa ab artifice posita, ad se humorem attrahit, & ex omni regione corporis ad orificium eius decurrit, & sicut humor tenetur a lacte secernitur: sic itaque urina a cibo iam cocta, atque in sanguineum colorem mutata, uel lactaneum secernitur, effluens ad inferiorem locum, in corpore ad id prædispositam uesicam, per uritidos poros suscipiens in se urinam uiridis coloris. Quæ & ipsa uesica habet super se duos renulos neruosos, non ad suscipiendam urinam, sed ad respirationem, uel uaporatinem.

Lacte autem fieri, uel nutrir dictum est ex nutrimento: quod si quid fuerit crassius, ac pinguius, exprimit, uel excludit uteri per angustias, aut meatum: quo expresso, & in humecta ueniente, pinguius egeratur, in mammarum, aut fistulosas uias ueniens, lactis accipiat qualitatem.

Pubertatem & barbam nasci eodem tempore laxamento cutis, quod

Asclepiades.

Causa Lapidis.

- C laxamentum fiet emissione seminis: ante enim fieri non potest. Nunc igitur naturę nutrimentum per laxatas vias corporis exiens, aëris frigido tactu nimia densitate cōactum, in capillos uenit. Denique eunuchi barbire non possunt: quia semen non emittunt. Denique & infantes natimissime ambulare possunt, ut reliqua animalia: quæ mox ut nata fuerint, ambulant, infantes uero minime: ob hoc. Quia omnis calor in capite est constitutus. Omnes uiri artus phlegmatico humore sunt corroborati: eaque ratione neque nerui, seu muscoli suum officium rite adimplere possunt, nisi ex cibo & potu incitatus fuerit calor, qui in superioribus locis est constitutus, id est, in cerebro, qui durinando omnē corporis regionem calefacit, atque soluit. Neque mulieres barbire possunt, quanquam etenim semen emittere uideantur, non tamen ita emissionis tempore ut uiri mouentur, quo possit cutis fieri laxamentum. Hinc igitur delicatiora & frigidiora sunt mulierum, siue eunuchorum corpora: & non osculatæ, neque minime incitatæ si fuerint, aut concussæ a puerili semine, ante hoc tempus semen emittere non possunt, ut uiri in fine uiæ: neque in his necessario prohibetur usque ad superficiem corporis exire nutrimentum, & propterea supradicta loca
- D capillis deferuntur. Hic de septem annorum causâ nascendi conficit compendiosam foetus perfectionem fieri, quotiens summo temperamento primordiorum, cōfectum semen in matricem uenerit. Ipsa quoque similiter temperat etiam nutrimenta minime insidiosa. Etenim in nono mense, magis partum fieri, perfectionis est causâ. Quæ cum forte septimo fuerit mense commota, raro quidem, sed rationabiliter fiet. Octauo tamen mense non facile nutribiles sunt, non est amilicatus foetus, pro ratione ponderis. Septimo mense, ad inferiora loca descendit ex superioribus spacijs. Dehinc si fuerit perfectus, rumpens membranas, nutribiliter excluditur. Hinc quassat membranas, & totam matricem, qua ex quassatione generatur tumor. Rumpere autē cum non poterit supradictas membranas ac matricem, siquidem nondum conueniens habet pondus, ac perfectam fortitudinem, necessario permanens uenit in octauo mense, & laborem facit prægnanti, donec tumor quassatione gemens resoluatur. Qua desinente, nonus mensis rursus uenit.
- Leuior causâ est aut partus secundum Hippocratem uteri perfectio, ex qua fiet nutrimenti inopia, & eruptio membranarum. Quamdiu enim paruus fuerit foetus, sufficiens carpit ex matre nutrimentum. Cum autem ad perfectam uenerit magnitudinem, plurimo necessario indigebit, quam ualeat grauida subrogare. Tunc incommodis affectus est nutrimenti. Ad quod acrius commotus, rumpit membranas: & celeritate eruptionis prominet. Fit etiam umbilici marcor, cum iam non poterit ualere nutrimenta ministrare.
- Tempore autem instante concipi, atque collocari manifestum est,

sepidomum uero septem spacijs contineri, septimo mense dentes nasci, aliquibus nono: septimo anno infanti dentes cadere: bis septenis pubescere & nucleantib. māmillis semē generare: ter septenis & uno anno barbam maturare, septidomis ægros periclitare. Quid minus? Septem stellis omnia ministrari sic infantem in utero ferri atque componi, cursum Solis & Lunę duodecadion terminare. Est autem numerus septies multiplicatus. Ita partum consummari. Sed figuram hominis infans accipit primo quadragesimo aliquando: aliquando & trigesimo die, sic ut ait Hippocrates in libro quadragesimo nono de infantis natura. Et uidi quandā mulierem in partibus Gazæ, triginta dierum abortum fecisse masculum, cuius omnia membra ex integro confirmata conspexi. Nam & cor ipsius quasi granum papaueris magnitudine existimaui.

Quādo in utero formetur homo.

Hos autē numeros, ut partus edatur, septies multiplicare oportet: ita ut quicumq; die trigesimo in utero materno figuram hominis accipit, se primo mense nascatur: hos dies septies multiplicabis, & efficiuntur dies CCX. qui fiunt menses septem. Qui autē quadragesimo die figuram hominis accēperit, nono mense intrante, decimo die nascitur. Septies multiplicabis dies, efficiuntur. CCLXXX. qui fiunt menses nouem. Itaq; die decimo, ut diximus, septimo, aut decimo mense, quī nascuntur, uitales erunt. Manifestum est, infantem in utero temporibus firmari. Quo modo? Intendite. Primo mense iactus seminis nostri in utero materno congregatur in umbilicum, in hoc est congregatio. Secundo mense expressio est corporis. Tertio mense, quia priore formatum est corpus, ei tribuitur anima. Quarto mense unguis accipit, & capillos ducit, et motum facit infans in utero materno. Ideo quarto mense prægnantes nascuntur. Quinto mense facit caracterem patris eius, aut matris, aut adulterium demonstrat. Sexto mense adiicit neruorum confirmationē. Septimo mense medulla consolidatur. Octauo mense ossa durantur. Nono mense maturatū mouet infantem effectus naturæ rerum beneficijs. Decimo mense de tenebris ad lucem exit, tardē ætatis ingressu maturatus, & proficiens. Igitur Cor aliquando cū ex pulmone impletur, si quid per superficiem cutis uenerit, recusat, atq; recludit: aliquando cum pulmo deficiens cordi nō dederit, si quidem eo tempore cum accipiendum officium uisitatur superioribus haustibus, tunc rursus corpus ex toto corde sumit aërem sibi cōsuetum, atq; ita respirationis perficit officium, differenti tempore inducens frigus, semper corpori necessariū. Sic enim supradictō exemplo ignei splendoris, seu radij, ex partibus loci in corde constituti, in quo anima consistit, usque ad omnes fines corporis istis superuenerit, & consensus in illis partibus fiet, in quibus etiā irruentia perficiuntur. Sed speciales quoque, uel quæ in ipsis geruntur, expones, aut unam esse ex corde ad quam eandem uirtutem sensificant, quæ ad animā transmittet, sed pro uiarum diuersitate fieri differentem.

B
Infantis incrementum.

Animę sedes.

C Cum enim inquit, uiuus suis uisalibus fuerit constitutus, uisus perficitur: cum in audibilibus, auditus: cum in odorantibus, odor: cū in linguae partibus, sapor: cum in toto corpore, tactus. Sicut enim una atq; eadem cibi materia prouidentia uiarum nutrimenta ministrans, nunc neruos, uel arterias, nunc uenas, aut ossa, uel musculos transit, non aliter sensificat uirtus animæ secundum accipientium uiarum differētiam. Si per omne in quā corpus mundæ essent uiæ, ut in oculis sunt constitutæ, per totum corpus forsitan uideremus. Nunc autē, quia secundum uiarū differētiā hoc fieri non potest, recte uisum inquit, hoc genere celebrari: cum ex corde sensifica uirtus limpida, atq; splendens, ad oculos prouenit, infusa per humorē uitreum, quē Græci hialoiden uocant. Exinde rursum redit ad sphæram, hoc est, oculi ultimā interius tunicam, quam Græci cristalloidem uocant, seu phacoidem, aut disaidem: tunc tenuans atq; splendificans sphæram, ad eius centrum ac mediā partē, quam appellamus phacoidem, confugit. Exinde ad pupillā omnis concidens, celerrimo lapsu per eius raritates accipit casum, tanq̃ ex suffecto secundum sphæram a uertice, ad tenuem pupillæ uiam conductum: atq; ita iruens uisibilibus rebus, hoc est, quas uidemus, earum facit apprehensionem. Sicut inquit ignis uicina corpora exurit, distantia calefacit, remota illuminat: longius autem constituta neq; urit, neq; calefacit, neq; illuminat, dissoluta omnino seu perdita uirtute: sic etiā anima in cordis altitudine habens rationabilē uirtutem, quam tendit usq; ad corporis fines, omnes sensus perficit: sed ab his decidens, in aërem eundē euanesces, in alios sensus scinditur: neq; iam seruans sensificam uirtutē, dehinc quod in uisu sensifica uirtus per multa uenit corporis mēbra, ex angustijs ad mundas uias, & propterea pura atq; illibata peruenit, & splendens, proprio uigore seruato. Accedit etiam, quod secum plurimū luminis ex anima trahat ex corde perfectio, in similitudinem radij per uisificas uias irruat, et ab hoc corpore in aërem cadens, longo itinere non intereat. Ad alios uero sensus uirtutes uenientes, per apertiores feruntur uias, ad plurimum spiritali ac ualida materia circumseptas, quorum admixtione obscurantur: ob hoc mox corpore in aërem ueniente intereunt, plurimō sibi aëre permixto.

D
Comparatio
apūissima.

¶ De L I N G U A E natura.

E T E N I M Linguam sine suo naturali esse constituit: dehinc mollem, atq; laxiorem: siquidem gustādi capacem. Sed sinu suo fabricatā: ne traducta ab aliquo qui in se esset succo & rarefaceret, & iudicium eorum qui extrinsecus irruerint, subuerteret. Mollem autem factam, quō facilius, seu celerius per eam sensifica uirtus currens gustata apprehenderet. Laxioris uero naturæ atque raram, quō celerius prauenta transuoratione eorum quæ sumuntur iudicium fieret.

¶ De CEREBRINA natura.

A

ITEM CEREBRVM sine odore esse constituit, atque sine sono: siquidem in ipso sit apprehensio odorandi, atque tangendi, seu audiendi. Sed sine odore inquit quid possit? nunc uero a supradicto officio ad suum odorem atque nuncians abiret. Irruentium iudicium autem sine sono, ut silentio capitis uoces acciperet ac probaret. De quo etiam testam natura iugem, omni ex parte circumdatam confecit: ut sumpta sensuali uirtute, facile iudicium fiat ad irruentem uocem.

¶ De VOCI S natura.

VOX NASCITVR ex torius corporis spiritu, uel pulmonum, qui sunt in modum follis ferrarij, in dando, & accipiendo spiritum uenientem & pereuntem in capite, & resonantem: & sic uocis densitas ab uniuersis auditur. Sic denique nocte uoces, densitate aeris perseverantes, longius & a longe constitutis audiuntur, perdurante aeris laxioris causa. Dissipatae, etiam proximorum difficilius audibiles fiunt.

¶ De TACTV.

TACTVM autem esse inquit sensum capientem. Sed si lenia fuerint, atque aequalia, & tenuissima, exterius, siue interius irruentia, corporum suauitatem facere: si autem aspera & concissa, dolorem. B

¶ De PURGATIONE Foeminarum.

FIERI autem purgationem foeminis ait. Siquidem concaua, atque inanis, & feruens, & uenosa sit matrix: ut ad inanitatem huiusmodi ueniens, materiae ingerat feruorem. Venas quoque naturaliter materiosas corrigit: ut post implementum uasculorum, osculatione interius facta sanguis excludatur. Vt autem per singulos menses hoc fiat, causa inquit extat, quod tales sint uiae, siue pori, ut mense repleantur, & post implementum rursus osculatio fiat, ac deinde purgatio sequatur. Quae adhuc nouellis aetatibus fieri non potest, neque declinantibus. Siquidem in nouellis nondum sint uiae dilatatae atque capaces materiae plurimae. Item in declinantibus, siquidem conciderint: uia etiam frigida atque torpens. Naturaliter autem suspicatur, matrici compati mammas.

¶ De SEMINE.

ITEM MASCVLORUM semē suam habere naturam, ut ossa, uel neruos, aut carnem, & his similia, & non ex alienigenis fieri. Ostendit enim ad generandum mense nono, uel iam foeminam conuenire. Seminis autem iactum ait, nō nisi solum iaculando fieri. Non enim sufficit hoc intantum penetrare, ut fundum matricis teneat, sed ipsum

Partuum di-
uerſitas.

C quoque iactum ſeminis, ſiue excuſſum rapere ad ſe adducendo, atq; ſue inanitati concedere: ut iaculum piſcaturus: & ut medicinalis cucurbita appoſita, carnes ad ſe adducit, adiuuante ſeruore: uelut lucerna & flamma oleum ducit ad ſe. Dehinc forſitan etiam, ut delectatione conceptio ſi at ſiccitas rapit eam. Quod etiam ad poenitentiam quandam ſeminis aſſiciantur ſceminæ, probatur ex eo: quod ante coitum agantur ſtimulis. Sic denique ſi prior ſceminini ſeminis curſus in uafculis concidat, maſculi ex eo naſcuntur, ſuperueniente ſimili ſemine. Si uero antecceſſerit uirile ſemen, & in uafculis ceciderit, prius ſuperueniente ſceminæ ſemine, ſceminæ naſcuntur. Hinc eſt rationi humanæ conſentaneum, quod uirili ſemine puellæ naſcantur: ex ſceminæ ſemine, pueri naſcantur. Si itaque utrorumque ſemen permixtum, obuiando ſibi in uafculorum cauitatem ceciderit, hos uiragines appellamus. Exinde prudentes atque pulchri naſcuntur, ex uno conſenſu, nihil in ſe retinētes iracundiæ. Denique ſi ex uno cenſenſu permixtio ſeminis non fuerit, ſed uacanti animo incitatum fuerit, ſeu in uafculis ceciderit, debiles atq; ſine intellectu naſcuntur: eo quod ipſum ſemē minutum moueatur, non ut pingue rationabiliter, ſed aut cholericum, aut aquoſum, aut cœnoſum, aut corruptum, ſæpius muti, aut ſurdi, aut rari: eo quod non ſit integrum ſemen, nec tempore competent. Geminorum genus nos dicimus: eo quod in oriſcium uulvæ duo aditus abire noſcuntur: ubi ſi uiciſſim, uel ſi diuiſum in duas uel tres partes ſemen in uafculorum capita ceciderit, gemini, uel trigemini naſcuntur. Iſtericum inquit fieri, quod turgente iecore, ſeu tumente ueſicula, quam ſel appellamus, debilitationem ſuperatione nutrimenti cauſſetur, & non poteſt ad digeſtorias uias, ſeu rationales peruenire: unde fit totius corporis obduratio, ſtomachi, epatis, ſplenis, atque pulmonum, ſiue inteſtini cæci. Et propterea prohibetur ſel ad uafculum permeare, quod græce holedon uocamus: & ita agitata ſiue perſuſa corpora, aut uirideſcere, atque deformes & pallentes cutes facere. Somnos inquit fieri, animæ atque corporis indulgentia, id eſt, ſedato ſeruore, qui inſomnietatem facit, qui calefacit & deſiccatur metus cerebri. Temperatis & humectis itaque metucis, dulcis ſomnus corpora reformat. Bolinū inquit fieri ex ariditate & ſiccitate totius corporis, & obſtruſis uijs ex melancholia, quæ eſt tardior ad curandum, ex quibus uijs fames, ſiue appetentia ciborum fiet.

Dysenteriam inquit fieri, uel lenteriam, nimietate frigoris, ac liquidorum humorum, quam græce dacchodes uocamus: quæ deſcendendo & exurēdo inteſtina dysenterias, uel lenterias facit, ex deſſuſa carne uenientium atque uentre ruentium, quæ nutrimentiſ admixta, ſeu cibis ſumptis, corruptione ſua neque ſurſum carnis uias accipere ſinit nutrimentum, aut corpori propiare. Cordapſon autem & ileon fieri humore generato dixit in ore coli argilloſorum, liquidorum humorum ob-

struſione: ſed cordapſon inferiore oſculo fieri dixit, quod eſt oppoſi- **A**
 tum, uel ſpectans inteſtinum, cui nomen eſt arcon. ſiquidem neq; ſter-
 cora in ipſum, neque uentus irruat, neque cliſteris iniectione accipiat,
 omnibus concidentibus & obſtantibus iniectionali. Auliſculeon uero
 in ſuperiori oſculo fieri, quo liquor tenue denique expectat inteſtinum,
 & inſlationem, ſeu uentos, & ſtercora aliquando irruentia accipiat, &
 diſterem quoque: ſi quidem inferius oſculum non ſit obſtruſum, ſed
 non liberū tranſitum ad ilcon fieri, concepto ſeu retento ſpiritus iaculo,
 & prohibente nutrimenti naturalē meatum. Hoc ſapius continget inci-
 pientibus, & qui cauſas non intelligunt, aut per uerecundiam, ſeu po-
 tentem perſonam, ſicut in clepſydris, cum acceptus ſpiritus prohibet
 tranſitum liquidorum humorum, ſeu ſuſum exuſto atque congluti-
 nato nutrimento, tranſitus inteſtini atque eius fieri reſeſſus non ſina-
 tur: uel duratis inteſtinis, nimia ui ſpiritus, ita ut prohibea-
 tur irruere nutrimentum.

¶ Quomodo E S C A, uel P O T V S per
 omne Corpus diſtribuuntur.

T R I A I N Q V I T officia, atque diſcretionem in corpore nu- **Digeſtiones**
 trimentum ſuſtinere. Quorum primum in uentre mixtum conſtituit, **tres.**
 calefacto atque decocto, ſecundum in uenis, tertium in particulis: quia
 pro membrorum diſpoſitione ſupradicta accipiunt. Sed ex primo offi- **B**
 cio atque diſcretionem ſi quid inutile fuerit, in ſtercora per inteſtina de- **Stercus,**
 uenire. Ex ſecundo autem, quod uenis perficitur, ſuperfluum in uris **Vrina.**
 nam tranſire, atque in ueſicam decurrere: quæ ſub uentofali artifice po-
 ſita, ad ſe humorem attrahit, uel ex omni parte ad oriſcium eius decur-
 rit, ſicut humor tenuatus a lacte diſcernitur. Item ex tertio officio, quod **Sudor.**
 in partibus poſuimus, quæ in ſe ſupradicta ſuſcipiunt nutrimenta, ſi
 qua ſuperflua fuerint, tanquam aliena per ſudorem egerint. Tribus er-
 go, ut ſupra diximus officijs ac diſcretionibus, non recte conſtitutis,
 non digeri cibos, & in alborem inquit uerti, putredinem, ſeu fermento-
 ſam ſumere qualitatē: quā zimofin appellauit: quod & ante ipſum cæ-
 teri probauerunt: & in exaltationem tranſire, ſeu mutari, ut neque
 adduci ſpiritus, neque humoris eſſe uideatur, ſed inter utramque natu-
 ram, neutrum probetur. Horum igitur utrumq; cuſtodians anima, ex-
 ternum frigus inducit, hoc eſt, aëre partitum eſt. Huncque adduci non
 ſolum per nares, uerumetiam per totum corpus, officio commutato. **Spiritus**
 Quando enim per nares inferius adducitur, per fauces ad pulmonem **aëris.**
 fertur: exinde pars cordi, pars thoraci tranſmittitur: tunc impletis lo-
 cis, inductus aër per uias totius corporis, denuo totus rgeritur. Quan-
 do autem ex pulmone, atque corde, & uentre redditur, ruſum per fau-
 ces reciprocus fertur ad narium atque oris uias: tunc uia ſeruata, ruſ-

Cum per totam corporis superficiem inducitur per eiusmodi, qua per se prædictas vias exierit. Sic etiam per podicem, atque intestina, ac uentrem quod etiam per totam corporis superficiem, seu cutem respiratio fiat, manifestum est ex eo: quod cum medicaminum atque unguentorum uirtutes usque ad altiora uiscera perueniant, necessario materię tenduntur, & oppressione uentris perurgentur. Etenim per superficiem, seu cutem corporis, & rationabiles vias, id est, digestorias, inuisibili dispendio in sumptione facta, sequitur ut inanitas non ualeat substantiam retinere, id est, cibum, uel potum: cum semper irruenti materię cedit: atque ita operante uentre, nutrimenta partis uniuerso corpori traduntur. Sic itaque compresso stomacho, idem domino corporis escas quas suscepit, crudas atque acidas seu limosas ad superiora reiaciat, atque euomit, impellente feruore. Anedum inquit fieri, quem nos redibitionem uocamus, cum per inane in obstructione uenę, quę ex corde sumit initium, seu pulmonem, cum cogitur transgredi per eam a corde, reciprocus ad materiam quę spiritum spargit, per omnem corporis regionem: & ob hoc non sinens spiritum recto ac solito cursu moueri, usque ad corporis finem, sequitur ut turbatus mentem commoueat, & casum corporis faciat, atque adductiones & raptus diuersos. Aut si forte omnia quę in nobis liquida, seu argilloso, & crassiora, et feruentia sunt, hæc fuerint obstrusa, secundum eos meatus, quibus et respiratio credita sequeretur.

D Certante autem inquit interiore spiritu, seu feruore cum festinatione ex eundi, & obuiante frigore festinationi intrandi, turbari mentem, et spiratione retentatos artus fieri, seu casum, seu malefactionem, uel clypsim animę, usque dum calor ex altioribus locis mutatus, seu abductus, obduratus, uel clausas vias subtilitate caloris interrumpendo puas faciat, quę sanguis uel spiritus consuetudinarium sibi iter consequatur. Hinc fit epilepsia, compatiēte sibi bulini passionem, quę fit ex ariditate & siccitate totius corporis ab anno trigesimo usque ad quinquagesimum. His frequenter ego carpsion epithimo permixto, seu samisco, uel abrotano, seu carui semen cum asaro, in hyssopi aqua decoctio, ieiuno bibendum dedi, et ad meliora prouocaui. Opium cyrenaicum ad odorandum naribus opposuimus. In locis refrigeratis, bene olentibus repausandi locum accipiant, seu ubi flores herbarum dispersi fuerint. Ab inquietudine uociferantium custodiendi erunt. Sternutatione reflationem inquit fieri limoris in cerebro constituti, cadentis per nares. Simili modo etiam aurium tinnitum, superantibus liquidis in capite ac reflatibus, decedente spiritu. Hinc sæpe etiam aurium dolorem nasci, uel ex conceptio spiritu & assumptione, atque erumpente & extendente partes. Item fluentis humoris acrioris causa per auditorias cauernas, exulceratis finibus, transeunte humore in loca uulnerato.

Oscitationes item fieri, coaceruati spiritus atque erumpentis causa, &

Causa epilepsię.

Sternutatio.

Oscitatio.

Atque, per solitas uias decurrentis, mouente spiritu a parte, siue extra corpus dis pulsus. Ob hoc cum lachrymarum fluore ad superiora fertur. Testan-
 tanci uero sunt in statione sanguinis arteriæ, qui ex corde fertur fieri.

Spasmus opostotonum fieri inquit, spiritus conceptione, siue sum-
 ptione interius secundum spinam constituti, et qui uenarum inferior-
 res regat partes. Quando enim inquit, conceptus spiritus in exitum
 coeperit perurgeti, nec tamē ualuerit exire, angustiarum causa irruens,
 uenarum summotationibus, totius corporis, atque totis ceu sumptis alis,
 uia occlusionem, atque attractionem neruorum, musculorum quoque fa-
 cit. Peripleumoniam uero inquit fieri, astante sanguinis plenitudine,
 aut nimio tumore facto, quæ pulmonem penetrant, unde & respira-
 tio impeditur oppressione pulmonis, et densatio in uasculis, hoc est, ue-
 nis: item aliam obstructionem spiritus generari, aliam liquoris acrioris
 incerti, & transitum uiarum non habentis.

Similiter & Pleuretica passionis duplicem dedit substantiam. Icteric-
 cum inquit fieri, qui apud nos auriginosus, seu arcuatus uocatur: nam
 uulgus morbum regium uocant. Fit obstructo meatu, qui ad uentrem du-
 cit ex eo, qui ad fellis folliculum tendit. Suspiciatur enim, si quid in san-
 guine fuerit acrius factum, hoc per spirationem tenuem, ad iecoris ferti-
 uescam, quam fel appellamus, atque ex ipsa exuberatione facta, aliud ad
 uescam, aliud ad oculos, aliud ad superficiem totius corporis effundi,
 fortificandi corporis causa, seu per uim naturalem pergere: quo extra
 corpora atque debilia, ex hac materia admonitionem atque deformati-
 onem, & fellis egestionem atque exuberationem in se suscipiant.

Singultum uero inquit fieri, spiritus accepto in quasdam uocales ui-
 as, & decedente paulatim in uasculis, ubi frigidus liquor repositus est.
 sicut ex aqua uidemus uesiculas surgentes, descendente pluuia, atque
 stillicidio. Hydropem inquit fieri sanguinis corruptione per frigi-
 dum torporem. Feruore enim, naturale nutrimentum in sanguinem co-
 giæstimat: quo extincto, per morborum tarditatem supradicta materia
 inaquetur, destinata in sanguinis uentris substantiam: a cetero in loca
 uenarum, quæ periton membranae, & intestinis interiecta sunt, et diffu-
 so liquore obstrudentem hydropem nasci siue perfici ad tumorem totius
 corporis.

¶ Diuisam esse dicimus medicinam in partes quatuor. Re-
 gularem, quam Dietam uocamus. Manuum officium, quod Chirurgi-
 am uocamus. Medicamen, quod Pharmacia uocamus. Prænoscenti-
 am, quæ Prognosis dicimus. Corpus autem nostrum ex tredecim comi-
 xtionibus constat: neruis, uenis, renibus alternis, pinguedine, ossibus,
 unguibus, cartilagine, capillis, succo, sanguine, medullis, membranis.

Animæ regimen in corde consistit, quæ per subtilitatem spiritus semina-
 ta est per omnem corporis retentionem.

Digestionem inquit feruore fieri, & separatas esse corporis materias, Digestio.

C sanguinem in uenis contineri, spiritum in arterijs.

Sed pulmonem esse ueluti cellarium. spiritus ad arterias mittendi, seu replendi omnem corporis regionem, ex quo spiritum omnes nostri arcus commoueantur. Phreneticam passionem inquit fieri, tumore in corde suffecto, et suffocato sanguine, seu calore consuetudinario, ex quo cerebrum sensum & intellectum præbet. Aliud est enim, quod intelligitur, aliud quod sentitur.

Cerebra duo.

Sic itaque duo cerebra sunt in capite constituta. Vnum, quod intellectum dat. Aliud, quod sensum præbet: idque quod in dextra parte iacet, ab eo sentitur: a sinistro uero intelligitur: ob hoc sub ea parte subiacente corde, & semper uigilante, audiente, & intelligente: quia & aures habet ad audiendum. Quod

Præcordia.


& Præcordia habet uentris, id est, receptacula sanguinis, & spiritus singulis in partibus secundum aures, nunc ex ue-

D

nis promere sanguinem,
nunc ex arterijs
spiritum. Nam arteria
multum habet spiritum, &
modicum sanguinem. Vena autem
multum sanguinem, & modicum spiritum.

COCT. HORATIANI ad Filium
E V S E B I V M
Quarti LIB. Finis.

CVTILATIONES, ICTVS,
iactus, & uaria Vulnerum huma-
ni corporis indicia.



D E V M in cunctis præpone, & præponet ipse te: honora
eum, & honorabit te: time eum, & securus
cuncta experieris.





POST QVAM compleui uobis o Filij, librū hūc, qui est postremus scientię in medicina cum completō ipſius, & conſecutus ſum finem in eo, ex expoſitionibus eius, & ipſius declarationibus, uiſum eſt mihi, ut compleam ipſum uobis cū hoc Tractatu qui eſt pars operationis, id eſt, chirurgiæ cū manu. Quoniā operatio cum manu proſtrata eſt in regione noſtra, & tēpore no-

Appellat
Librum,
Tractatum.

ſtro priuata omnino: donec fortalſe perijt ſcientia eius, & abſciſſum eſt ueſtigium eius: & non remaſerunt ex ea, niſi deſcriptiones paruæ in libris antiquorū, quas mutauerūt manus: & accidit eis error & hæſitatio, donec clauſæ ſunt intentiones eius, & elongata eſt uis ipſius: Viſum eſt mihi, ut uiuificē eam cum ordinatione huius Tractatus in ea ſecundum uiam expoſitionis, & declarationis, et abbreviationis: et ut ueniam cum formis ferramentorum Cauterij, et reliquorum inſtrumentorum operis: cum ſit ex declarationis additione, & ex properatione eius quod eſt neceſſe. Cauſſa autem propter quam non inuenitur bonus arti-

B

ſex eius cum manu ſua in hoc noſtro tempore, eſt: quia ars medicinæ eſt longa, & oportet auctorem eius exercitari ante illud in ſcientia anatomię, quam narrauit Galenus, donec ſciat iuuamenta membrorum, & ipſorum formas, et eorum coniunctionem, & ſeparationem, et habeat cognitionem oſſium, & neruorum, et lacertorum, & numerum ipſorum, et eorum egreſſionem, & uenarum pulſatiliū, et quietarum, & locorū exitus earum. Et propter illud dixit Hippocrates, quod nomen cum nomine eſt multum, et cum opere eſt paucum, et præcipue in arte manus. Nos uero iam diximus de illo in introitu huius libri. Quoniam qui non eſt ſciens, quod diximus de anatomia, non euacuatur, quin iam cadat in errorem, quo interficiuntur homines: ſicut ego uidi multos ex illis, qui formantur de hac ſcientia, & iactant ſe de ea abſque ſcientia, et ſine experimento. Quod eſt, quia uidi medicum ſtolidum ſe cuiſſe apoſtema ſcrophuloſum in collo mulieris, et incidit quaſdam arterias in collo: quare fluxit ſanguis mulieris, donec cecidit mortua inter manus eius. Et uidi medicum alium, qui præſumpſit ut extraheret lapidem uiro, qui proceſſerat in ætate, & lapis erat magnus. Peruenit ergo ad eum, & extraxit ipſum cum fruſto ueſicæ. Quare mortuus eſt uir in tertio die. Et ego quidem iam uocatus fueram ad extrahendum ipſum: & uidi ex magnitudine lapidis, & diſpoſitione infirmi, quod moriretur. Et uidi medicum alium, qui accipiebat ſi pem apud quendam Ducem terræ noſtræ propter medicinam: et ac-

Chirurgico
ſcitu neceſſa-
ria.

Imperitiā
Chirurgico-
rū periculofa.

C cidit eunucho nigro, qui erat apud ipsum, fractura in crure eius prope calcaneum: et properauit medicus cum ignorantia sua, & strinxit fracturam super uulnus cum puluinaribus, & astellis strictura forti, et non dimisit uulneri expirationem. Deinde absoluit eum secundum delyderia sua. Postea dimisit eum diebus aliquot, et precepit ei, ne solueret ligamentum: et stetit sic donec apostematum est crus eius, & ipsius pes, et peruenit ad perditionem. Vocatus sum ergo ad eum: & properaui ad soluendum ligamentum: et consecuta est tranquillitas, et euasit a doloribus suis. Verumtamen corruptio iam confirmata erat in membro: et non potui refrenare ipsam. Non ergo cessauit corruptio perambulare in membro, donec perijt. Et uidi medicum alium, qui perforauit apostema cancrosum: & ulceratum est post dies, donec magnificata est malicia eius cum domino ipsius. Quod est, quia quando est cancer purus ex humore melancholico, tunc non oportet ut perueniatur ad eum cum ferro omnino, nisi sit in membro quod toleret, ut abscindatur totum eius. Et propter illud o Filij, necesse est uobis, ut sciatis, quod operatio cum manu diuiditur in duas diuisiones: scilicet, operationem cui associatur salus: et operationem, cum qua est periculum in pluribus dispositionibus. Et ego iam excitaui in omni loco huius libri, in quo uenit operatio, in qua est terror & timor. Quare necesse est uobis, ut caueatis illud, & dimittatis ipsum: ut non inueniant stolidi uiam ad loquendum, et dehonestandum.

D Accipite ergo mensuram cum sollicitudine & protectione, et infirmos uestros cum facilitate & firmitudine, et utimini uia meliore perducente gratia Dei ad salutem & successionem laudabilem: et dimittite aggritudines terribiles difficilis sanationis: & tollite animas uestras ab eo quod facit uos timere, ut ingrediatur super uos hesitatio in fide uestra & commodo uestro. Est enim magis remanens ad gloriam uestram, et sublimius in mundo isto, et postremo ad quantitates uestras. Galenus enim iam dixit in quibusdam suis admonitionibus. Non medicetis aggritudinem malam: ne nominemini medici mali. Iam autem diuisi hunc Tractatum secundum tria Capitula.

Admonitio
salubris.

Partitio Libri.

¶ Capitulum primum. De Cauterio cum igne, et Cauterio cum medicina acuta, capitulum, & ordinatum a capite usque ad pedes, et formis instrumentorum, & ferramentis Cauterij: et omni quod necessarium est in operatione.

¶ Capitulum secundum. De sectione & perforatione, phlebotomia & uentosis, et uulneribus: et extractione sagittarum, et similibus illius: & totum capitulum, ordinatum formis instrumentorum.

¶ Capitulum tertium. De restauratione, & dislocatione, et curatione torsionis, & similibus illius: capitulum, ordinatum a capite usque ad pedes, & formis instrumentorum.



¶ De Iuuamento, & Nocumento Cauterij: & quibus cōplexionibus cōueniat. et quo tēpore: & si cum ferro, uel auro. Caput I.

ED ANTE QUIDEM QVAM rememorer operationis cum eo, oportet ut dicam qualitatem iuuamentorum eius, & Nocumentorū ipsius: & in qua complexione exhibeatur. Dico ergo, quod sermo de qualitate iuuamenti Cauterij, & nocumenti eius, est sermo prolixus, & subtilis, scientia, & secretum occultum. Etiam locuta fuit in eo multitudo sapientum, & dissenserunt in eo: & mihi quidem sufficit parum ex sermonibus eorum, timens prolongationem. Dico ergo, quod Cauterium confert uniuersaliter omni complexioni, quę est cū materia, et absq; materia: exceptis duabus complexionibus, quę sunt complexio calida absq; materia, & complexio sicca absque materia. In complexione autem calida & sicca cum materia dissenserunt. Quidam enim dixerūt, quod Cauterium iuuatiuum est in ea. Et dixerunt alij contrarium illius, scilicet quod Cauterium non est conueniens in ægritudine, quę est ex caliditate & siccitate: quoniam natura ignis est caliditas: & inconueniens est, ut sanetur ex ægritudine calida & sicca, cum calido & sicco. Et dixit ille qui dicit contrarium illius: quod per Cauterium fit iuuamentum in omni ægritudine calida & sicca, quę accidit in corporibus hominum: quoniam quando tu comparas corpus hominis, & humiditates eius, ad complexionem ignis, inuenis corpus hominis frigidum. Et ego quidem dico per sermonē eius: quia experimentum iam detexit mihi illud aliquotiens. Verumtamen non oportet, ut ueniat super illud, nisi qui iam probatus est, & exercitatus in capitulo Cauterij exercitio ultimo, & cognouit diuersitatem complexionum hominum, & dispositionem ægritudinum in se ipsis, et causas earum; & accidentia ipsarum, et spacium temporis earum. Ex reliquis autē complexionibus non est super uos timor: et præcipue in ægritudinibus frigidis & humidis. Iam enim cōueniunt omnes medici super eas: et non dissenserunt in iuuamento cum Cauterio in eis.

Et scitote filij, quod ex secreto curationis per Cauterium cum igne, & bonitate eius super Cauterium cum medicina comburente est: quoniam ignis est simplex, cuius actio non peruenit, nisi ad membrum quod cauterisatur: & non nocet membro alio coniuncto cum eo, nisi nocumento paruo. Medicinæ uero comburētis actio peruenit ad illud quod elongatur ex mēbris: et fortasse facit accidere in membro ægritudinem difficilis sanationis, et fortasse interficit. Ignis autē propter subtilitatem suā & bonitatem substantię suę, non facit illud, nisi superfluat. Iam uero innotuit nobis illud per experimentū, propter longitudinē seruitutis & studij cū

Cauterij, cui complexioni cōueniat.

B

C arte, & stationē super ueritatē rerū: et propter illud excusor a longitudine sermonis. Et si non esset, quia nō licet huic libro meo, afferrem uobis secretum occultū in igne, et qualitātē operationis eius in corporibus expulsiōis suæ, qua expellit ægritudines sermone philosophico demonstratio, qui acueretur a mētibus uestris. Et scitote filij, quod ipsi sentiunt in tempore, in quo cōuenit fieri cauteriū, et ponunt melius tempus ueris. Et ego dico, quod cauterium cōuenit in omni tempore: propterea, quod nocumētum accidens propter tempus submergitur in iuuamento, quod attrahitur cum cauterio. Et præcipue si cauteriū est propter dolores ex doloribus necessarijs, fortibus, festinis, qui non tolerant tarditatē: propterea quod timetur ex eis, qđ accadat malicia quæ est maior, quam paruum nocumētū intrans propter tempus. Et nō cadat in mentibus uestris o filij illud, quod non extimant, nisi uulgus & stolidi medici, scilicet quod illi ægritudini quæ sanatur per cauterium, non est reditio semper: et ponunt illud consequens, et res non est sicut putant: propterea quod cauteriū non est, nisi ioco medicinæ, quæ alterat cōplexionē, & exiccat humiditatē quæ sunt causæ, quare accidunt dolores. Verūtamen cauterium superfluit super medicinā per uelocitatem ualitudinis suæ, & uirtutem suæ operationis, et uehementiā dominij sui: & possibile est, ut redeat ægritudo hora aliqua temporis secundū complexionem infirmi, & locationē ægritudinis suæ, & uirtutem eius: & quod preparatur in corpore eius ex aggregatione superfluitatū in eo: & quod peruenit ad ipsum in acquisitiōe sua ex cibis, & similibus illis ex causis, nisi sit ægritudo, in qua administratur cauterium. Ægritudo subtilis in membro paucarū superfluitatum, et humiditatū, sicut cauterium dentis, propter dolorem, et similia illi, possibile est enim, ut non redeat in eo ille dolor. Sed illud fit in paucis. At uero sermo uulgi iterum, quod cauterium est postremū medicinæ, est sermo rectus: non ad illud quod ipsi intendunt in illo: quoniā ipsi credunt, quod non est curatio quæ conferat cum medicina, necq; cum alio post occasum cauterij. Res autē est contrario illius, & intentio, quod cauteriū est postremū medicinæ, non est, nisi quod quando nos administramus modos curationis in aliqua ægritudinē, & non conferunt illæ medicinæ: deinde administramus in fine rei cauteriū, & confert: tunc inde cadit, quod cauterium est postremum medicinæ, non secundū intentionem quam intelligunt uulgus & multi stolidorū medicorum. Antiqui autē dixerunt, quod cauterium cum auro est melius, quam cauteriū cum ferro: & non dixerūt illud, nisi propter æqualitatem auri, & sublimitatē substantiæ suæ: & dixerunt, quod non facit pus locus cauterij. Verum non est illud absolute: quoniā ego iam probaui illud, & inueni, quod ipsum non facit illud in quibusdam corporibus absq; alijs. Et cauteriū cum ipso est bonum, et melius quam cum ferro, sicut dixerunt. Verūtamen quādo tu ignis cauterium in igne

Cauterizandi
tempus.

Cauterium
postremum
medicinæ.

Cauterium
cum auro
præstat.

ex auro, nō declaratur tibi, quando igitur secundū quantitatem quam A
uis, propter rubedinē auri: & quando properat ad ipsum frigus; & si ad
dis super ipsum ignitionē, liquefit in igne, et uertitur in laminas. Quare
cadit artifex ex illo in occupationem: & propter illud fit Cauteriū cum
ferro apud nos uelocius & propinquius, ex rectitudine ad operatiōem.
Et ego quidem iam ordinaui hoc Capitulum in Cauterio, secundum ca-
pitula: & ordinaui ea a capite usq; ad pedes: ut alleuiet quærenti illud
quod uult ex eo.

¶ De modo cauterizandi Caput in commissu-
ra coronali. Caput II.

C O N F E R T hic cauterizatio ad dominiū humiditatis & fri-
giditytis super cerebrum: quæ duæ sunt causæ sodæ, et multitudinis flu- Soda.
xus humorū ex capite ad partes oculorum & auriū, et multitudinis so-
mni, & doloris dentiū, et doloris gutturis: & uniuersaliter omnis ægritu-
dinis, quæ accidit ex frigidityte, sicut paralisis, & sodæ, epilepsie, et apo-
plexia, et similia illis ex ægritudinibus. Modus cauterizationis est, ut
præcipias infirmo: ut euacuetur in primis cum medicina solutiua mun-
dificante caput tribus noctibus, aut quatuor, secundum quod exigit uir-
tus infirmi, & eius ætas, et consuetudo eius. Deinde præcipe ei, ut radi fa- B
ciat caput suū cum nouacula. Deinde fac eum sedere inter manus tuas
quadratiū, ita quod iam posuit manus suas super pectus suū. Deinde po-
ne radicem palmæ tuæ super radicem nasi sui inter oculos suos. Vbi-
cumq; ergo peruenerit digitus tuus medius, signa locum illum cum in-
causto. Deinde igni Cauterium Oliuare: cuius hæc est forma.




Cauterium
oliuare.

Deinde pone ipsum super locum signatum cum incausto, descensione,
qua constringatur manus tua paulatim, & tu reuolues ipsum. Deinde
leua manū tuam uelociter, & aspicias locum. Quod si uides iam detegi
ex osse quantitatem capitis alkiel, aut quantitatem zeuherbi, tunc eleua ma-
num tuam. Et si non, itera manū tuam ferro ipso, aut cum alio ab ipso si
infrigidatur: donec uideantur ossa, quæ dixi tibi. Deinde sume aliquid
ex sale, & solue illud in aqua, et imbebe in ipso cotum, & pone super lo-
cum: et dimitte ipsum tribus diebus. Deinde pone super ipsum cotū im-
bibitum in butyro, & dimitte illū super locum, donec destruaturs escha-
ra ignis. Deinde cura illud cum unguento tetrapharmacon, usquequo
sanetur. Iam dixerunt, quod quanto uulnus plus remanet apertū, emit-
tit pus: quare est melius & magis iuuatiuum. Et dixerunt quidam eo-
rum, ut cauterizetur cutis usq; ad os: & teneatur Cauterium, donec ad-

Curatur quiddam spissitudinis ossis. Deinde radatur post illud quod ad-
 ustum est ex osse, deinde curetur. Et dicunt alij, quod oportet ut cū cau-
 terio perueniatur ad ultimum, donec imprimat in os impressionem for-
 tem, ita quod cadat os, quod fit sicut forma kirate: aut instrumētū quod
 mulieres ponūt infuso alphabeti parui: & extimant, quod expirantur
 ex hoc loco uapores capitis, & dimittatur uulnus apertum tempore lon-
 go. Deinde curetur, donec consolidetur. Mihi autē non uidentur hæc
 duæ species Cauterij omnino nisi in quibusdam hominibus secundum
 uiam timoris. Et dimittere ipsum, apud me est melius cum salute ipsi-
 us. Debilitatur enim caput ex solutione continuitatis ipsius natura-
lis: sicut testificari sumus in reliquis membris: & precipue quando caput
infirmi debile est natura: & species quidē Cauterij prima est magis sal-
ua & melior apud me, & ea utor: operare ergo cum ea in salute.

Q De modo cauterizandi capitis in dolore to-
 tius capitis. Caput III.
D V A N D O in toto Capite accidit dolor chronicus: et prolon-
 gatur illud in infirmo, & utitur hyeris, et cochis, & caput-
 purgijs, & oleis, et emplumatis. Et precipue si iam cauterizatu est cau-
 terio uno, quod narrauimus, et non confert ei aliquid ex illis: tunc con-
 sidera. Nam si caput infirmi est fortis creationis natura, et nō est debile,
 & inuenit frigus uehemens: tunc cauteriza cum cautērio alio sub illo pa-
 rum. Deinde cauteriza ipsum super omne cornu capitis sui cautērio, do-
 nec pertranseat cutis, et discooperiatur ex osse quantitas, quam narraui-
 mus. Et cauteriza ipsum cautērio uno in occipitio capitis sui, in loco qui
 nominatur uas: et est locus in quo ponitur uentosa: & eleuatum tu-
 am in hoc, et non discooperias os. Infirmus enim inuenit propter illud
dolorem uehementem, et diuersum a dolore reliquorū cautēriorum ca-
pitis omniū. Et ego dicam hoc Cauteriu in loco suo: et oportet quod sit
 cautēriu, quo cauterizantur cornua capitis, et occiput eius subtilius cau-
 terio, quo cauterizatur mediū capitis, et hæc est forma eius.

Vas capitis.



Q De modo cauterizandi in hemisrania, tam cum medi-
 cina adustiuā, quam cum ferro. Caput IIII.
V A N D O accidit in parte capitis dolor & soda, aut extēditur
 dolor usq; ad oculum, & euacuatur cū medicinis mundifi-
 cantibus caput, et administratur reliqua curatio, quam dixi in diuisioni-
 bus ægritudinū, et non confert illud totū: tunc cauterizatio in eo est se-
 cundum duos modos: aut cauterizatio cū medicina acuta comburente:
 aut cum ferro. Cauterium autē cū medicina acuta comburente, est,

ut accipias dentē unum alliij, & excortices ipsum, et abscondas extremita- **A**
 tes eius ex duobus lateribus. Deinde scinde locum doloris in tempore
 cum phlebotomo lato, donec fiat in eo locus sub cute, in quo dens capi-
 atur. Intro mitte ergo eum in ipso sub cute, donec occultet: deinde strin-
 ge super ipsum cū puluillo constrictione decenti, et dimitte ipsum quan-
 titate quindecim horarū: deinde solue eum, & extrahe allium, & dimitte
 uulnus duobus diebus, aut tribus: postea pone super ipsum cotum sub-
 mersum in butyro, donec locus efficiat pus: deinde cura ipsum cum un-
 guento usquequo sanetur. Et si uis fac illud cum quibusdam medicinis
 comburentibus, quas ego scripsi in tractatu duodecimo, de Medicinis
 adurentibus. Cauterizatio uero eius cum ferro, est secundum hunc
 modum. Igni Cauterium, cuius forma hæc est. Et nominatur Clauilis:
 quoniā forma capitis eius est sicut forma clauis, in quo est quiddam cur-
 uitas, & in medio eius est quedam eminentia parua.



Cauterium
Clauile.

Deinde pone ipsum super locum, & retine manum tuam: & tu reuolue
 ferrum paulatim cum uelocitate: et sit quantitas quæ aduritur ex spissitu-
 dine cutis, sicut medietas eius. Et eleua manū tuam, ut non aduratur ar-
 teria, quæ est inferius, et accidat fluxus sanguinis. Deinde imbebe cotum **B**
 in aqua salis, & pone super locum, et dimitte ipsum tribus diebus: dein-
 de pone cotum cum butyro: postea cura cum unguento usquequo sane-
 tur. Et si uis, cauteriza hanc hemisphæricam cum extremitate cultellari se-
 cunda Cauterij. Et caue ab incisione arteriæ in hac hemisphæria, non an-
 tiqua proprie.

¶ De modo cauterizandi in hemisphæria
 antiqua. Caput v.


QUANDO curas hemisphæricam, cum eo quod diximus ex cui-
 ratione præcedente, & quod diximus in diuisionibus agri-
 tudinū, et non confert curatio: & uides ex agitudine, quod non sufficit
 ei quod diximus ex cauterio primo cū medicina, aut cum cauterio cum
 igne, tunc oportet ut ignias Cauterium cultellare, donec albificetur post-
 quam signas super locum doloris cum linea, cuius longitudo sit medie-
 tas digiti, aut quasi illud: & depone manū tuam uice una, et stringe eam
 donec incidas arteriam, & peruenias usque ad os. Verumtamen necesse
 est tibi, ut caueas a continuatione mandibulæ, quæ mouetur apud ma-
 sticationem, ne aduratur latus, aut neruus qui mouet ipsam, unde acci-
 dat spasmus. Et esto super custodiam, & cautelam de fluxu sanguinis ar-
 teriæ, quæ absca est. In abscaione enim eius est timor, & præcipue ei
 qui ignorat illud quod facit, & non est studiosus, nec expertus: & di-
 mittit operationem cum eo in primis. Et ego ueniam cum rememora-

C tione regiminis fluxus sanguinis accidentis ex arteria secundum modum suum, & in loco suo huius libri. Quod si uides ex ægritudine, quod non sufficit ei hoc Cauteriū, & uides corpus infirmi tolerans cauterium in medio capitis, sicut narrauimus, cura uulnus, donec sanetur. Et si uis, administra Cauterium, quod diximus in capitulo extractionis arteriæ cum Cauterio habente duos cultellos. Est enim cauterizatio melior hac, & magis conferens.

¶ De modo cauterizandi in dolore Auriū. Cap. VI.

Q V A N D O accidit in Aure dolor a frigore, et curatur cum solutiuo, & reliqua curatione quam diximus in diuisione, et non renouetur dolor, tunc igni Cauterium: & est illud quod nominatur Punctum, cuius forma est hæc.

Cauterium
Punctum.



D Deinde puncta cum eo post eius ignitionem in circumitu auris totius, sicut reuoluitur: aut in circumitu utriusq;, si simul dolor est in utrisq;. Et elonga te cum Cauterio a radice auris parumper, postquam signaueris loca cum encaustro: & sit cauterij quantitas decem punctorum in omni aure, & quasi illa. Deinde cura loca, donec sanentur.

¶ De modo cauterizandi in Tortura. Caput VII.

T O R T V R A quæ curatur cum cauterizatione, non est nisi ex speciebus, quæ accidunt ex phlegmate, secundū quod diximus in diuisionibus ægritudinū. Et deuita cauterizationem speciei, quæ accidit ex exiccatione, et spasmo nerui. Quando curas hanc spem torturæ cum hyeris, & caputpurgijs, et gargarismis, & non confert curatio tua, tunc oportet ut cauterizes infirmū tribus Cauterij: uno apud radicem auris, et secundo parum inferius a tempore suo, & tertio apud coniunctionē duorum labiorum. Et pone Cauterium tuū ex contrario partis infirmæ. quoniā mollificatio non accidit, nisi in parte quæ apparet sana. Et forma cauterizationis est, ut cauterizes ipsum Cauterio in directo extremitatis auris superioris sub cornu capitis parum: et alio in tempore: cuius longitudo sit secundū longitudinem pollicis. Et depone manū tuam cum cauterio, donec comburatur quantitas medietatis spissitudinis cutis. Et hæc est forma Cauterij, & est species ex cultellari, quæ



ius forma præmissa est: uerū tamen non est subtilior ea parum, sicut uis A
des: & oportet ut sit cuticellus in eo superflue grossitudinis parum. De
inde cura loca, cum eo quod præcessit: donec sanetur.

Q De modo cauterizandi in Apoplexia
antiqua. Caput VIII.

V A N D O antiquatur Apoplexia, & curas eam cum eo quod
diximus, & non confert medicatio tua, & infirmus non ha
bet febrem, tunc cauteriza eum quatuor cauterijs super omne cornu ca
pitis sui, & cauterio in medio capitis, sicut diximus, & cauterio in occi
pitiū capitis, secundum quod præcessit: & modus cauterij sit secundum
quod præcessit. Etiam cauterizatur cum Cauterio super os stomachi: et
est magis ultimum. deinde curetur, cum eo quod præcessit.

De modo cauterizandi in Obluione. Caput IX.

O P O R T E T ut in potu dentur in primis infirmo hyeræ ma
gnæ, & pillulæ mundificantes cerebrum. Deinde rade caput in
firmitotum, & pone super occipitiū eius emplastrum de sy
napi descriptum in tractatu emplastrorum: & pone ipsum aliquotiens.
Ipsū namq; est modus Cauterij: & fac illud secundum ordinem eun
dem, quē dixi illic. Si ergo sanatur per illud, bonum est. Si non: tunc B
fac ei cauteria tria in posteriori parte capitis sui, quæ sint descendētia a
superiori parte capitis usq; ad inferiorem partem oculi: & pone inter o
mne cauterium grossitudinem digiti. Deinde cura Cauterium, cum eo
quod præcessit. Si autem uis additionem, & infirmus est tolerans il
lud: tunc fac ei Cauterium in medio. Quod si uis additionem: tunc cau
teriza ipsum super duo cornua. Deinde cura ipsum, donec sanetur: sitq;
Cauterium oliuare secundum formam, quæ præmissa est.

O De modo cauterizandi in Paralysi, & mol
lificatione. Caput X.


P O R T E T ut procedas in mundificatione capitis cum hye
ris, & cum eo quod diximus. Deinde rade caput infirmi: postea caute
riza ipsum cauterio in medio capitis, & cauterio super omne cornu capi
tis, & cauterio super posterius ipsius, & tribus super spondiles colli.

Si autem indiges in ægritudine mollificatione corporis pluribus il
lis, & infirmus est tolerans, & ægritudo est fortis: tunc cauteriza ipsum
quatuor cauterijs super spondiles dorsi, & ultima cum cauterio, donec
comburatur ex cute plurimum eius, & eleua manum tuam. Deinde cu
ra ipsum, donec sanetur: & sic cauterium Oliuare.

De modo cauterizandi in Epilepsia. Caput XI.

N O N C A uerizatur epilepticus, nisi ille cuius epilepsia est ex
phlegmate. Oportet ergo ut mundifices cerebrum eius in pri
mis cum hyeris, & cum reliqua curatione quā diximus in diui

C sione: quando infirmus est magnus, aut est tolerans in acceptione medicinarum. Si aut est puer, qui non tolerat medicinas, tunc administratur gargarisma, et masticationes mundificantes cerebrum, ante illud diebus multis cum bonificatione ciborum. Deinde rade caput eius, postea cauteriza ipsum Cauterio uno in medio capitis, secundum quod præcessit in modo: et cauterio alio in occipitio eius, & super omne cornu capitis sui cauterio. Quod si infirmus fuerit fortis, et fuerit tolerans, tunc cauteriza ipsum cauterijs, quæ dixi in habente paralysim, & mollificationem corporis super spondiles colli, & spondiles dorsi: & sit Cauterium oliuare secundum modum qui præcessit. Si autem infirmus est puer, tunc pone cauterium subtile, secundum hunc modum.



¶ De modo cauterizandi in Melancholia. Caput XII.

Q V A N D O causa melancholiæ sunt humiditates corruptæ, & phlegma grossū, tūc cauteriza ipm Cauterijs, quæ diximus in habere paralysim. Et si causa melancholiæ est superfluitas decliuis ad melancholiā, & est corpus infirmi humidū, tunc da ei in potu qd mundificet cerebrum eius, secundū quod præcessit in diuisione: deinde rade caput infirmi, et fac postea tortellam decenter faciam ex lino, sicut circumlum. Deinde pone ipsam in medio capitis: et infirmus sedens quadratus teneatur ab omni parte. Deinde presenta linimentum. Et est dignius ex butyro ouium antiquo. Et calefac ipsum super ignē calefactione temperata mensura, quā toleret digitus, quando intromittitur in ipsum. Deinde euacua ipsum in medio capitis eius ī circulo, et dimitte ipsum donec infrigidetur. Fac illud infirmo omni hebdomada semel, cū reliquo regimine eius bono, donec sanet. Aut si uis, cauteriza ipsum faciendo puncta parua plurimū eius, præter quod teneas manū cum cauterio: imo sit odorando. Hæc enim species cauterij humidat cerebrū cum qualitate. Deinde pone super ipsum cotū imbibitū in butyro, aut adipe gallinæ.

¶ De modo cauterizandi in aqua descendente ad oculum. Caput XIII.

Q V A N D O declarat tibi principiū aque in oculo per signa, quæ dixi in diuisione, tunc incipe & porta infirmū, cum eo quod mundificet caput eius. Et custodi ipsum ab oibus humiditatibus, & fac eum sedere in balneo, in ieiunio diebus aliquot. Deinde præcipe ei, ut rade caput suum, & cauteriza ipsum in medio capitis sui. Deinde cauteriza ipsum super duo tempora duobus cauterijs, si est inceptio descendus aquæ in duobus oculis simul: aut ex latere uno, si est inceptio aquæ in oculo uno: & abscinde cum cauterio omnes uenas & arterias quæ sunt sub cute: & sint cauteria in ea longa in latitudine temporum: & ca-


ue a fluxu sanguinis. Quod si uides aliquid ex eo, tunc abscinde eum **A**
statim cum quacumq; medicina est possibile: & ego ueniam cum sapi-
entia, quæ est in extractione arteriarum, et abscissione earum, & cautela
a fluxu sanguinis. Et quandoq; cauterizatur in ceruice, sub duobus ossi-
bus, duobus cauterijs ultime productis.

Q De modo cauterizandi in Lachrymis anti-
quis. Caput XIII.
V A N D O lachrymæ oculorū sunt antiquæ, assidue: et sunt su-
per uenas, & arterias quæ sunt in manifesto capitis exterius,
uerificatur qđ illud est ex superfluitatib. frigidis, phlegmaticis: tunc
cauteriza cauterio eodem quod narraui in inceptioe aquæ descenden-
tis, cauterio in medio capitis, et duobus cauterijs super duo tempora, &
duobus cauterijs in ceruice sub duobus ossibus. Et si indiges additione,
tunc cauteriza ipsum in omni latere caute oculi, super extremitatem su-
percilij cum cauterio paruo.

Q De modo cauterizandi in fœtore Nasi. Cap. xv.
V A N D O tu medicaris illud, cū eo quod diximus in diuersio-
ne, et non cōfert medicatio: tunc propera, & da in potu infirmo
cochias tribus noctibus: deinde rade caput eius, et cauteriza i- **B**
psum cauterio medio, cū cauterio oliuari. Deinde cauteriza
ipsum cū cauterio clauili duobus cauterijs, super duo supercilia sub ca-
pillis parum. Et custodi te ab arteria, ne incidas eam. Et hæc est forma
cauterij Clauilis.




Q De modo cauterizandi in mollificatione
Palpebræ. Caput xvi.
V A N D O mollificatur Palpebra oculi ab ægritudine, aut hu-
miditate: tunc cauteriza Palpebram cauterio uno, cum hoc
cauterio lunari. Et si uis, cauteriza ipsum supra duo supercilia parum
duobus cauterijs in omni parte: & elongentur a duobus temporibus:
& sit longitudo omnis cauterij, secundum longitudines supercilij: et non
ultimes manū tuam cū cauterio, imo scđm quantitatem qđ adurit ter-
tia palpebræ. et hæc est forma cauterij scđm hūc modū cauterij lunaris.



C De modo cauterizandi Palpebram cum pili inuersan-
tur pungentes oculum. Caput xvii.
A V T E R I V M in eo est secundū duos modos: aut caute-
rium cum igne: aut cauteriū cum medicina comburente. In cauterio autē

Cum igne, præcipe infirmo ante illud, ut dimittat pilos suos, si est ex illis qui mundant eos, donec prolongetur & æquentur. Si autem pungunt eum apud ortū suum: tunc constringe oculos eius cum uitta, ut non moueantur, donec nascantur. Cum ergo nascuntur & equantur, tunc pone caput infirmi in sinu tuo: deinde signa super Palpebram oculorum eius cū encaustro, signo quod sit secundū figuram folij myrti: et sit principium signi prope pilos. Deinde pone cotū imbibitum in albumine oui: aut in mucilagine psilij sup oculū. deinde igni cauteriū, cuius forma est hæc.



Deinde cauteriza super figurā, quam signasti paulatim in uicibus multis, donec cōburatur superficies cutis, quæ est sicut figura folij myrti, totam apparentē proprie. Et signū sanitatis operis tui est: ut si uideas Palpebram oculi iam contrahi, et pilos eleuari apud puncturā oculi. Eleua ergo manū tuam tunc: et dimitte ipsum tribus diebus. Deinde pone super ipsum Cotum cum butyro, donec eradicetur eschara. Deinde cura ipsum cum unguento, donec sanetur. Quod si redeat aliquod ex pilis post horam, & mollificetur palpebra: tunc itera Cauterium super illud locum, sicut fecisti in primis. Si autem pili sunt in inferiori: tunc cauteriza ipsam, donec eleuetur ad locum suum naturalem: & æquetur ut non pungant pili oculum.

E De modo cauterizandi cum medicina comburente in eodem casu. Caput XVIII.

S T V T præcipias infirmo, ut dimittat pilos, donec prolōgentur & æquentur. Fac ex charta de panno formam folij myrti. Deinde accipe ex sapone cognito, & ex calce non imbibita ex unoquoque pondus unc. i. aut quasi illud: deinde tere ea simul contritione bona, & fac illud cum festinatione, ut non infrigidetur. Deinde expande ex eo super chartam quā fecisti sicut formā folij myrti, & pone ipsum super palpebram oculi unius, aut duorum. Et pone sub oculo cotum imbibitū in albumine oui: & caput infirmi sit in sinu tuo. Et pone digitum tuū indicem super medicinā, & preme ipsum parumper. Et tu moueas ipsum quotiens sentit infirmus mordicationē medicinæ: quoniā inuenit eius mordicatio sicut ignis. Dum ergo perseverat hoc quod ipse inuenit mordicatio, tunc dimitte medicinā, & moue ipsam cum digito tuo. Cum ergo quiescit mordicatio, tunc remoue medicinā, & ablue oculū cum aqua. Et considera tunc, si uides palpebram eleuari, sicut eleuatur apud contractionē cum igne, aut cum incisione, est bene: & si non, tunc itera super ipsam ex medicina super locū, in quo non imprimit medicina, & non de nigrat, donec æquet operatio tua, et cōtrahat oculus. Deinde pone super


ipsum Cotum cum butyro, donec eradicetur cutis adustionis. Deinde **A**
cura ipsum cum unguento diaphinicon, aut alio, donec sanetur. Et ne-
cesse est tibi apud operationem, ut custodias ultima custodia, ne in oculo
lum cadat aliquid ex medicina. Quod si mollificatur palpebra post
dies, & pugnat ex capillis aliquid in oculo, tunc iterum medicinam super
illum locum, qui mollificatur ex palpebra proprie, sicut fecisti in primis.
Deinde cura ipsum, donec sanetur, Et hæc est forma folij myrti.



Forma folij
Myrti.

Et scias, quod oculi hominū diuersificantur in magnitudine, et paruitate. Ergo secundum illud sit consideratio tua: & non occultatur uia rectitudinis illi, cui est studium de hac arte.


Q De modo cauterizandi in Fistula lachrymali. Caput XIX.
V A N D O curas Fistulam, cum eo quod diximus in diuisionibus ægritudinum, & non confert curatio tua: tunc, oportet ut cauterizes ipsam secundum hunc modum. Præcipe infirmo, ut ponat caput suum in sinu tuo, & teneat caput eius minister inter manus suas taliter, ut non moueatur, neque agitetur cum capite suo. Deinde pone Cotum infusum in albugine oui, aut in mucilagine psylli super oculum eius: deinde igni Cauterium, cuius formā est hæc.



Sit concauum, sicut forma cannæ pennæ uulturis ab extremitate una, cum qua fit Cauterium: & si uis sit penetrans usque ad extremitatem aliam, & si uis sit sursum sic tenta. Verumtamen hoc concauum est melius ad opus tuum. Deinde exprime fistulam, si est aperta, et extrahe ex ea saniem, & exicca ipsam: et si non est aperta, tunc aperi eam, & extrahe pus eius. Deinde pone tunc super eam Cauterium, quod sit ignitum ualde. Et tene cum eo manum tuam parumper apud Cauterium ab oculo, ad partem nasi, ut non erret manus tua, aut inquietetur infirmus: & ponas Cauterium in adipe oculi, et corrumpas ipsum. Si ergo peruenis in principio Cauterij tui usque ad os, erit bene. Et si non: tunc iterum Cauterium semel, aut bis, si indiges illo: & dimitte illud tribus diebus. Deinde pone Cotum cum butyro, & cura ipsum cum unguento exiccatio, donec sanetur. Quod si præterierint ei quadraginta dies, & non sanatur: tunc pone super ipsum medicinam acutam corrosiuam, donec detegatur os: & rade ipsum secundum quod uenit in capitulo suo. Et est modus a-

Clius Cauterij fistulæ, quæ quidam primi dixerunt. Intende ad locum fistulæ, & finde ipsum: deinde pone in ipsam fissuram camahan subtile, id est, Cannulam subtilem, cuius forma hæc est.

Cannula.



Et funde in ipsum quantitatem drachmæ ex plumbo liquefacto, & tene manum tuam cum Canna retentione bona, & non moueatur infirmus omnino, ut nō currat, uel perueniat plumbum liquefactum ad oculum eius. Et oportet ut ponas super oculum infirmi cotum infusum in albimine oui, aut in aqua. plumbum enim comburit locum fistulæ, & sanat ipsam sanatione mirabili. Quod si sanatur fistula, cum eo quod diximus ex Cauterio, & curatione, est bonum. Et si non, tunc necesse est administrare foramen nasi, & reducere fistulam ad cursum nasi, secundum quod ueniet in loco suo sibi proprio.

¶ De modo cauterizandi in fissuris Labiorum. Caput xx.

Pili labiorum.

MVLTOTIENS accidunt in Labio fissuræ, quæ noiantur Pili, et præcipue in labijs puerorū. Cum ergo tu curas has fissuras, cum eo qd diximus in diuisione ægritudinū, et non confert curatio, tunc igni cauterium paruū cultellare, secundum hanc formā.

Cauterium Cultellare.



Et sit concauitas eius secundum subtilitatem cultelli. Deinde pone ipsum ignitum festinanter in ipsis fissuris, donec perueniat cauteriū ad profundum fissurarum. Deinde cura ipsum cum cæroto, donec sanetur.

¶ De modo cauterizandi in fistula Oris. Caput xxi.

QVANDO accidit apostema in radice gingiuarum, aut in palato, aut in radicibus dentium: deinde facit pus, & rumpitur: postea antiquatur, et currit pus, et fit fistula: deinde curas ipsam, et non confert in ea curatio, tunc oportet ut ignias cauterium secundum quantitatem, quod capiat in fistula. Deinde intromitte ipsum ignitum in foramine fistulæ, & tene manū tuam, donec perueniat ferrū ignitum ad profundū eius, et ultimū eius: fac illud semel, aut duabus uicibus. Deinde cura ipsum post illud, cū eo quod diximus de curatione usquequo curet. Si ergo abscinditur sanies, et sanat, erit bonū. Et si nō, tunc necesse est detegere locū, et auferre os corruptum scdm qd ueniet in capite suo.

¶ De modo cauterizandi in Gingiuis, et Dentibus
mollificatis. Caput XXII.

A

Q V A N D O mollificat gingiua propter humiditates, & mouen-
tur dentes, & curas eam cū medicinis, et non confert: tunc
pone caput infirmi in sinu tuo. Deinde igni cauteriū, cuius forma uenit
et post hæc, ita ut ponas Cannulā super dentem: & intromitte in ea Cau-
terium ignitum festinanter: & tene manum tuam parumper, donec sen-
tias infirmus calorem ignis iam peruenisse ad radicem dentis. Et eleua
manum tuam: deinde itera Cauterium aliquotiens, secūdum quod uis.
Deinde impleat infirmus os suum aqua salis, & teneat ipsam hora una:
& exspuat ipsam. Dens em̄ motus firmatur, & gingiua mollificata strin-
gitur, et siccatur humiditas corrūpta.


¶ De modo cauterizandi in dolore Den-
tium. Caput XXIII.

Q V A N D O dolor dentis est propter frigiditatem, aut in ipso
est frigus, aut uermis, & non confert curatio cū medicinis: tunc
Cauterium in ipso est secūdū duos modos: aut Cauteriū cum
butyro: aut cauteriū cum igne. Cauterium aut̄ eius cum bu-
tyro est, ut accipias butyrū uaccinū, et bullias ipsum in cochleari ferreo,
aut in uenera. Deinde accipe cotū, et inuolue ipsum super extremitatem
tenet. Deinde submerge ipsum in butyro bullito: et pone ip̄m super den-
tem dolorosum festinanter, & tene ipsum donec infrigidet: deinde itera
ip̄m aliquotiens, donec perueniat uirtus ignis ad radicē dentis. Et si uis,
submerge lanā, aut cotū in butyro frigido, et pone ip̄m super dentē do-
lentē: et pone super ipsum ferrum ignitū, donec perueniat ignis ad pro-
fundū concauitatis dentis. Cauterizatio aut̄ eius cū igne est, ut inten-
das ad cannulā æris, aut cannulā ferri. Et sit in corpore eius quiddā gros-
situdinis, ut non perueniat acuitas ignis ad os infirmi. Deinde igni Cau-
teriū, cuius forma ueniet: et pone ipsum super illū dentem: & tene manū
tuam, donec infrigidetur Cauteriū. Fac illud aliquotiens. nam dolor res-
mouebitur, aut in illo eodem die, aut die alio. Et oportet in impressione
illius Cauterij, ut impleat infirmus os suū butyro bono, & teneat ipsum
hora una: deinde exspuat ipsum. Et hæc est forma Cauterij.

B

Cauterium
Dentū cum
butyro.

Cum igne.




Cauteriza cum quacumque extremitate uis secūdum quod est possi-
bile: & hæc est forma Cannulæ.



C De modo cauterizandi in Strophulis. Caput xxiii.

Q V A N D O Strophulæ sunt a phlegmate, et ab humiditatibus frigidis, & non sunt obediētes digestioni per medicinas, & uis digestionem earum uelociter: tunc igni Cauterium concauū, cuius forma est hæc.




Habens duas extremitates apertas, ut egrediatur fumus apud Cauterium ab extremitate altera: & pone ipsum ignitū super ipsum apostema semel, et secūdo, si indiges illo, donec perueniat ad profundū apostematis. Quod si apostema est paruū: tunc pone Cauterium secundum quantitatem apostematis. Deinde dimitte ipsum tribus diebus, et pone super ipsum cotū infusum in butyro, donec remoueat quod cōbussit ignis. Deinde cura ipsum cū unguento dentis, donec sanetur forma cannulæ.

D De modo cauterizandi in raucedine uocis, & constrictione anhelitus. Caput xxv.

Q V A N D O uincūt humiditates super cañale pulmonis, et præcipue quando illud est cum frigiditate complexionis, tunc oportet ut euacuet infirmus i primis cū medicinis solutiuīs. Deinde cauteriza ipsum in nocrati apud radicē gutturis in locē depresso: et caue, ne peruenias cū Cauterio ad guttur, neq; in cure, nisi quiddam eius. Deinde cauteriza ipsum cauterio alio apud iuncturam colli in ultimo spondili eius ultimando: & sit Cauterium clauile secundū modum, qui præcessit. Deinde cura ipsum cum eo quod præcessit, donec sanetur.

Q De modo cauterizandi in ægreditinibus Pulmonis, & Tussi. Caput xxvi.

Q V A N D O Tussis & ægreditudo Pulmonis sunt ab humiditatibus frigidis, et infirmus non habet febrē, neq; phthisim, & ægreditudo antiqua: tunc cauteriza ipsum duobus cauterijs supra furculā in locis depressis, lenibus, uacuis. Et cauterio alio in medio pectoris inter duas māmillas: et sit cauterium cannulæ secundū formā quæ præcessit. Et si uis sit cauterizatio tua punctando cū cauterio, quod notatur Punctum, cuius forma præcessit in punctatione doloris aurii: & sint puncta ex triginta punctis usq; quasi ad alia. Deinde cura ipsum cū eo quod præcessit, donec sanetur. Et iam sit cauterium habens tres ramos: scđm hanc formā.



Cauterium
Punctum.

Quare alleuiatur cum eo cauterizatio, quando tu facis cum eo uice uena tria Cauteria.

¶ De modo cauterizandi in Titillico, in dislocatione Humeri. Caput xxvii.


A

QUANDO dislocat caput adiutorij causa humiditatu, et non figit in hora reditus sui a dislocatione sua, donec sit illud ei consuetudo reditionis, deinde dislocatur a paruo motu, qui accidit sicut nos iam testificauimus illud, tunc oportet ut reducas dislocationem in primis. Deinde resupinetur infirmus super dorsum suum, aut super latus sanum. Deinde eleua cutim, que est in interiori Titillici ad superiora cum digitis manus tue sinistrae: & si iunctura dislocatur ad interiora. Deinde igni Cauterium habens duo uerua. Cuius forma est haec.



Deinde cauteriza cutim, donec penetret eam usque ad latus aliud, & ueniat figura cauterizationis cum quatuor cauterijs. Et quandoque fit cauterizatio cum cauterio habente tria uerua, quare fit figura cauterizationis tunc sex cauteriorum: & sunt uerua secundum subtilitatem tenet. Et haec est forma cauterij habentis tria uerua.

B



Et quandoque additur super hunc modum unum, quare sunt cauteria octo. Deinde pone super cauterium porros contritos cum sale. Deinde fac adhærere infirmum tranquillitati, ut non moueatur membrum tempore aliquo, donec confortetur. Et si dislocatio est ad superiora, & raro fit illud, tunc cauteriza ipsum super humerum cauterio clauili, aut cauterijs multis punctando. Nam iunctura firmatur, & remouetur humiditas: & sanatur infirmus.

¶ De modo cauterizandi Stomachum.


Caput xxviii.

QUANDO accidunt in Stomacho frigus & humiditates multae, donec extrahant ipsum a complexionem suam, & multiplicantur catarrhi ad ipsum, & assiduas modos curationis, & non confert: tunc oportet ut resupinetur infirmus super dorsum suum, & extendat crura sua, & manus suas. Deinde cauteriza cum tribus cauterijs, cauterio sub cochleari pectoris quantitate digiti unius cum cauterio clauili, & duobus cauterijs inferius a duobus lateribus cauterij unius, donec ueniat figura cauteriorum triangulata. Et elonga inter utraque ut non coniungantur, quando facient pus. & sit profunditas cauterij quantitas duarum tertiarum grossitudinis cutis.

C



Et sit figura cauteriorum secundum hanc formam sine additione: & si uis cauteriza cauterio magno in medio stomachi secundum hanc formam: & sit cauterium quo fit hoc cauterium unum secundum figuram circuli secundum hanc formam. Et cauterizatur stomachus punctando ei qui terretur ab hoc cauterio: et est, ut signes super stomachum punctum secundum quantitatem, quam uis cum encaustro: deinde cauteriza ipsum cum cauterio puncti: deinde cura ipsum cum curatione, quæ præcessit, donec sanetur.




¶ De modo cauterizandi Epar frigidum.

Caput XXIX.

QUANDO accidit in Epate dolor ex frigiditate & humiditate, aut ex uentositate grossa, donec egrediatur a complexione sua naturali egressione superflua, & curatur infirmus, cum eo quod diximus, et non proficit in illo: tunc oportet ut resupinetur infirmus super ceruicem suam, & signes cum encaustro tria cauteria secundum hanc

D figuram, et hanc quantitatem eandem super Epar inferius ab hypochondrijs, ubi peruenit cubitus hominis: & sit spacium quod est inter omne cauterium secundum grossitudinem digiti: & sit cauterium secundum longitudinē corporis rectum: & non comprimās manum tuam cum cauterio multum. Et sit quantitas eius quod aduritur ex spissitudine cutis, quantitas medietatis eius non additū: & sit infirmus stans super pedes suos. Si autem non est stans, tunc sit iacens, qui iam extendit crura sua, & eleuauit brachia sua. Hæc est forma cauterij.



Et tibi quidem possibile est, ut cauterizes ista cauteria cum cauterio cultellari, quando tecum est subtilitas & prudentia in arte. Et custodi te, ut non ultime procedas in cauterizatione, & aduratur spissitudo cutis totius, quare aduratur corpus totum, & perueniat ad intestina: quoniam cutis illæ est subtilis, scias ergo illud.

De modo cauterizandi apostemata Epatis.
Cap. xxx.

A

QUANDO accidit exitura, & uis scire, si illud apostema est in carne Epatis, aut in tunica eius: tunc si est in carne Epatis, inuadit infirmum dolor, & grauitas absq; acuitate: & si est in tunica Epatis, cum dolore est acuitas uehemens: & uides iam, quia fatigauit medicos eius curatio. Oportet ergo ut resupines infirmus super ceruicem suam. Deinde figura locum apostematis cum encaustro: deinde ignias cauterium quod assimilatur radio. & hæc est forma eius.



Et cauteriza cum eo cauterium unum, donec comburatur cutis tota, & perueniat ad siphac, donec egrediatur sanies tota: deinde cura ipsum curatione exiturarum, donec sanetur. Et non oportet ut hac cauterij specie utatur, nisi cuius studiū in arte medicinæ prolongatur: & per cuius manus concurrunt ægritudines istę cū experimento aliquotiens: tunc enim audeat super huiusmodi operationem. At uero dimittere ipsam, apud me est melius.

De modo cauterizandi in Pleuresi.
Caput xxxi.

B

DI X E R V N T antiqui, cauterium cum radicibus aristolochiæ ad Pleuresim frigidam secundum hunc modum. Et est, ut recipias ex radicibus aristolochiæ siccæ longæ, radicem unam longiorem, quæ ex ea inuenitur, & sit sicut grossitudo digiti. Deinde submerge eam in oleo: & accende ipsam in igne. Deinde cauteriza cauterio uno in eo quod est inter continuationem furculæ cum collo, & duobus cauterijs paruis sub guidezi parum decliuibus ad partem, quæ est sub barba. Et duobus cauterijs etiam in eo, quod est inter costam quintam & sextam decliuibus ad posteriora parumper: & cauterio alio in medio pectoris, & alio supra stomachum. Et tribus cauterijs a posterioribus: uno in eo quod est inter duas spatulas: & duobus cauterijs a duobus lateribus pectoris, inferius cauterio quod est inter duas spatulas. Et non oportet ut comprimas manum tuam cum cauterio, imo sit in manifesto cutis odorando. Et iam dixerunt quidam antiqui, quod ex hominibus sunt qui utuntur cauterio ex ferro simili radio: & igniunt, et intus mittunt ipsum in eo quod est inter costas, donec perueniatur cum eo ad ipsum apostema, & egrediatur sanies: sicut diximus in apostemate Epatis. Sed in hac perforatione cum cauterio est ex timore, quod aut moritur infirmus statim, aut accidit in loco fistula, cui non est sanatio.

De modo cauterizandi Splenem.

C

Caput XXXII.

Tres modi
cauterizan-
di Splenē.

QUANDO tu curas agritudinem splenis, cum eo quod diximus ex curatione in diuisione agritudinum, & non confert curatio tua, tunc cauterium in ea est secundum tres modos, qui omnes sunt recti. Quorum unus est, ut facias tria cauteria, aut quatuor lineando secundum longitudinem splenis secundum figuram cauteriorum Epatis, quorum præcessit figura. Et sit inter omne cauterium quantitas grossitudinis digiti, aut plus parum. Et sit modus cauterij, quem diximus in cauterio epatis æqualiter. Et non comprimās manū tuam cum cauterio: & sit infirmus resupinus super dorsum suum. Et modus alius de cauterizatione est: ut ignias cauterium habens duo uerua, quod diximus in capitulo dislocationis humeri: & eleua cutem, quæ est in directio splenis, ubi peruenit cubitus infirmi sinister: & sit eleuatio tua qua eleuas cutem secundum latitudinem corporis, ut cadant cauteria secundum longitudinem corporis. Deinde intromitte duo uerua ignita ualde, donec cum eis penetres cutem a parte altera: deinde extrahe cauteriū: sunt ergo cauteria quatuor. Et si uis cauteriza cum cauterio alio habente tria uerua. Deinde cura cauteriū postq̃ dimittis ipsum emittere pus diebus multis: est em̃ magis conferens q̃ reliqua quæ præcesserūt ex curatione.

D

¶ De modo cauterizandi in Hydropisi.


Caput XXXIII.

CAUTERIVM non cadit in Hydropisi, nisi ascliti proprie. Quando tu curas Hydropicum cum modis curationis, quos diximus in diuisione, et non confert curatio, tunc oportet ut cauterizes ipsum quatuor cauterijs in circumitu umbilici, & cauterio uno super stomachum, & cauterio alio super epar, et cauterio super splenem, & cauterijs duobus post dorsum inter spondiles, & uno in directio pectoris, et alio in directio stomachi: et sit quantitas profunditatis cauterij propinqua spissitudini cutis. Deinde dimitte cauteriū apertum, ut emittat pus tēpore longo. Et non euacues infirmū a curatione post cauteriū cum eo: quod oportet ut aggregentur ei duæ intentiones: et festinabit ad ipsum sanatio cum auxilio DE I. Forma uero cauterij cū quo cauterizatur uenter, sit clauilis: secundū quod præcessit forma eius: et illius cum quo cauterizatur dorsum, sit oliuaris secundum quod præcessit eius forma.

¶ De modo cauterizandi Pedes, & Crura.

Caput XXXIII.

QUANDO apostematur in Hydropico, & replentur aqua citrina: oportet ut cauterizes super dorsum Pedis in noctrati, quæ est inter auricularem & anularem: et eleua manū tuam cū cauterio, & non torqueas ipsum: deinde eleua manum tuam: & non iteres ipsum omnino, resudet enim aqua citrina, et sit cauteriū secundū hanc formā.



Deinde fac super duo crura duo cauteria in omni crure, & fiat cauterium cum extremitate cultellari cauterij: & fiat cauterium secundum longitudinem cruris, unum sub genu, & alterum inferius eo, circiter medium cruris: et super omnem coxam cauteria duo: & dimitte cauterium apertum absq; curatiōe tempore longo: ut resudet ex eo aliquod aquae: deinde cura ipsum cum reliquis quæ diximus.

¶ De modo cauterizandi in solutione Ventr̃is. Caput xxxv.

QUANDO est solutio ventris ex frigore & humiditatibus, donec debilitet uirtutes retentiua & digestiua, quæ sunt in stomacho & intestinis: et curatur illud cum modis curationis, & non sanatur: et uides infirmum tolerantem cauterium exuberantis uirtutis, tunc cauteriza ipsum cauterio magno super stomachum suum, secundum quod præcessit in cauterizatione stomachi cum cauterio circuli, & quatuor cauterijs in circumitu umbilici subtilibus, cum cauterio clauili subtili: et cauterio super alcaïn supra alhosos magno, aut duobus cauterijs. Et si uides humiditates exuberantes, & infirmum tolerantem illud, tunc cauteriza ipsum cauterio super pectinem, et cauterio super omne ilium: & fortasse addes duo cauteria parua super stomachum prope magnū. Est enim curatio proficiens, cuius iuuamentū non errat.

¶ De modo cauterizandi Hemorroidas.

Caput xxxvi.

QUANDO in ano sunt Hemorroides antiquæ multæ, aut una, & sunt ex humoribus grossis, frigidis, aut humiditatibus corruptis, & curantur cum eo, quod diximus in diuisione, et non confert curatio: tunc cauteriza tribus cauterijs super inferiorem spondilem dorsi sub almeidati parumper triangulatim, & cauterio sub umbilico quasi duobus digitis. Et si cogitas, quod stomachus eius infrigidatus sit, et cibus eius non digeratur, et faciem eius uides apostemari, tunc cauteriza eum super stomachum cauterio magno, secundum quod præcessit: et cauterio super Ep̃ar eius, et alio super Splenē ipsius, cum cauterio clauili: & dimitte cauterium apertum tempore aliquo: deinde cura ipsum, donec sanetur.

¶ De modo cauterizandi althelul post abscessionem eorum. Caput xxxvii.

QUANDO tu abscondis althelul, tunc ignias cauterium quod assimilatur radio. Deinde intromittite ipsum ignitum in ipsum althelul abscessum: et ultima manum tuam, donec perueniat cauterium ad orificium uenæ, ex qua currit sanguis: fac illud semel, aut bis.

C Si ergo althelul fuerint multa, tunc cauteriza unumquodq; cauterio secundum quod narrauimus. Deinde cura ea, cum eo quod confert eis ex unguentis, donec sanentur. Et si cauterizas eum cauterio magno super alcatin, est magis ultimum in iuuamento.

¶ De modo cauterizandi Fistulam in ano.

Caput xxxviii.

Q V A N D O non obedit infirmus sectioni & operi quod narrauimus in loco suo, & terretur ab illo, fortasse sanatur cum cauterio. Cum ergo accidit alicui Fistula, et antiquatur, currit pus ex ea, et humiditates corruptę. Dignius ergo quod oportet est, ut probes eam cum tenta subtili. Deinde cognosce quantitatem profunditatis eius cum tenta. Deinde ignias cauterium, quod est simile radio. Deinde intromitte ipsum ignitum in ipsam Fistulam & quantitatem in qua intrauit clauus. Et itera super eam cauterium, donec comburantur illa omnia corpora corrupta, semel, aut bis, aut ter, secundum quantitatem necessitatis tuę. Et custodi te ab adustione nerui, si est illic, aut uene magne; aut si Fistula uadit ad corpus uesicę, aut ad corpus intestini, tunc custodi te ab istis locis omnibus. Et non facias illud, nisi quando fistula est in loco carnosio: et cogitas, quia non est penetrans. Deinde cura locum usquequo sanet. Si autem sigillat locus, et abscindunt ab eo materia, & remanet sic tempore longo: tunc scias, quia iam sanatus est integre. Et si non abscindunt ab eo materia, tunc scias quia est penetrans, aut in profundo eius est os corruptum, aut quasi illud ex illis: quorum rememoratio ueniet in loco suo.

¶ De modo cauterizandi Renes. Cap. xxxix.

Q V A N D O accidit in Renibus dolor ex frigore, aut ex uentositate grossa, et minuitur propter illud coius infirmi, tunc oportet ut cauterizes ipsum super almethenę super ipsos renes, cauterio super omnem renem cum cauterio clauili, cuius precessit rememoratio. Et fortasse cauterizamus ipsum secundo in ipso almeidatu. Quare uenient tria lineata. Ergo erunt magis ultima in iuuamento.

¶ De modo cauterizandi Vesicam. Cap. xl.

Q V A N D O accidunt in Vesica debilitas, et mollificatio a frigore & humiditatibus, donec non retineat infirmus urinam, tunc cauteriza ipsum in inferiori parte suminis super Vesicam, ubi incipiunt pili peccinis, et cauterio a dextra suminis, & alio a sinistra illius: et sit longitudo illius cauterizationis lateris secundum quantitatem nodi pollicis: & cauteriza ipsum cauterio inferiori dorso, aut duobus cauterijs, si indiges illo: & sit secundum quod precessit cauterium clauile.

¶ De modo cauterizandi Matricem. Cap. xli.

Q V A N D O accidunt in Matrice frigus & humiditates, et prohibetur per illud ab impregnatione, et corrumpuntur menstrua eius, & tardatur prouocatio eorum, et accidit ei apud aduen-

tum eorū dolor, tunc oportet ut cauterizetur tribus cauterijs in circūitu A
umbilici, sicut diximus in cauterizatione uesicæ, et cauterio super alca-
tim inferius dorso, aut duobus cauterijs: et sit cauterium clauile.

¶ De modo cauterizandi Ancham in dislo-
catione. Cap. XLII.

QUANDO effunduntur humiditates mucosæ ad pixidem An-
chæ, & fiunt causa exitus eius a loco suo: et signū illius est,
quod prolongatur crus super alterum, quando comparant adinuicem;
& inuenitur locus dislocationis in eo uacuu. Oportet ergo ut cauteri-
zes infirmum super pixidem Anchæ ipsius cauterio simili circulo: post
quam tu signas cum encaustro in circumitu pixidis, sicut reuoluitur: &
ut cadat ipsa pixis in medio circuli. Et sit cauterium cuius forma præces-
sit in cauterizatione stomachi. Quod si tibi non est præsens hoc cau-
terium, tunc cauteriza ipsum tribus cauterijs, cum cauterio oliuari ma-
gno: et fiat cauterio profunditas secundum quantitatem spissitudinis
cutis totius. Deinde cura ipsum, donec sanetur.

¶ De modo cauterizandi in Sciatica.
Caput XLIII.


QUANDO accidit dolor in pixide anchæ, & sunt causa illius
frigus & humiditates: et curatur infirmus cum eo, quod di-
ximus in diuisione, et non confert curatio, & antiquatur illud: tunc o-
portet ut soluas infirmū ab humoribus grossis cum pillulis foetidis, aut B
cum pillulis artificialibus, & similibus. Deinde cauteriza eū. Et modus
cauterij in ea est secundum duos modos: aut cauterium cum medicinis
adurentibus, aut cauterium cum igne.

Cauteriū cum igne, est secundū multos modos. Quo-
rum unus est, ut cauterizes super pixidem anchæ ipsius
tribus cauterijs triangulatis, secundum hanc formā. Et
fac eis profunditatem bonam, uel malam. Et sit spacium
quod est inter omne cauterium quantitatis grossitudinis digiti: sitq; cau-
terium oliuare. Quandoq; autem sit cauterium in medio super caput
anchæ ipsius. Quare sunt quatuor cauteria. Et si uis cauteriza cum circu-
lo, cuius præcessit forma in cauterizatione dislocationis anchæ, unō: ut
sit circulus continens ancham totam. Et combure spissitudinem cutis to-
tius. Iste est modus cauterij in Sciatica, quando dolor est adhærens an-
chæ ipsi, et non extenditur usq; ad coxam & crus. Si autem extendit-
ur usq; ad coxam & crus, tunc cauteriza ipsum duobus cauterijs super
coxam, super locum ad quem innuit illic infirmus, in quo est dolor, &
cauterio tuo super cauillā quatuor digitis ad partem syluestrem parum-
per: et sit cauterium cultellare. Et sit profunditas cauterij secundum pro-
funditatē spissitudinis cutis. Quod si infirmus innuit quod dolor ex-

C tenditur usq[ue] prope digitos pedis, tunc cauteriza ipsum illic ubi innuit cum cauterio puncti, tribus, aut quatuor, aut pluribus, si indiget illo. Et si innuit dolorē esse sub genu uersus crus, tunc cauteriza ipsum illic cauterio uno cultellari. Et caue tibi in omni cauterizatione tua, ut non ultimes cum cauterio ad hoc ut comburas neruū, aut arteriam magnam, & attrahas per illud super infirmū nocumentum malum, aut contrāctionem. Et ego quidem iam uidi unum & alium, ex eis qui cauterizauerunt supra cauillam, & ultimauerunt in cauterizatione, et inflatum est crus, donec tumor consecutus est pedem, et perforatus est totus, et corruptus est totus pes: deinde accidit solutio uentris, & mors post illud.


Quod si dolor est in duabus partibus simul, cauteriza utramq[ue] secundum hunc modum. Et sapientes quidam dixerunt in cauterizatione anchæ, cuius cauterij iste est modus: Fac simile famio ex ferro, cuius diametrus sit medietas palmi: & sit apud orificium suum secundum grossitudinem nuclei daclyli, aut minus parumper: & intra illud famium sit famium tertium. Et sit spacium quod est inter omne famium per quantitatem nodi pollicis: et sint famia aperta a duabus partibus: & sit altitudo eorum quasi nodus, aut duo nodi: & fac eis manubrium ex ferro decenter aptatum in famijs. Et hæc est forma eius.

D



Deinde igniatur in igne, donec rubeat, & projiciat scintillas: deinde ponatur super pixidem anchæ infirmo accubitato super latus sanum. Cauteriza ergo eum tribus cauterijs rotundis in uice una. Deinde dimitte ipsum tribus diebus. Postea emplastra cum butyro: & dimitte uulnus aperitū diebus multis. Deinde cura ipsum cum unguento, donec sanetur. Inquit Albucasis, hac specie cauterij o filij, parum usi sumus, propter terrorem aspectus eius: & propterea, quod paucos inuenimus qui expectent super ipsum. Verumtamen est ex bonis cauterijs ei qui suffert, & inuenit cum eo locum eius. Cauterium autem cum medicinis adu-

rentibus est, ut tu facias duo samia habētia perforatā armillam, in quam **A** descendit cardo portæ eius ex ære, aut ferro, longitudo parietis: quorū in altitudinem eorum sint duo nodi, aut quasi ipsi. Et sit spaciū quod est inter utraq; quantitas grossitudinis digiti, & sint aperta inferius & superius: & sit quod contineant se adinuicem, secundum hanc formam.



Deinde depone eam super pixidē anchæ, infirmo iacente super latus sanum. Et comprime manum tuam super pixidem anchæ multum.

Deinde funde inter duos circulos ex aqua calida, quæ sit calefacta cum igne parumper, & tene eam quantitate horæ temporalis: & toleret infirmus mordicationem eius, & ipsius adustionem, nam ipse inuenit mordicationem sicut

ignis, donec quiescat mordicatio. Deinde eleua manum tuam cum instrumento, & absterge aquam calidam ab ancha tota cum aqua dulci: deinde dimitte illud tribus diebus. Et pone super illud butyrū, donec remoueat nigredo adustionis: & dimitte illud diebus aliq̃t, & curret ex eo pus. Est enim ultimum in iuuamento. Deinde cura illud cum unguentis, donec sanetur. Quod si extendatur dolor usque ad coxam, aut

crus: fac ei statuam in eo quod continet aquam, secundum quod fecisti in ancha æqualiter. Et iste est modus aquæ calidæ: & ego iam scripsieam in tractatu rectificationis medicinarum. Sume alcali, & calcis non extinctæ amborum ana partem unam: tere utraque, & pone ea in ollam nouam, cuius inferior pars sit perforata foramine uno paruo, secundum quantitatem quod ingrediatur ipsum radius: & pone sub fundo ollæ ollam aliam uitreatam: & projice super alcali & calcem ex aqua dulci, quod submergat utraque per digitum: post quam tu comprimas ea manu tua compressione bona: & dimitte ollam, donec descendat aqua acuta inferiori parte ollæ uitreatæ. Deinde aggrega illam aquā totam, & projice eam super aliam calcem: & cola, donec renouetur. Ipsa enim erit tunc fortis acuitatis ualde, quæ administratur in multis operationibus medicinæ, & in cauterizatione reliquorum membrorum. Quoniam efficit operationem ignis ipsius. Et ex medicinis sunt, cum quibus cauterizantur ancha, etiam sicut testis, & mel anacardi, & calx cum sapone, ita quod utraque sint permixta.

C Et **G A L E N U S** quidem narrando retulit, cuiusdam uiri ex antiquis curationem, qua curatus est dolor anchæ & uenæ sciaticæ: & magnificauit esse eius ualde. Et dixit, quia non indiguit alia curatione, & quia sanatus est ex uice una, donec retulit, quia ipse fortasse intrauit balneum delatus, & exiuit ex eo iam sanus. Et est, ut accipiatur ex seitaragi uiridi: & si non inuenitur uiride, fumatur siccum, recens: & teratur multum cum aliquanto adipe, & ponatur super an-

B

Aqua acuta.

Cham, ubi est dolor, aut crus, aut in coxa: & ligetur, et dimittatur quantitate trium horarum, aut per quantitatem quod sentiat infirmus sedationem adustionis. Deinde intromitte eum in balneum. Cum ergo roridum sit corpus eius, intromitte ipsum in solum. Nam dolor recedit, & sanatur. Et scias, quia non oportet ut utatur aliquis cauterio cum istis medicinis, nisi post euacuationem corporis. Et Dioscorides qui dem dixit, quod stercus caprarum, quando cum eo cauterizatur uena sciatica, confert ei: & fit cauterium secundum hunc modum. Sumatur lana, & imbibatur oleo antiquo, & ponatur super locum profundum, qui est inter pollicem pedis, & inter focile, et est propinquior foci. Deinde accipe stercus caprarum siccum, et inflamma ipsum in igne, donec fiat carbo. Deinde pone ipsum super lanam, & dimitte ipsum, donec extingatur. deinde itera illud. Non cesses ergo facere illud, usque quo perueniat sensus super mediatione usque ad ancham, &


Operatio
Dioscor.

Cauterium
Vaccinum.

quiescat dolor. Et iste modus cauterij nominatur cauterium Vaccinum.


¶ De cauterizatione doloris Dorfi.
Caput XLIII.

D**Q**UANDO QVE accidit dolor in Dorso ex caussis multis, aut a casu, aut a percussione, aut euacuatione superflua, & illis similibus, ex infusione materiei frigidae, et humidae: & cauterium quidem non cadit, nisi in hac specie sola, quae fit ex infusione materiei frigidae. Oportet ergo post euacuationem infirmi cum pillulis foetidis, & eis similibus, ut fiant super Dorsum, ubi est dolor, tres lineae secundum latitudinem almeidati ipsius, postquam signas cum encaustro in omni linea quinque cauteria, aut plura secundum quantitatem quae uenit ex tolerantia infirmi uirtute eius: & fiat cauterizatio cum cauterio puncti. Et si uis, cauteriza tribus cauterijs, aut quatuor, cum cauterio clauili mediali, secundum hanc formam.



¶ De modo cauterizandi in inceptine Gibbositatis. Caput XLV.


MULTOTIENS accidit haec agritudo infantibus paruis. Et signum inceptationis eius in pueris est: quod accidit super eum strictura in anhelitu apud eleuationem, & motum: & inuenis in ultima spondilium Dorfi & nodorum eius, quod iam incipit eminere super reliquos spondiles. Cum ergo uides illud, et uis facere illud, tunc cauteriza ipsum cum cauterio quod sit circulus secundum hanc formam.



Et capiat cauterium super omnem partem spondilis æqualiter : & si uis cauteriza in circumitu spondilis cum cauterio puncti duas lineas , aut tres : & sint puncta propinqua adinuicem . Deinde cura locum , donec sanetur cum eo quod diximus . Et caue , ne administres cauterium in gibbositate , quæ fit in spasmio nerui .

Q De modo cauterizandi in Podagra , & doloribus iuncturarum . Caput XLVI .
 V A N D O dolores iuncturarum sunt ab humiditatibus frigidis , quæ effunduntur ad cuiuslibet membra corporis , tunc quædo accidunt dolores in pedibus , de consuetudine medicorum est , ut nomen illud Podagram proprie . Cum ergo curatur Podagra frigidaë causæ cum modis curationis , & non remouentur dolores , tunc cauterium remouet eos . Et est , ut cauterizes eum post euacuationem in circumitu iuncturæ pedum , cauterijs multis : et sit cauterium Oliuare . Cuius hæc est forma .

B



Et si indiges ut punctes super faciem pedis , tunc fac cum cauterio puncti . Quod si ascendunt dolores usque ad genua , aut reliquas iuncturas , & multotiens accidit illud , tunc cauteriza ipsum super omne genu tribus cauterijs , aut quatuor ab omni parte , cum hoc eodẽ cauterio Clauili . Si aut necessaria sunt tibi plura hoc cauterio , tunc cauteriza ipsum . Et non submergas manũ tuam cum cauterio , imo sit circiter spissitudinem cutis tantum . Si autem ascendunt dolores ad genua , & dorsum : tunc administra quod diximus ex cauterio in capitulo suo . Quod si dolores sunt in manibus tantũ , tunc puncta in circumitu focium , sicut reuoluuntur duæ lineæ . Si aut remanet ex doloribus in digitis , tunc puncta eos , super omnem nodum punctum , & super pectinem manus .


Si autem ascendunt dolores post dies ad cubitos , aut ad humeros , tunc cauteriza utroque ab omni parte . Et non euacues infirmum ex regimine bono , ex recaptione medicinarum . Nam si bonum fiat regimen , & euacuetur phlegma , sanabitur auxilio D E I cum isto cauterio .

C

¶ De modo cauterizandi in Rupturis.
Caput XLVII.

Ruptura in
inguine.

QUANDO accidit Ruptura in inguinibus, et descendit intestinum, aut zirbum ad testiculū, & est illud incipiens propinquum: tunc oportet ut precipias infirmo dimittere comestionem in die suo. Et utatur ex lenientibus, quo descendat stercus a ventre suo. Deinde sedeat inter manus tuas super dorsum suū: & præcipe ei, ut teneat anhelitū suum, donec egrediatur, uel appareat zirbum, aut intestinum. Deinde reduc ipsum digitis tuis, & signa cū encaustro sub Ruptura super os pectinis, cū signo cuius extremitas sit similis medietati circuli ad superiora corporis. Deinde igni cauterium, cuius hæc est forma, dor-



nec ueniat album, & proijciat scintillas. Deinde reduc intestinum, aut zirbum ad concavitatē suam. Deinde ponat minister manū suam super locum, ut non exeat intestinū: & tu iam aperuisti inter crura infirmi, & posuisti sub eo puluinar, & seruiens alius super crura eius, & alius super pectus eius qui tenet manus. Deinde depone cauterium super ipsum signum, manu tua cum cauterio stante recta. Et tene ipsum, donec cum eo consequaris os: aut itera cum eo uice alia, si non consecutus fueris cum eo in prima usque ad os. Et prudenter observa ab exitu intestini in hora cauterizationis tuæ, ne comburas ipsum, & eueniat per illud super infirmum aut mors, aut malicia magna. Et scias, quod quādo tu non consequeris cum cauterio os, non confert operatio tua. Et oportet ut sit cauterium infantium subtile, secundū mensuram eorum. Deinde cura cum reliquis unguentis, donec sanetur. Et sit infirmus iacens super dorsum suum quadraginta diebus, donec sigillet uulnus. Et oportet, ut ponas nutrimentum eius longitudine temporis curationis eius, quod leniat ventrem eius: ut non exeat intestinum apud conamen & egestionem.

Deinde quando uult surgere post quadraginta dies, tunc administra ligamentum decenter factum, & teneat ipsum quadraginta diebus alijs. Et minoretur a labore, & repletionē cibi & potus, et uocibus uehementibus. Nam quando utitur hoc regimine, ita sanatur sanatione integra. Et ego dicam curationem Rupturarum cum incisione in capitulo suo.

Ruptura in
Ventre.

Quando autē Rupturæ accidunt in reliquo uentre, & sunt incipientes, & uis ut non addantur, tunc cauteriza Rupturam eius cauterio rotundo secundum quantitatem eius: & sit illud quod aduritur extunc sic ut tertia eius. Deinde cura ipsum, cum eo quod diximus: & non addatur. Et iam dixerunt quidam primi: ut cauterizetur Ruptura cum cauterio triangulato, secundum hanc formam.

Postquam signatur cum encaustro, & ponitur linea quæ est per latitudinem in latere superiori Rupturæ, & linea altera ad inferius. Et deponemanum tuam in medio cum cauterio clauili. Sed cauterium primum est facilius & melius.

Q De modo cauterizandi in doloribus propter casum, aut percussionem. Caput XLVIII.

V A N D O accidit in quibusdā membris a casu, aut percussione dolor: & perseverat ille dolor tempore longo, & non confert in eo curatio cum medicinis: tunc oportet ut cauterizetur cum cauterio Puncti. Et sit cauteriū omnis mēbri cauterium secundū magnitudinē eius, & ipsius paruitatē, et debilitatem eius, & ipsius uirtutē, et locationē torsionis, & doloris ex eo. Si ergo sanatur ex cauterio primo, est bene. Si non: tunc itera super ipsum cauteriū. quoniā de consuetudine horū dolor est, ut permutent ex mēbro ad illud qđ appropinquat ei. Quare oportet ut consequaris eos cū cauterio, donec sanet infirmus.

Q De modo cauterizandi in Lepra.

Caput XLIX.

L E P R O S I autē quandoq; iuuantur cauterio iuuamento maximo. Et præcipue species Lepre, quæ fit propter putrefactionem phlegmatis & melancholicę: cū ergo uis cauterizare ipsam cōsidera. Si ergo Lepra est ineipiciens, & curasti eam cum eo, quod diximus in diuisione, & non descendit, neq; stat: & times super infirmū, quod comprehendat corruptio super totam complexionē eius: tunc cauteriza eum super caput quinque cauterijs: uno in medio capitis notō, & secundo inferius eo uersus frontem apud finem capillorū, & duobus super duo cornua, & uno posterius super nucea ceruicis. Et ultima manum tuam cum cauterio parumper, donec imprimat in os impressionem paruam, & dislocentur ex eo cortices: ut alleuietur exspiratio uaporum grossorum ex eo, & cauteriza cauterio etiam super ipsum splenem, secundum quod præcessit. Sin autem Lepra iam sparfa est super infirmū, & apparet manifeste: tunc oportet ut cauterizes cum istis cauterijs, quę diximus in capite, & cauterio super extremitatem nasi, & duobus cauterijs super duas maxillas, & duobus cauterijs super spondiles colli, & sex super spondiles dorsi, et uno magno super althaholos apud gran caudæ & uno supra ipsum, in ipso almeidati: & duobus super anchas: scilicet super omnem ancham uno, & duobus super genua: uno super omne genu, & duobus super humeros, & duobus super cubitos, & duobus super tenitudines pectoris sui: & cauteriza ipsum super omnem iuncturam, ex iuncturis digitorum manuum suarum, & pedum suorum: & caute

C riza super omnem calcaneum pedum suorum, & fociilia manuum suarum. Et caue tibi a neruis qui sunt super postremum calcanei, ut non comburas eos. Et quandoque cauterizatur cauterio super os pectinis, & alio super os stomachi, et alio super epar. Et scias, quod quanto plus addis cauterium, est magis iuuamentum, & magis conferens.

Et scias, quod infirmus non inuenit in cauterio dolorem, sicut inueniunt ipsum sani: propterea, quod corpus eius iam stupefactum est. Et oportet ut sint cauteria ex magnitudine, et paruitate secundum membra & iuncturas: secundum quod præcessit ex speciebus ferramentorum. Deinde cura cauterium ex farina herbi cum melle, & reliqua curatione, donec sanetur.


¶ De modo cauterizandi in Stupore. Cap. L.
Q V A N D O stupet aliquod membrum, et curatur cum medicinis, et oleis, & emplastris, et non sanat, tunc cauteriza ipsum membrum stupefactum cauterijs, secundum quod meretur magnitudo membri, aut paruitas eius. Et sit cauterium tuum intrans in spissitudinem cutis parumper. Deinde cura ipsum cum unguento, donec sanetur. Et quandoque cauterizat ad quiddam stuporis, qui accidit manui, & pedi, in spondilibus dorsi apud exitum neruorum, qui mouet illud membrum: et remouet stupor. Verum non presumat super illud, nisi qui est sapiens in anatomia membrorum, et egressione neruorum mouentium corpus.

¶ De modo cauterizandi in Albaras. Cap. LI.
Q V A N D O antiquat Albaras, et non confert in eo aliquid ex ingenijs medicinae: tunc cauteriza super ipsam cauterio profundo parumper, secundum quantitatē spissitudinis cutis, donec remoueat albedo, et muteat color eius. Deinde cura ipsum cum farina herbi, & lentis cum oleo rosa. et folijs arnoglossae, et sanguine columbae, et sanguine hyrūdinis: de unoquoque sit pars una: misceantur haec omnia, et leniantur super pannum, et adhæreant loco, donec sanetur.

¶ De modo cauterizandi in Cancro. Cap. LII.
Q V A N D O Cancer est incipiens, et uis ipsum sistere: tunc cauteriza ipsum cum cauterio circuli in circuitu eius, sicuti reuoluitur. Sapientes autem dixerunt, ut cauterizetur cauterio ultimo in medio. Mihi autem non uidetur illud: quoniam timeo quod ulceretur: & ego iam uidi illud aliquotiens. Et rectius est, ut cauterizetur in circuitu eius cum circulo, sicut diximus: aut cauterijs multis.

¶ De modo cauterizandi in Adubelati. Caput LIII.
Q V A N D O aliquis habet Adubelati, & tardatur in maturacione, aut propter superfluitatem facientem eam, aut propter aetatem infirmi, quando est decrepitu pauci sanguinis, aut propter tem

pus, & uis festinare in maturatiōe Adubelati, tunc cauteriza in circum- **A**
 itu eius cum cauterijs paruis multis punctando. Deinde dimitte eam.
 Nam ipsa festinabit cum maturatione. Si autē uis perforationem eius
 cum cauterio, tunc igni cauterium, cuius hæc est forma.



Et depone ipsum in medio Adubelati, donec penetret cutem: & sit cau-
 terium ab eo quod sequitur infirmus, ut alleuietur cursus puris. Deinde
 cura ipsum donec sanetur.

C De modo cauterizandi in malo corro-
 dente. Caput LIIII.
CORRODENS non est nisi corruptio in membro ambulās, **Corrodens.**
 & corrodit ipsum: sicut ignis comedit ligna sicca. Si ergo uides corro-
 dentem in loco qui toleret cauteriū cum igne, tunc igni cauteria multa,
 clauilia parua & magna, secundum quod conueniet illi loco in quo est
 corrodens. Deinde cauteriza ipsum ab omni parte donec eradicet cor-
 ruptionem totam, & non remaneat ex ea aliquid penitus. Deinde dimit-
 te ipsum tribus diebus, & pone super loca cauterizata sulphur triū cū
 oleo, donec eradicentur escharæ omnes, & omnis corruptio. Deinde cu-
 ra ipsum cum unguentis generatibus carnem. Si ergo uides, quod post **B**
 tres dies caro nascitur natiuitate sana, in qua non est corruptio, est bo-
 num. Et si non: tunc iterum cauterium super illud quod remansit ex locis
 corruptis. Et corrodens medicatur quandoq; cum medicina acuta. Ipsa
 namq; surgit loco cauterij. Verumtamen cauterium cum igne est uelo-
 cioris iuuamenti: & ego quidem iam dixi cauterizationem eius cum me-
 dicina acuta in diuisione: accipe ergo eam illic quando ea indiges.

M De modo cauterizandi in Clauis, &
 Verucis. Caput LV.
MULTOTIENS accidit in inferioribus partibus pedum
 hæc ægritudo: & est res grossa, filtrata, quæ lædit pedem. Et cauterium **Clauus.**
 quidem in eis est secundū duos modos: cauterium cum igne, & cauteri-
 um cum aqua calida. Quantū autem cū igne est, ut ignis cauterium
 concauū simile penne uulturis: quod fiat ex ferro, secundū quantitatem
 quod contineat clauū ab omni parte: et sit subtiliū marginum. Deinde
 depone ipsum ignitū super clauū. Deinde reuolue manū cum cauterio
 in circumitu clauī, donec perueniat cauteriū ad profunditatem clauī: &
 dimitte ipsum tribus diebus, donec incipiat emittere pus. Deinde em-
 plastra ipsum cum maluis syluestribus, contritis cum sale: & dimitte em-
 plastrum super ipsum in nocte. Ipse enim eradicabitur ex radicibus su-
 is. Deinde cura locum unguento generatiuo carnis, donec sanetur.
 Quod si sunt non conuersi, & multotiens accidunt in superficie cor-

C poris, præcipue in manibus & pedibus: tunc administres in eis cauteriū cum aqua calida: et est, ut accipias cannulā ex ære, aut ferro, aut ex penna uulturis: et depone eam super clauū, aut althelul. Deinde præfice in cannulam ex aqua calida quantitatem paucam: retine manum tuam, & tu reuolue eam cum compressione manus tuæ parūper, ut imprimatur margo cannulæ in radice clauī, et inueniat aqua calida uiam ad profundum, ad radicem clauī: & expectet infirmus parumper super mordicationem aquæ calidæ hora una. Deinde dimitte ipsum, nam clauus eradicatur cum radicibus suis. Ita fac cum eis uno post unum, donec uenias super omnes qui ex eis sunt in corpore. Deinde cura eos postquā eradicantur, cum eo quod generat carnem ex unguentis.

¶ De modo cauterizandi in Tremore.
Caput LVI.

Q V A N D O accidit alicui Tremor ex frigore in neruo, aut ex febre quartana, aut alio: tunc oportet ut cauterizes ipsum quatuor cauterijs, aut quinque super spondiles dorsi, et inter omnē spondilem cauterio, & in pectore eius cauterio, et super stomachum eius cauterio. Tremor enim quiescit cum cauterio oliuari, & festinat sanitas ægritudinis frigidæ.

¶ De modo cauterizandi Albathir.
Caput LVII.

D V A N D O Q V E expelluntur in corpore Albathir scdæ, id est, pustulæ, quæ fiunt a materijs grossis corruptis. Oportet ergo in primis cum apparent, ut cauterizentur super omne caput pustulæ cauterio subtili cū ligno myrti, cuius extremitas accensa est cum igne. Aut cum radice aristolochiæ longæ. Aut cum cauterio lenticulari. Et quandoque cauterizantur ademenul, in principio expulsionis suæ secundum hunc modum: & non augentur: et disrumpitur superfluitas faciens eos, & sanat ex eis. Verumtamen oportet ut fiat illud post euacuationem cum phlebotomia.

¶ De modo cauterizandi in fluxu sanguinis ex arteria in uulnere. Caput LVIII.

M V L T O T I E N S accidit fluxus sanguinis ex arteria, quæ incisa est apud uulnus, quod accidit extrinsecus, aut apud incisionem æpostematis, aut cauterium membri, et similia eis: & fit difficile abscondere eum. Cum ergo accidit alicui illud, tunc propera cū manu tua ad orificium arteriæ, et pone super ipsum digitum tuū indicem: et stringe eum multum, donec obsessus sit sanguis sub digito tuo, et non egrediat ex eo aliquid. Deinde pone in ignem cauteria oliuaria parua, & magna numero plura: & suffia super ea, donec fiant ignita ualde. Deinde accipe ex eis unum, aut paruū, aut magnum, secundum uulnus & locum, in

quo disrupta est arteria, & depone cauterium super ipsam uenam, postquam tu remoues digitum tuum festinanter: & tene cauterium, donec abscindatur sanguis. Quod si expellatur cum eleuas digitum ab orificio arteriæ, & extinguis cauterium, tunc accipe cauterium aliud festinanter, ex cauterijs quæ in igne sunt preparata. Non ergo cesses facere illud cum uno post aliud, donec abscindatur sanguis. Et caue, ne comburas neruum qui est illic, & accadat super infirmum malicia alia.

Et scias, quod quando ex arteria fluit sanguis, tunc non est possibile abscindere ipsum: præcipue quauis arteria est magna, nisi cum uno quatuor modorum. Aut cum cauterio, sicut diximus. Aut cum extrahitione, quando non est extracta. nam quando extrahitur, contrahuntur extremitates eius, & abscinditur sanguis. Aut ligetur cum filo ligatione forti. Aut ponantur super ipsum medicinae de proprietate, quarum est abscindere sanguinem, & stringatur cum puluinari constrictione decenti. Qui autem administrat abscissionem eius cum ligamento, & strictura cum panno, aut positione rerum comburentium, et similibus, non confert ei penitus, nisi raro. Si autem accadat alicui illud, & non sit ei præsens medicus, neque medicina: tunc incipiat cum positione digiti indicis super orificium uenæ ipsius, sicut narrauimus, & constrictione eius ualde, donec obsessus sit sanguis a superiori parte uulneris, & super arteriam. Et digitus non remoueat, desuper ipsum cum aqua frigida uehementis frigoris semper, donec congeletur sanguis, & ingrossetur, et abscindatur. Et interim consideret in eo, quid indiget ex cauterio, aut ex medicina.

Quatuor modis sanguis sistitur.

¶ Partis PRIMAE Finis.

LIB. Chirurgici ALBVCA SIS Pars II.

¶ De Incisione, Perforatione, & Phlebotomia in uulneribus, & his similibus.




AM DIXIMVS IN CAPITULO Primo, omnem agritudinem in qua conueniens est cum igne cauterium & medicina comburente, & occasiones eius, ipsius causas, et instrumenta eius, et formas cauteriorum. Et posui illic capitula a uertice usque ad pedem. Et ego procedam in hoc capitulo illa eadem uia: ut alleuietur super querentem quesitum eius. Et antequam incipiam illud, oportet ut addiscatis o filij, quod in hoc capitulo est ex terrore illud quod est in capitulo primo de cauterizatione. Et propter illud oportet, ut sit cautela in eo uehementior. quonia in operatione quæ est in hoc capitu

Admonitio
salubris.

Clo, multotiens cadit euacuatio cum sanguine, cum quo stat uita apud apertionem uenæ, aut incisionem super apostema, aut apertionem exituræ, aut curationem uulneris, aut extractionem sagittæ, aut incisionem super lapidem, et illis similia: ex quibus omnibus associatur tremor, & timor, et cadit in pluribus eorū mors. Et ego moneo uos, ne cadat super uos illud in quo est hesitatio. nam quandoq; cadunt ad uos in hac arte modi hominū cum modis infirmitatū. Ex eis enim est qui irascitur cum ægritudine sua, et est leuis apud eum mors: propter uehementiam eius quod inuenit ex infirmitate sua & longitudine eius malicie. Et cum ægritudine est ex timore quod significat mortem. Et ex eis est, qui dat tibi censum suum, et ditarte cum eo, sperans sanitatem, & ægritudo eius est perniciofa. Non ergo oportet ut consentiatis ei qui uenit ad uos ex eis, cuius modus est talis. Et sit cautela uestra uehementior, quam cupiditas & uestra rapacitas. Et non presumatis super aliquid ex illo, nisi post scientiam certam, quæ uerificat apud uos illud ad quod peruenit successio laudabilis. Et utimini in curatione omnium infirmorum uestrorum, prognosticatione & indicatione de eo ad quod conuenienter sit salus. In illo namq; est uobis adiutorium super acquisitionem famæ & gloriæ, & memoriæ & laudis. Inspiret uobis **D E V S** o filij, intellectum suum, et non auferat uobis directionem & inspirationem: quoniam illud est in manu eius. Et ego quidem ordinaui hoc Capitulum distinguendo per **D** capitula, secudum quod præcessit in capitulo Cauterij, a ceruice usq; ad pedes: ut alleuietur uobis quesitum quod uultis ex eo, & quo indigetis.

¶ De curatione Aquæ quæ aggregatur in capitibus puerorum. Caput i.

SC I A S, quod hæc infirmitas multotiens accidit pueris apud partum: aut quando stringit obstetrix caput pueri absq; leuitate. Et quandoq; accidit etiam ex causâ occulta quæ non scitur. Et ego quidem non uidi hanc ægritudinem in alijs quam in pueris: et ad omnē quem ex eis uidi properauit mors: propter illud ergo uisum est mihi dimittere operationem in ea. Et ego quidem uidi ex eis puerum, cuius caput impletum erat aqua, et caput magnificabatur in omni die, donec non poterat sedere super seipsum, propter magnitudinē capitis sui: et humiditas augmentata fuit, donec mortuus est. Et hæc quidē humiditas, aut aggregat inter cutem & os: aut aggregatur sub osse super sisac. Et operatio in illo, si est humiditas inter cutem & os, et apostema est paruū, tunc oportet ut findas in medio capitis fissura una in latitudine: et sit lōgitudō fissuræ quæ si duo nodi, donec currat humiditas. et hæc est forma spatumilis.



A Si ergo humiditas est magis augmētata, & apostema est maius, tunc pone eas duas fissuras, secundum formam hanc.



Et si humiditas est sub osse, et signum eius est, quod uides commissuras capitis apertas ab omni parte: et aqua deprimi tur quando comprimis eam manu tua ad interiora, & non occultatur tibi illud: tunc oportet ut findas in medio capitis tribus fissuris, secundum hunc modum. Et post incisionem extrahe humiditatem totam. Deinde stringe fissuras cum pannis & puluillis. Deinde embroca illud desuper cum ui-

no & oleo usque ad diem quintum. Deinde solue ligamētum, et cura uulnus cum tentis, et unguentis. Et non dimittas stringere caput cum aqua litate. Et ciba infirmum omni cibo sicco paucae humiditatis, usquequo confortietur membrum, et sanetur. Et modus alius incisionis est, ut consideres ubi apparet magnitudo apostematis, et collectio aque, quoniam quandoque est in occipitio plus, aut in sincipite, aut in dextra, aut in sinistra. Ascende ergo cum incisione ubi apparet tibi apostema & impletio aquae: et scinde illud secundum quod tibi possibile est. Et obserua, ne incidas arteriam, et accidat fluxus sanguinis, et moriatur infirmus ex illo fluxu cum euacuatione humiditatis.

De incisione Arteriarum quae sunt post aures. Caput II.



QUANDO accidunt alicui catarri ad oculos, aut ad pecius, & antiquatur illud, et non confert curatio medicinarum: tunc magis ultima curatio est in illo, incisio harum duarum arteriarum. Oportet ergo quando uis incidere eas, ut radat infirmus caput suum. Deinde frica locum cum panno aspero, ut appareant arterie. Deinde stringat infirmus collum suum, cum quolibet panno suo. Deinde considera, ubi pulset uena. Et loca utriusque sunt loca quae sunt post aures depressa: et raro occultatur, nisi in quibusdam hominibus. Deinde signa cum encaustro super utraque: & incide utramque cum spatumili utrimque acuto, incisione perueniente ad os: & fiat illud per latitudinem capitis. Et si uis, intramitte spatumile sub arteria, et incide eam ad superiora cum incisione. Et sit longitudo incisionis quasi duo digiti functi. Nam quando inciditur uena, egreditur sanguis egressione pulsant, qui salit ad interiora saltu frequenti. Si autem arteria non apparet sensui, tunc oportet ut mensures ab aure quantitatem spacij trium digitorum. Deinde signa cum encaustro, & finde usque ad os. Et illud quod oportet emittere ex sanguine, est. v l. unc. & fortasse emittis ex eo plus, aut minus. Totum illud secundum quantitatem quae apparet tibi ex uirtute infirmi, & repletionem arteriae eius. Deinde considera ad uulnus. Tunc si remanet ad os ex sisac aliquid, tunc incide illud, ut non accidat apostema calidum:


C tunc stringe uulnus cum licinjs ex panno lini . Deinde cura ipsum cum unguento , donec sanetur.

¶ De extractione arteriarum, quæ sunt in temporibus. Caput III.

QUANDO accidit homini hemicranea antiqua, aut catarri aucti propter humiditates acrimoniales, & caliditate in facie certis temporum, aut foda antiqua, uehemens, & similia illis: et medicatur cum modis curationis medicinæ, & non confert illud: tunc experti sumus in his ægitudinibus extractionem arteriarum ex temporibus, aut cauterizationem earum, sicut narrauimus. Et modus operationis in extractione earum, est, ut radat infirmus pilos qui sunt in temporibus, & intendat ad arteriam apparentem in tempore. Ipsa namque ostenditur tibi ex pulsu suo, & raro occultatur nisi in paucis hominibus, aut uehementia frigoris. Quod si occultatur tibi, tunc stringat infirmus caput suum cum quolibet panno suo: deinde frica locum cum panno aspero. Aut uapora locum cum aqua calida, donec appareat tibi apparatus ne manifesta. Deinde accipe spatulum, quod paulo ante formauimus. Deinde excoria cum eo cutem cum facilitate, donec peruenias ad arteriam. Deinde projice in eam uncinum, & extrahe eam ad superiora, donec extrahas eam ex cute, & facias eam euadere ex tunicis quæ sunt sub ea ab omni parte. Si autem arteria est subtilis: tunc inuolue eam cum extremitate uncini. Deinde incide ex ea partem secundum quantitatem qua elongentur extremitates eius, & contrahantur, & non accidat fluxus sanguinis. Nam si non inciditur, & si non abscinditur, non ascendit sanguis penitus. Deinde euacua ex sanguine ana. VI. unci. usque ad. III.

D Quod si arteria est magna: tunc oportet ut liges eam in duobus locis ex filo duplo, forti, ex serico: aut ex chordis aliohod, ut non properet ad ipsam putrefactio ante consolidationem uulneris, & accidat fluxus sanguinis. Deinde incide superfluitatem, quæ est inter duo ligamenta. Fac illud in illa hora, aut post horam aliam. Et si uis, cauteriza eam cauterio, usque ad os, cum cauterio cultellari: donec incendantur extremitates eius, & stabit loco eiusdem operis. Et est melius opus, nisi si infirmus habet febrem, aut est calefactæ complexionis. Quoniam cauterium est ex eis, quæ iuuant ad finiendas humiditates. Ergo est melius iuuamentum. Et oportet post extractionem arteriarum, ut impleatur locus cotto antiquo: & ponantur super ipsum puluilli decenter facti. Et post solutionem curetur cum medicinis siccis, quæ faciunt nasci carnem, & cum licinjs, donec sanetur. Quod si interim dum operaris accidit fluxus sanguinis ex arteria, tunc propera ad abscindendum eum cum cauterio, aut ut impleas locum cum zegi: & stringe manum tuam, donec abscindatur sanguis. Quod si nihil ex illis est tibi


præfens, tunc pone super locum digitum tuum, donec congeletur sanguis. Et embroca locum cum aqua uehementis frigoris, donec quiescat acuitas, & stringatur secundum quod oportet. Et ex eo quod est leuius & facilius extractione arteriæ, est, ut cauterizes uenam cum hoc cauterio habente duos cultellos: sitque acuitas duorum cultellorum similis almagdatem. Verumtamen sunt multo minoris acuitatis, quam duo cultelli. Quoniam si sunt acute, sicut duo cultelli, properat utrisque frigus: & non incidunt carnem cum uelocitate. Cum ergo in eis est aliquid quantum grossitudinis, tenetur in eis calor ignis, & abscinditur caro uelociter: cum hoc ergo opus est melius omni opere, & leuius, & facilius. Et sit spatium quod est inter duos cultellos quantitas grossitudinis digiti, postquam tu signas duo loca cum encaustro: & depone utrosque ignitos ualde, donec perueniant ad os, & incidant uenam in duobus locis: ut elongetur quod est inter extremitates eius. nam non consolidantur cum hoc cauterio penitus. Et hæc est forma cauterij.




Q De cura cursus lachrymarum acutarum afflictarum ab oculis. Caput III.
QUANDO sunt lachrymæ assiduæ, & est cursus earum ex uenis, quæ sunt super craneum capitis exterius: & non confert in eis aliquid curationis medicinæ cum medicinis, & uides faciem infirmi iam rubere, & sentit in fronte sua deambulationem, sicut est deambulatio formicarum: & oculi eius sunt extenuati, humidi, ita quod iam corrofi sunt pili eorum cum corrosione: & calefactæ sunt palpebræ eius ex acuitate lachrymarum: tunc antiqui indiguerunt in curatione earum hac operatione, & denominauerunt eam curationem, cum Ense. Et est, ut præcipias infirmo radere pilos qui sunt in fronte sua. Deinde incide in fronte tres fissuras æquedistantes secundum longitudinem frontis: & sit longitudo fissuræ quasi duo digiti, & fissura una sit æquedistans longitudini nasi in medio frontis, & secunda secundum longitudinem parumper a motu lacertorum, & tertia a parte altera: & caue ab incisione arteriarum quæ sunt in duobus lateribus: & elonga manum tuam a continuatione duarum mandibularum, & sit spatium omnis incisionis quantitas trium digitorum coniunctorum: & sit tibi frustum spongiæ præparatum, aut panni siccati multi, cum quibus exsicces sanguinem. Deinde intromitte spatium leue duarum acutarum extremitatum, cuius mox sequens est forma;

B

Curatio cum
Ense.

C
Spatumile.

ab incisione quæ est a parte temporis, usq; ad incisionē secundam: et excoria cum eo totam cutem, quæ est inter duas incisiones, cum sifac, quod est super os. Deinde fac illud etiam ab incisione media usq; ad incisionē secundā. Deinde extrahe hoc spatumile, & intromitte in incisionē primā iterum instrumentū aliud, quod nominatur cultellare acutū, ab una parte lenē, non acutum ab altera parte. & hæc est forma eius.


Cultellare
acutum.

Et pone latus eius acutū uersus carnem annexam cum cute, & latus eius lenē uersus os: & impelle ipsum, donec perueniat ad fissuram mediam: & absconde cum eo omnia uasa, quæ descendūt a capite ad oculos: præter quod continuetur incisio usq; ad illud quod apparet de cute. Deinde fac illud in fissura media usq; ad fissuram aliam. Et postquam currit ex sanguine quantitas æqualis, exprime loca ex frustis sanguinis coagulati. Deinde pone in omnem fissuram licinium ex cotto ueteri, et pone super eos puluillos imbibitos in uino, & oleo, aut aceto. Et uide ut non accidat apostema calidum. Et in die tertia solue ligamentum, et administra infusionē multam cum aqua tepida. Deinde cura illud ex unguento basilicon, et reliquis quibus curantur uulnera: usquequo sanetur.

De cura lachrymarū acutarum & catarrorū ad oculos ex interioribus capitis. Caput v.

QUANDO accidunt alicui catarrhi acuti, acres, assidui: & uides oculos eius extenuatos, paruos, & iam debilitatus est aspectus eorum: et palpebræ ulceratæ, & cadunt pilī ex eis, & in profundo capitis est dolor acutus, lædens, et sternutatio consequens: tunc sume ex istis accidentibus, quod illæ materiæ, et catarrhi non ueniunt, nisi ex uenis multis. Et melior curatio in eis est hæc. Et est, ut præcipias infirmo radere frontem suam. Deinde incide in eam fissuram unā in medio frontis, aut alterius parumper per latitudinem, & incipe cum fissura a tempore sinistro ad tempus dextrum: & sit incisio usque ad os: & elonga manum tuam a lacertis temporum, qui mouentur apud masturbationem: donec quando detegitur os: & exsiccabis totum sanguinem cum spongiā. Tunc separa inter duo labia fissuræ cum cotto ueteri, aut cum licinijs ex lino. Deinde stringe desuper cum puluillis: & imbebe puluillos cum uino & oleo, ut non accidat apostema calidum. Et quando soluis illud, & uides quod apostema calidum iam imminuitur: tunc oportet ut frices os, donec incipiat in eo nasci ca

ro. Deinde cura ipsum cum regimine exiccatio quod facit nasci carnem: sicut si accipias ex farina tritici partes duas, & ex colophonía quatuor partes: & præpares ex eis emplastrum, et administretur ad natiuitatem carnis in istis uulneribus.




De istis Instrumentis non fit mentio apud Auctorum.

¶ De cura eius quod cadit in Aures.
Caput VI.


OMNE QVOD in Aures cadit, est una quatuor specierum: aut lapis mineralis, aut simile lapidi, sicut ferrum, & uirum: aut est ex planta, sicut est cicer, & faba: aut est res fluxibilis, sicut aqua, & acetum, & eis similia: aut aliquod animal. Quando ergo cadit in aurem lapis, aut genus lapidis ex eis quæ non adduntur, neque crescunt in aure, expone Aures soli: si ergo uides lapidem, tunc distilla in Aures aliquod ex oleo uiolato, aut lisamino. Deinde administra extractionem eius, et fac sternutare cum conditi, et opila nares apud aduentum steruationis, postquam tu ponis in circumitu auris frusta ex pannis, aut lana, et extendis aurem ad superiora. multotiens enim egreditur cum hac cura. Si autem non egreditur, tunc administra extractionem eius cum Gestu, id est, Pizigarolis subtilibus: cuius forma est hæc.

Extractio lapidis ex aure.



Gel

Si ergo egreditur cum gestu, est bonum. Et si non, tunc administra extractionem eius cum uncino cæco subtili pauca duplicationis.



Uncinus subtilis.

Si ergo non egreditur per illud, tunc fac cannulam ex ære, & intromitte extremitatem cannulæ in foramen auris multum, et opila quod est in circumitu cannulæ cum cæra mollificata cum oleo, ut non sit uento uia nisi cannulæ: deinde extrahe cum uento tuo attractione forti. Multotiens enim egreditur cum eo quod narrauimus.



Si autem non egreditur hoc modo: tunc accipe ex helkalimbat, aut ex uisco, id est, gluten præparato, cum quo capiuntur aues, rem modicam:

C & pone ipsum in extremitate radij postquam tu inuoluis super eam cotum decenter positum: deinde intromitte ipsum in foramen auris cum facilitate, postquam tu exiccas aurem ab humiditate. Si ergo non egreditur cum omnibus quæ narrauimus, tunc propera ad scindendū, antequam accidat apostema calidum, aut spasmus. Et modus fissuræ est, ut phlebotomes infirmū in primis in cephalica: & extrahe ei ex sanguine secundū mensuram uirtutis eius. Deinde fac federē infirmū inter manus tuas, & conuerte aurem eius ad superiora, & finde fissuram paruam in radice auris apud adipem eius in loco depresso ipsi: & sit fissura lunaris figuræ, donec peruenias ad lapidem: deinde aufer eum cum eo, quod est tibi possibile ex instrumentis. Deinde sue fissuram ab hora tua cum uelocitate, & cura ipsam, donec sanetur.

Extractio
grani.

Quod si res cadens in aurem est ex uno granorum, quæ crescunt, & inflantur: tunc administra extractionem eius. Si autem non obedit tibi ad exitum, tunc accipe spatamile tenue, subtile, secundum hanc formā.

Spatamile.



Et administra cum eo abscisionem illius speciei ex granis, quæ cadunt in aurem, & non facias illud, quando tu cogitas, quod illud granū iam hūmectatum est per uaporem auris, donec ponis ipsum frustra multa: deinde extrahe ea cum uncinis, aut cum gesti subtili, aut cum suctione, sicut diximus, nam extractio eius alleuiatur. In aqua autem quæ ingreditur in aurem, oportet ut utatur infirmus sternutatione cum cōditū in primis: & iam impleuit aurem suam cum aliquanto cotto ueteri: & est iacens super illam aurem, in qua est aqua. Si ergo egreditur per illud, est bonum. Et si non: tunc accipe lapides multos, secundum longitudinē digiti, tenues, lenes, & calefac eos cum igne parumper, & intromittat infirmus ex eis unum in foramen auris suæ: & saliat super pedem suū unum ex illa parte, & percutiat cum lapide alio super lapidem qui est in aure. Non ergo cesset facere illud cum lapide & lapide, donec egrediatur tota aqua. Et iam egreditur aqua ita, ut accipias ex parpyro, aut ex iunco unum, & intromittas extremitatem eius unam in aurem: et accendas extremitatem alteram cum igne, donec comburatur plurimū eius. Deinde itera iuncum alium, et fac illud multotiens, donec egrediatur tota aqua: & extrahe ipsam cum cannula secundū quod præmissum est in lapide.


Extractio
aquæ.

Extractio ani
malis.

In extractione autem animalis intrantis in eam, si est parui corporis, ut pulex, & ei simile, cura ipsum sicut dixi in diuisione. Sed si est corporis magni, quod appareat sensui: tunc administra extractionē eius cum gesti, & uncinis: et res eius est faciliior omnibus, quæ tenentur in aure.

In extractione autē uermis generati in aure, quando curas eum cum eo quod diximus in diuisione, & in tractatu distillationū, & non confert

curatio tua: tunc oportet ut aspicias aurem in sole. Si ergo apparet illic **A** aliquid ex uermibus, tunc extrahe illud cum gestti, aut cum uncinis subtilibus. Si autem non apparet illic aliquid, tunc accipe cannulam, cuius hæc est forma,



stricta inferius, ampla superius: & intromitte extremitatem subtilem in aurem secundū quantitatem quod tolerat eam infirmus: deinde fuge cum ea suctione forti. Fac illud multotiens, donec egrediantur omnes uermes. Si autem non obediunt tibi ad exitum, tunc opila circumitum cannulæ cum cera, sicut dixi in lapide. Quod si non egrediuntur cum eo quod diximus: tunc administra distillationes quas iam experti sunt antiqui in interfectione uermium: & inuenies illud in tractatu distillationum. Et sit effusio tua qua effundis olea & medicinas in aurem cum hoc instrumento, cuius forma depicta est hic.

Liber Distillationum Albulis.



Sicut uides fac ipsum ex argento, aut ære, inferius strictum, in quo sit foramen paruum, amplum superius. Sit ergo ut impellens quod est in concauitate cannulæ, sit ex ære decenter factum. Et si uis, accipe radium, & inuolue in extremitate eius cottum inuolutione decenti: deinde projice oleum, aut succum, aut quod uis ex istis medicinis in cannulam: & ipsa sit in aure: deinde intromitte radium cum cotto desuper, & exprime ipsum manu tua compressione temperata, donec impellatur oleum in concauitate auditus, & sentiat ipsum infirmus interius: & illud quod infunditur in aurem, sit iam calefactum cum igne parumper: & caue ne sit res quæ distillatur in eam frigida ualde: medicinæ enim non tolerant illud. **B**

¶ De cura opilationis accidentis Auri.

Caput VII.

QUANDO QVE egrediuntur quidam infantes ex uentribus matrum suarum non perforati. Et iam accidit etiam quibusdam hominibus opilatio in meatu Auris a uulnere, aut carne nata in ea. Et hæc opilatio quandoque fit in profundo foraminis Auris, quam non consequitur uisus: & quandoque accidit ad exteriora foraminis parum, & consequitur eam uisus. Illa ergo quæ accidit in profundo Auris, et quam non comprehendit aspectus, est in pluribus dispositionibus difficilis sanationis. Et in illa quam consequitur uisus, oportet ut ponas Aures in firmi in sole, et aspicias in ea: tunc si uides opilationem apparentem, accipe eam cum spatulam subtili, cuius forma est hæc quæ sequitur.

Modi opilationis Auris.

C

Sit extremitas eius in qua sit quedam latitudo parua, cuius quedā pars sit acuta: & reliquū spatium sit duarum laterum lenium: ut non lædat aurem. Si ergo opilatio est a carne nata in meatu auris: tunc tene eam cum uncino subtili, et incide eam cum facilitate uehementi, donec auferatur tota caro. Quod si opilatio est in profundo auris: tunc accipera dium subtilem, lenem, & calefac ipsum cum igne parumper: deinde mitte ipsum in meatum auris. Si ergo senseris opilationem cum eo, quod inuenit infirmus cum grauitate auditus, conare apertionem eius cum facilitate: & caue, ne uulneres neruos auris. Deinde pone in aurem licinium secundum quantitatem amplitudinis foraminis, quod inuoluisti in unguento ægyptio: fac illud aliquot diebus, donec sis securus de consolidatione uulneris. Aut accipe licinium, & infunde ipsum in aqua rosata, & pulueriza super ipsum zegi tritum, et utere ipso. Quod si uides aurē iam apostemari: tunc oportet ut extrahas liciniū, et permittas ipsum cū licinio alio, quod inuolues in cæroto quod sit factū cum oleo rosato, donec sedetur apostema calidum: deinde cura ipsum usquequo sanetur.

D Si autē accidat fluxus sanguinis: tunc submerge spongiam, aut panos in aqua frigida, et pone super eam aurem: et utere reliqua curatione, quæ abscindit fluxū sanguinis prædicta in tractatu distillationum.

De cura Altheli palpebrarum.

Caput VIII.

I S T I Altheli qui accidunt in Palpebris oculi, quandoque sunt humidi, & sunt sicci. Oportet ergo ut teneas eos cum tenalijs: aut cum uncino, & incidas eos cum spatium a radicibus suis. Deinde pone super loca zegi tritum. Si autem ex eis fluat sanguis, tunc cauteriza eos cum cauterio lenticulari subtili. Et cauterizare eos, est melius post incisionē. Multotiens enim redeunt quando remanet ex radicibus suis aliquid. Et quando cauterizantur cum igne, comburuntur illæ radices, & non redeunt.

De cura Grandinum palpebrarum oculi.

Caput IX.

M V L T O T I E N S accidit in palpebris aliquid quod assimilatur Grandini in fortitudine sua, & sua duricie, et propter illud nominatur Grando: et est aggregatio humiditatis grossæ in palpebra superiore, & palpebra inferiore. Operatio ergo in eis est, ut consideres tunc, si est Grando procedens in eo, quod apparet de palpebra, et mouentur ad omnem partem, & res eius est facilis. Finde ergo super eam fissura per latitudinem. Deinde excoria eam ab omni parte cum facilitate, donec euadat. Deinde suspende eam cum uncino, & abscinde ipsam. Si autem non præparatur ubi abscisio eius, nisi postquam tu penetras pal-

Grando palpebrarum.

pebram cum incisione parumper, tunc nocet infirmo, illud in aliquo. **A** Quod si fissura est magna: tunc aggrega ipsam cū futura: & cura ipsam, donec sanetur. Et si est parua, non superueniet tibi malum ex ea. Vnguentum enim restaurat ipsam, & incarnat eam. Et si grandō est decliuis ad interiora auris uersus superficiem intrinsecam, tunc inuersa palpebram, & suspende grandinem cum uncino: præter quod indigeas incisione, & preme eam ab omni parte. Quod si elongatur palpebra per incisionem, non nocet illud in aliquo. Deinde ablue oculum post incisionem grandinis, cum aqua falsa: & cura locum cum eo quod incarnat, donec sanetur infirmus.

¶ De cura Axirnath palpebrarum.

Caput x.

A X I R N A T H est adeps qui generatur in tuniis palpebræ superioris: & plurimum quidem accidit illud pueris: & ipsum grauat oculos eorum, & accidunt eis catarrhi in matutinis, et non possunt intueri lumen solis, propterea, quod lachrymæ properant ad eos, & propter illud uides eos discumbere super facies suas semper, & super eas dormiunt, & sunt palpebræ eorum sub supercilijs humidæ, quas iam cooperuit inflatio: & eminentia quidem Axirnath apparens est oculo, & quando tu premis locum cum digitis tuis, sentis Axirnath inter eos. **B** Et modus operationis eius est, ut ponat infirmus caput suum in sinu tuo. Deinde accipe pannum lini, & præpara in eo licinia, & fac ex illo licinio circulum secundum quantitatem quod continet Axirnath ab omni parte. Deinde pone eum super eam, & preme cum digitis tuis ab omni parte, ut aggregetur Axirnath in medio circuli. Deinde finde in medio illius humiditatis cum spatumili incidente fissuras per latitudinem, & non sit fissura maior illa quæ sit in phlebotomia in profundo. Aut oportet ut findas cutem totam, donec peruenias ad Axirnath. in pluribus enim dispositionibus procedit Axirnath ex fissura secundum formam frusti pinguedinis albæ. Extrahe ergo eam cum panno, quem infiltraisti inter digitos tuos, ad exteriora: & tu reuoluis manum tuam ad dextram & sinistram, donec dispergatur: & caue, ne addas in fissura, ut non peruenias cum spatumili ad oculum, & lædas eum. Si autem non appareat tibi Axirnath in principio fissuræ, tu addas in fissura parum cum facilitate, donec procedat Axirnath. Deinde extrahe eam, sicut diximus. Deinde submerge pannos in aceto et aqua, et pone eos super locum, et stringe eum cū puluillis. Et ex hominibus sunt qui terunt salem, & ponunt ipsum in concauitate fissuræ, ut liquefiat quod remansit ex illa humiditate. Deinde cura ipsam, donec sanetur. Si autem accidat in loco apostema calidum, tunc cura ipsum cum emplastris sedatiuis, donec sanetur.

Axirnath palpebrarum.

C

De modis Ataxmir oculi, id est, cum palpebra mollificatur oculi, unde fit ut rugetur sicut non debet. Caput XI.

Q


VANDO nascuntur in palpebris oculi pili additi, prater cursum sub pilis naturalibus, et antiquantur: tunc ipsi nocent oculo, & faciunt accidere modos aegritudinum, sicut lachrymas asfidas, et mollificationem palpebrarum, & albuginem, donec fit illud causa destructionis oculi. Et Ataxmir quidem oculi curatur secundum quatuor modos. Aut per cauterium cum igne: Aut cum medicina acuta, secundum quod premissum est in capitulo cauterij. Aut curatur Ataxmir per incisionem & futuram. Aut per cannas, secundum quod ego dicam. Oportet ut ponas caput infirmi in sinu tuo. Deinde conuerte palpebram oculi manu tua sinistra. Si ergo conuertitur, bonum est. Et si non: intromitte acum in eam, in qua sit filum ab inferiori parte palpebrae, & fac penetrare acum cum filo desuper, et sit illud prope pilos ipsos, id est, prope marginem palpebrae, in quo nascuntur pili: & trahe filum ad superiora cum palpebra, et conuerte eam cum radio. Deinde sinde in inferiori parte palpebrae sub pilis additis cum spatumili incidente a lachrymali maiore usque ad lachrymale minus. Deinde extrahe filum, et pone sub palpebra puluillum paruum ex cotto, aut panno: deinde signa super palpebram cum encaustro, quod sit sicut figura folij myrti.

D


Verumtamen oportet, ut sit figura secundum quantitatem & elevationem palpebrae: quoniam iam diuersificatur illud in hominibus. Ex eis enim est, qui indiget ut incidatur ex palpebra quantitas magna, secundum quantitatem quam mollificatur a palpebra. Deinde cum spatumili sinde super duas lineas quas signasti, et incipe a lachrymali maiore usque ad lachrymale minus, et sit fissura una prope pilos naturales, sicut est grossitudo radij. Deinde intromitte uncinum in uno duorum angulorum cutis. Deinde excoria ipsam totam. Deinde aggrega cum futura duo labia, cum acu & filo lana subtili: & absterge sanguinem, et fac adhaerere quod superfluit ex filis super duo supercilia, cum quibusdam rebus inuisantibus, si uis facere illud: & si non, non cures. Deinde dimitte futuram & fila usque ad tres dies, aut quatuor: postea cura illud: & si uis, dimitte uulnus absque futura, & cura ipsum cum eo, quod exsiccat & constringit. Nam palpebra eleuatur apud sigillationem uulneris & aggregationem eius: sed futura est melior. Hunc modum curandi Ataxmir docuerunt antiqui. Verumtamen in eo est sollicitudo super infirmum, & est ex bona operatione, & non est in eo timor.

Et modus alius est in Ataxmir etiam: & est, ut signes super palpebram figuram, quam sit sicut figura folij myrti, sicut narrauimus. Deinde eleua palpebram cum tribus uncinis separatis, aut aggregatis, secundum formam hanc quam sequitur,

Cura quadiu
plex Atax-
mir.




Deinde incide quod superfluit cū forcibus paruis, scđm hanc formā,



cum æqualitate incisionis. Si autē non est tibi possibile tenere uncinum, & non æquatur illud : tunc accipe acum in qua sit filum , et intromitte ipsum in medio figuræ : et intromitte filum aliud prope lachrymale maius, & filum secundum prope lachrymale minus : et aggrega inter digitos tuos fila cum æqualitate. Deinde eleua manum tuam eleuatione æquali : et eleua cutem super quam est signatū cotum , sicut narrauimus. Deinde aggrega duo labia uulneris cum sutura : et cura ipsum , donec sanetur. Si uero accidat apostema apud incisionem tuam , aut fissuram tuam : sedit illud apostema cum cæroto , & his similibus , ex unguentis sedantibus . Et quandoq; accidit palpebræ etiam , ut conuertantur pili eius. Oportet ergo ut utaris in ea quod diximus in incisione : sed futura utrisque magis est artificialis.

¶ De cura Ataxmir cum cannis.

E T E S T , ut conuertas palpebram , & scindas fissuram quæ est deintus , secundum quod narraui. Deinde arte fac duas cannas , aut duo ligna subtilia : quarum longitudo sit secundum longitudinem palpebræ , et latitudo earum sit minor latitudine spatumilis : & tu iam incidisti in extremitatibus utriusq; ab utrisq; partibus ubi tenes fila. Deinde aggrega utramq; cum subtilitate super illud quod superfluit ex palpebra oculi , et stringe duas cannas ab utrisque partibus strictura forti , & dimitte eam diebus aliquot . Cutis enim stricta morietur , et denigrabitur , & putrefiet , donec cadet per se. Si ergo tardatur , tunc incide eam cum forcibus . Deinde cura eam , donec sanetur . Cum ergo consolidatur , eleuatur palpebra : & non pungunt pili. Et hæc est forma duarum cannarum , quas facies secundum hanc figuram , et quantitatem in longitudinem & latitudinem.



¶ De eleuatione pilorum pungentium in oculo cum acu. Caput XII.

O P E R A T I O in illo est , ut accipias acum subtilem , & intromittas in eam filū ex serico subtile , lene. Deinde aggreges extremitates eius , & nodes utramq; nodo subtili ualde : & sit longitudo filorum palmarum unus. Deinde compone in Alinxotati filum aliud subtile sub eo in breui , & noda extremitates eius si uis . Deinde ponat infirmus caput

C suum in sinu tuo, et sit prope solem ut declaretur operatio: quoniam est operatio subtilis, uel minuta. Deinde intromitte acum cum alinxotati in radicem palpebræ, et fac eam penetrare in palpebram festināter, donec extrahas eam desuper pilum naturalem. Deinde trahe pilum usq; supra alinxotati: & intromitte in alinxotati illum pilum: si est unus, aut duo, aut tres, non plures. Deinde trahe manum tuam cum eo, donec egrediatur pilus cum alinxotati in palpebra cum pilo naturali. Si autem trahatur alinxotati, et non egrediatur pilus cum ea: trahes alinxotati ad inferiora, cum filo quod tu composuisti in ea, donec egrediatur alinxotati ex foramine superiori, & uideas eam uisione oculi: tunc enim trahes alinxotati, & filum: et extrahes utraque, & claude oculum: et dimitte ipsum clausum duobus diebus, aut tribus, donec adhareat pilus loco suo, & nascatur super ipsum caro. Quod si pilus est breuis, tunc aut associa ei pilum longū ex pilis naturalibus, et eleuatur cū eo: aut dimitte ipsum, donec elongetur post spacium, & tunc eleua ipsum.

¶ De cura Alxatrati quæ accidit in palpebra superiori. Caput XIII.

Leporina.

Q V A N D O accidit oculo hæc Alxatrati, nominatur Leporina. Et hæc Alxatrati est aut naturalis, aut accidentalis. Accidit ergo fit ex consolidatione uulneris, aut sectionis, aut cauterij, & similibus illis. Et modus operationis in ea est, ut tu findas illam consolidationem, et ut separeas labia eius, & ponas in eo quod est inter ea licinium ex lino, et liges eam, donec sanetur. Et non oportet, ut utaris in curatione eius rebus quæ exsiccant & constringunt: nam si tu facis illud, redit Alxatrati deterior quam fuit: imo utere in ea rebus quæ mollescant, sicut scenumgræcum: et embroca cum aqua, in qua cocta sit althea, femen lini: et unguento dyaquilon, quod liquefactum sit cum aliquo ex oleis: & inuolue cum eo licinium, et cura cum eo. Et thesaurus curationis tuæ est, ut coneris omni ingenio, ut non consolidetur, secundum formam quæ fuit in primis. Et hæc quidem operatio quam diximus, non est nisi quædam rectificatio Alxatrati, ut non redeat forma loci secundum quod fuit omnino.

¶ De cura Alxatrati quæ fit in palpebra inferiori, et est rugatio uel contractio sursum ad dextrum & sinistrum. Caput XIII.

H A E C A L X A T R A T I quæ fit inferius, est quæ uere nominatur Alxatrati. Et est naturalis, et est accidentalis. Et accidentalis fit ex uulnere, aut fissura, aut cauterio, et illis similibus. Et uia operationis in ea est, ut accipias acum, in qua sit filum duplum, & tingas eam in carnem, et facias eam penetrare a lachrymali sinistro usque ad lachrymale dextrum, donec perueniat filum in duabus extremitatibus carnis. Deinde exten-

A de carnem atq; superiora cum acu, & incide eam cum spatumili lato. Si ergo redit figura palpebræ secundum quod oportet, est bonum. Et si non, accipe radiū, et pone ipsum in fissuram, & conuerte cum eo palpebram; & fide duas fissuras in latere interiore palpebræ, et sint extremitates duarum fissurarum ex duobus angulis incisionis, donec concurrant & fiat ex eis angulus; donec quando aggregantur fiat figura earum hæc figura, & est litera lauda græca. Deinde aufer illam carnem per quantitatem, quod est latus eius acutum inferius, ab eo quod sequitur palpebram. Deinde aggrega partes separatas: sue eam cum filo lanæ. Deinde cura eas cum eo quod diximus, de medicinis mollificantibus, et licinijs, donec sanent.



Et si Alxatrati accadat ex fissura, et sutura, aut cauterio: tunc oportet ut findas fissura plana sub pilis palpebrarum, etiam secundū quod præcessit. Deinde separa inter duo labia cum licinio, secundum quod diximus. Et summa sermonis de cura Alxatrati, quando est desuper, aut inferius, est, ut currat in ea operatio, secundum quod præparatur ex forma Alxatrati. Ipsa namq; est multarum diuersitatum in forma: et artifex prudens præparat ingenium cum quocuncq; modo est possibile ei, donec redire faciat figuram ad formam naturalem, aut prope eam, & ipse met infirmus, secundum quod conuenit ei ex operatione & instrumentis in plurimis dispositionibus.

Q De adhaerentia palpebræ oculi cum coniunctiua, aut cornea. **B** Caput xv.


Q V A N D O Q V E accidit hæc consolidatio multis hominibus, ita ut consolidetur palpebra superior cum albedine oculi, et prohibeat ipsum ab operationibus suis naturalibus. Oportet ergo quod intromittas extremitatem radij sub palpebra, et eleues eam sursum: aut extendas eam cum uncino: deinde incide adhaerentiā cum spatumili subtili, quod non sit cum acuitate incisionis spatumilium, imo sit obtusum parumper: ut non inquietetur infirmus apud operationem, et remoueat spatumile, et lædat oculum cum acuitate sua: et sit incisio tua quasi tu excories illam adhaerentiam cum facilitate, donec quando redit palpebra secundum formam suam naturalem, et sanetur adhaerentia tota. Funde tunc in oculum aquam falsam, cum aqua ablue ipsum: aut distilla in ipsum ex sief factio, ex ziniar dissoluto cum aqua. Deinde separa inter palpebram & oculum cum licinio lini: et pone super oculum laniam infusam cum albugine oui: & post diem tertium utere sief, et cum solidatiuis, donec sanetur.

S De incisione ungulæ & eminentiæ carnis laichrymarum. Caput xvi.

S C I A S, quod ungula est secundum duos modos. Aut est neruosa: & est similis sisac duro, subtili. Aut est non neruosa, similis humidis

Vngula oculi duplex.

C tati congelatæ albæ: quæ quando tangit eam ferrum, aut conaris capere eam cum uncino, abscinditur, & non figitur in ea uncinus. Et utræque species non incipiunt, nisi a lachrymali maiore, usquequo uadit paulatim, donec cooperit uisum, et prohibet lumen, & motum oculi. Et modus operandi in incisione eius est: ut ponat infirmus caput suum in sinu tuo. Deinde aperi oculos eius, et eleua palpebram manu tua. Deinde collige ungulam cum uncino paucae duplicationis, et extende eam ad superiora. Deinde accipe acum, & intromitte in eam pilum ex pilis equi, et bovis, aut uaccæ: et sit filum forte, & duplica extremitatem acus parumper, & fige eam in medio ungulæ: et penetra eam cum acu, & liga cum filo ungulam, & extende eam ad superiora: et excoria cum pilo latus ungulæ quod sequitur pupillam, ac si tu serres eam cum pilo usque ad postremum eius. Deinde incide residuum in radice lachrymalis cum spatumili subtili, aut cum forficibus paruis: & dimitte carnem lachrymalis naturalem, ut non accadat ex incisione eius cursus lachrymarum assiduus. Et quandoque extenditur ungula cum uncino solo: aut cum filo, sicut diximus. Deinde excoriatur cum spatumili leni, cuius hæc est forma.



D Et caue, ne tangat spatumile tunicam corneam, et accadat in ea ruptura, & perforetur pupilla. Deinde post incisionem, proijce in oculum aliquid salis contriti, aut ex sief facto ex ziniar, et dimitte ipsum usque ad diem alium. Deinde cura ipsum cum eo quod oportet, usquequo sanetur.

Quod si ungula est non neruosa, et non potes intromittere in eam acum, neque figitur in ea uncinus, tunc multotiens curatur hæc species ungulæ cum medicinis, et sanatur sicut narraui in diuisione. Quod si uis incidere eam, tunc aperi oculum infirmi, et accipe spatumile subtile, lenè, debilis acuitatis, secundum hanc formam.



Et rade ungulam desuper racione cum subtilitate. Quod si uides quod ipsa rarificatur & confringitur, et imprimit in eam rasio, tunc distilla ex hora tua in oculum ex sief facto ex ziniar, aut ex sief rubeo, aut sale trito: et opila oculum usque ad diem alium. Deinde itera super ipsam operationem, donec remoueatut totum eius. Nisi contrarium sit tibi in oculo apostema calidum: tunc enim dimitte ipsam, et cura apostema, donec sanetur. Deinde itera operationem super ipsam cum racione, donec sanetur. Eminentia autem carnis lachrymalis, si nocet in oculo nocumeto magno, suspendat cum uncino, et incide ex ea partem eius: et non ultimes incisionem, ut non accadat cursus lachrymarum. Deinde stilla in lachrymale sief rubeum, aut factum ex ziniari, donec sanetur.

¶ De incisione Alguardenici, et carne nata in oculo. Caput .XVII.

A

NASCITVR quandoq; in quibusdam oculis hominū caro rubea composita, uel superposita, donec cooperit pupillam, aut appropinquat, aut stringit super palpebras, et fortasse conuertit palpebras ad exteriora: et assimilatur rosæ balaustinæ. Et operatio in ea etiam est, ut ponat infirmus caput suum in sinu tuo. Deinde aperi oculos eius, & collige illam carnem totam cum uncinis conuenientibus ad illud: & tene illud cum forcipe uno, aut gesti. Deinde incide carnem in primis, donec finiatur totum eius cum incisio. Et caue ab oculo, ut non ledas ipsum apud operationem: et sit incisio tua qua ipsam incidis, aut cum spatulili, quod narrauimus in incisione ungulæ: aut cum forcicibus paruis, cum quibus colligitur afebel, secundum quod ueniet forma eius post hoc capitulum. Cum ergo completur incisio tua, et remouetur tota alguardenici, tunc imple oculum ex sale contrito: aut distilla in eum puluerem rubeum, et similia illi ex medicinis corrosiuis: & pone super oculum deforis cottū cum albugine oui: ut securetur ab apostemate calido.

Quod si remanet ex alguardenici aliquid, et dominatur tibi sanguis calidus, & times apostema calidum: tunc dimitte oculum, et cura ipsum cum eo quod sedat apostema. Deinde itera super ipsum cum operatione, donec sanetur. Et similiter fac cum carne addita quæ accidit in oculo ex hac specie. Verumtamen oportet, ut alienes curationem omnis oculi debilis ex uia naturali, aut ex uia accidentali, operando cum ferro: & non intromittas manum tuam in aliqua harum operationum, donec ui deas, quod illud membrum est tolerans illam operationem.

B

¶ De collectione Sebel ex oculo.


Caput .XVIII.

SEBEL sunt uenæ rubæ quæ texuntur super oculum, et prohibent uisui operationem suam: & debilitant oculum cum longitudine dierū. Necesse est ergo tibi in primis, ut consideres, si oculus in quo est Sebel, est fortis, & non est in eo ægritudo aliqua, præter Sebel: tunc collige Sebel eius. Et est, ut præcipias infirmo, ut ponat caput suum in sinu tuo. deinde suspende illas uenas cum uncino uno, aut duobus secundum prudentiam tuam: & sit uncinus subtilis duplicationis, secundum hanc formam,

Sebel.



Aut sint duo uncini gradati in corpore uno, secundum hanc formam,



Deinde collige cum forcicibus subtilibus illas uenas cum subtilitate, &

C absterge sanguinē hora post horam, donec uideas illas uenas remoueri ex oculo, & resoluūtur: et caue ne lēdas oculū cum extremitatibus spatulil. Et sit operatio tua in meridie coram sole, & sis firmus in operatione tua ualde: ut non incidas nisi illas uenas. Et cum tu expleueris, tūc distilla in oculum sief uiride, aut rubeum: ut sua acuitate corrodat quod remansit ex sebel. Si autē non est tibi possibile colligere illud totū in illa hora, tunc emplastra oculum cum eo, quod sedat dolorem oculi: et dimitte ipsum diebus aliquot, donec sedetur dolor eius: & securetur ab apostemate calido: deinde itera super ipsum secundum modum eundem, donec sanetur. & hæc est forma forficis.



Arissari, fistula.

N **DE** reductione Arissati ad nasum. **Caput XIX.**
N O M I N A N T medici Arissati Fistulam, quā curas cum cauterio, aut cum medicina acuta comburente, secundū quod præcellit eius narratio. Et si non sanatur, tunc non est ingenium in eam: nisi ut findas super apostema apud natiuitatem eius, & extrahas totam humiditatem quæ est in eo & pus, donec detegatur os. Cum ergo detegitur os, & uides in eo corruptionem, aut nigredinem, tunc rade ipsum cum instrumento, cuius forma est hæc.

Asperi capitis.



Et nominatur Asperi capitis. Fiat ex ferro indo, & sit caput eius rotundum sicut azir, quod sit punctatum punctatione limæ, aut punctatione aliskilferi punctatione subtili: & pone ipsum super locum corruptum ossis. Deinde reuolue ipsum inter digitos tuos, & tu preme manū tuam parumper, donec scias quod illa corruptio iam rasa est: & fac illud alio quotiens. Deinde restaura locum cum medicinis exiccatisu stipiticis. Si ergo consolidatur locus, et nascitur in eo caro, & abscinditur cursus saniei: et remanet quadraginta diebus, & non renouatur, et non apostematur, et non accidit in eo accidens: tunc scias quia iam sanatus est. Et si non, tunc non est in eo ingenium, nisi reducere fistulam ad foramen nasi, secundum hanc formam. Et est, ut detegas ab osse secundo cum ferro, aut cum medicina acuta: & cum detectum est os, tunc accipe teretrum secundum hanc formam,



Sit extremitas ferrea, triangulata: & lignum eius sit pyramis extenuata usque ad extremitatem, sicut uides. Deinde pone illud super os ipsum:

& sit illud prope lachrymale: & elonga manum tuam ab oculo parum. **A**
Deinde reuolue manum tuam cum terebro, donec penetret os, & sen-
tias illud infirmus: per hoc quod inuenit uentum exire ex eo, quādo te-
net manū suam super nasum suum. Ergo tunc restaura locum cum me-
dicinis stipticis exiccantibus, sicut docui te. Cum ergo nascitur caro, et
induratur locus: tunc materia quę effundebatur ad exteriora, redit ad na-
sum: est ergo leuius illud super infirmum.

¶ De reductione eminentiæ Oculi.

Caput xx.

QUANDO eminet Oculus cum totalitate sua, et non accidit in-
uisu nocumentum, neq; diminutio: tunc oportet ut soluas
infirmum: deinde phlebotomes eum: postea ponas uentosas in ceruice
absq; scarificatione, sed cum suctione. Deinde pone super Oculum lini-
mentū quod fit ex acacia, & aloë, et olibano, & sarcocolla. Deinde strin-
ge Oculū desuper super emplastrū cum puluillis multis. Et modus pul-
uillorū est: ut accipias pannos lenes, multos, et duplicetur omnis pānus
ex eis super quatuor: fac ex eis multos: deinde pone eos unū super aliū,
secundū quantitātē qua indiget Oculus: deinde stringe super ipsos cum
panno duro stricture forti. Et itera uentosas cū suctione sine scarificatio-
ne. Deinde aufer uentosas, et dimitte oculū strictum die & nocte. Si autē
ligamentū iterum mollificatur, tunc oportet ut stringatur multū: deinde **B**
aufer ligamentū post diem & noctem, sicut diximus. Si ergo uides ocu-
lum iam redisse uuæ tunicæ, est bonum: & si non, tunc itera emplastrū,
& puluillos, et stricturem, & uentosas, donec sanetur.

¶ De incisione Vuæ tunicæ. Caput xxi.

QUANDO accidit disruptio in tunica Vuæ, deinde eminet &
procedit extra palpebras sicut granum Vuæ, & fœdatur forma
hominis propter illud, & uis incidere illud: tunc operatio
in eo est, secundum quod narro: et est, ut intromittas acum in radice Vu-
uæ ab inferiori ad superiorem partem. Deinde intromitte acum aliam
in qua sit filum duplum a parte lachrymalis, & fac eam penetrare: & di-
mitte acum primā secundum dispositiōem suam. Deinde incide locum
fili dupli, et liga cum eo partem Vuæ in circumitu acus: & stringe eam
multam. Deinde extrahe acum, et pone super oculū lanam infusam in
albugine ouī: et dimitte eum, donec cadat filum cum Vuæ. Deinde cura
oculum cum eo, quod confortat ipsum, donec sanetur uulnus. Et quan-
doq; stringitur Vuæ ab omni parte cum circulo ex panno, donec addat
oculus eminentiam magnam. Deinde perforetur cum spatulam subtili,
quod perueniat ad profundum oculi, & currat humiditas albuginea,
& descendat oculus, & ingrediatur statim: deinde
de stringe eum, donec sanetur.

C

De curatione Alcomnati. Caput XXII.

Alcomnati.

HAEC ABGR Itudo quæ nominatur Alcomnati, non, est nisi sanies, quæ aggregatur in oculo, similis aquæ descendenti, & non est ipsa. Et modus operandi in ea est, ut facias sedere infirmum super sedem præparatam, uel directam. Deinde accipe caput eius manibus tuis a partibus duabus, et moue ipsum, donec uideas saniem peruenire ad inferiora oculis tuis. Deinde figatur, & non descendat, et absoluat lumen: & uideat infirmus res sicut uidebat: et si non descendit inferius, scias quia est aqua. Si autem non præparatur descensus saniei cum eo quod diximus, tunc fac sedere infirmum inter manus tuas. Deinde accipe spatium subtile, & finde cum eo supra panniculū corneum parumper apud continuationem coniunctiue cum tunica cornea in corona, donec egrediatur sanies. Cum ergo egreditur, tunc distilla in oculum aquam calidam in qua miscuisti mel: aut aquam in qua iam bullisti scenum grecum & mel: deinde curetur cum reliqua curatione, donec sanetur.

I

De cura aquæ, quæ descendit in oculo, uel catarracta. Caput XXIII.

D

LAM DIXIMUS species aquæ in diuisione, & quæ conuenit ad perforandum sermone declarante & exponente, tunc accipe illud idem secundum sanitatem. Tunc ergo oportet ut facias sedere infirmum inter manus tuas quadratū, oppositum luminī, prope solem: & liga oculum eius sanū, & stringe eum ualde: deinde palpebram oculi eius manu tua dextra, si oculus in quo est aqua, est oculus sinister: aut manu tua sinistra, si oculus est dexter. Deinde accipe manu tua dextra almagda, si oculus est sinister: aut manu tua sinistra, si oculus est dexter. Deinde pone extremitatem almagda prope coronam per grossitudinem radij in ipsa albedine oculi apparente lachrymalis minoris: deinde impelle almagda cum uirtute: & tu reuoluis cum eo manum tuam, donec penetret in albuginem oculi: & sentias, quod almagda iam peruenit ad rem uacuam. Et oportet, ut sit mensura itineris almagda ad profundū, mensura spacij quod est a pupilla usque ad finem nigredinis: & est corona oculi. uidebis enim ea in ipsa pupilla uisione oculi, propter claritatem tunice corneæ. Deinde pone almagda usque ad locum in quo est aqua. Deinde preme ipsum inferius uice una post aliam. Si ergo descendit aqua statim, tunc infirmus uidet illud super quod aperit uisum suum statim, & almagda in oculo suo. Deinde quiescas paululum. Si ergo descendat aqua, tunc depone eam secundo, præter quod egrediatur almagda. Quando ergo figitur, & non ascendit: tunc extrahe almagda cum facilitate: & tu reuoluis manum tuam paulatim. Deinde dissolue in aqua liquid ex sale claro gemmæ: & ablue cum eo oculum deintus. Deinde pone extra oculum totū stuppam, aut lanam infusam oleo rosato, et al-

bugine oui: & liga cum eo oculum sanum. Nos autem, et illi qui sunt A
nostri temporis, ponimus super eum ciminū tritum cum albumine oui.

Quod si non obedit tibi almagda ad introitum in oculum propter
duriciem suam, quoniam ex hominibus est, cuius oculus est durus ualde:
tunc oportet ut accipias spatūmīle, quod nominatur Alberid, cuius
hæc est forma.



Alberid.

Perfora ergo cum eo ipsam coniunctiuam tantū, & non ultimes manum
tuam in foramine: et non est nisi ut facias uiam ad almagda locum subti
lem. Deinde intromitte almagda, secundum quod diximus. Et apud
complementū operis tui, præparetur infirmo dormitorium decenter fa
ciū, in quo dormiat super dorsum suum in domo tenebrofa: & prohibe
atur ab omnibus motibus, & a tussi: & pone cibum eius illud quo les
nitur natura eius: & non moueat caput suum dextra, neq; sinistra omni
no. Et sit ligamentum secundum dispositionem suam usque ad diem tert
ium. Deinde solue illud in illa domo tenebrofa, & experire uisum eius:
& fac eum uidere res. Deinde reduc ligamentum usque ad diem septi
mum. Et non oportet ut faciat illud in hora curationis, aut post incisio
nem statim: imo oportet, ut alienes illud: propterea quod aqua ascen
dit uelociter per aspectum uehementem. Si autem accidit apostema B
calidum: tunc oportet ut soluas oculum ante septimum: & rectifica il
lud cum eo quod sedat apostema, donec sedatur: tunc absolue ipsius uis
um, & pone super faciem eius orale quo regatur uisus eius sub eo die
bus aliquot, ipso existente in illa domo tenebrofa. Deinde egrediatur a
domo gradatim, et cōuerſet in calis suis. Et scias, quod in * zaltea non
excusatur discipulus a uisione aliquotiens: tunc enim audeat super ope
rationem. Etiam quidem peruenit ad nos quidam ex illis qui sunt de
Alayrach, qui dixit, quod factum fuit in Alayrach magdan perfora
tum, quo fugitur aqua. Verum ergo non uidi aliquem in terra uostra,
qui fecerit illud: neque legi illud in aliquo ex libris antiquorum: & est
possibile, ut sit illud nouum. Et istæ sunt formæ specierum ex magda,
ut stet super ea qui ea ignorat. Fiant ex ære proprie: & sint extremitates
eorum cum hac eadem subtilitate triangulate, & extremitas acuta.

* Alia, * alca
thea,

Formæ magda.



C


De cura Carnis natae in naso.

Caput

XXIII.

QUANDO QVE nascuntur in naso Carnes diuersae additae, ex quibus est aliquid quod assimilatur scorpionum multorum pedum: et ex ea est caro cancerosa, lapidea, fusci coloris: et ex ea est quae est caro lenis, non fusci coloris. In ea ergo quae ex istis carnibus est lenis, non fraudulenta, neque cancerosa, oportet ut facias sedere infirmum inter manus tuas oppositum soli, & aperi nares eius, et proijce uncinum in illas carnes: deinde trahe eas ad exteriora, & incide quod comprehendisti ex eis cum spatulili subtili acuto a parte una, donec scias quod caro tota iam ablata est. Quod si remaneret aliquid ex ea cuius abscissio non est possibilis: tunc rade illud cum uno instrumentorum subtilium cum facilitate, donec non remaneat ex eo aliquid. Si autem sanguis tibi dominatur, aut accidat apostema calidum: tunc oppone ei per id quod oportet: aut est ex apostematibus malignis, tunc propere cauterizando eum, donec abscindatur sanguis, et auferantur omnes carnes. Deinde proijciatur in nasum post incisionem acetum, & aqua, aut uinum. Si autem aperitur nasus, et procedat ex eo humiditas usque ad palatum, tunc scias quia iam sanus est. Si uero non penetrat humiditas, secundum quod oportet, tunc scias quod intra ipsum est caro nata in superioribus ossibus naris, ad quae non peruenit cum incisione instrumenti. Tunc ergo oportet, ut intromittas filum lini cui sit quaedam grossitudo, & noda in eo nodos multos: et pone inter omnem nodum quantitatem digiti, aut minus: et ingeniet infirmus, ut mittat extremitatem unam fili in nasum cum radio, aut cum quo possibile est ei postquam fecerit ipsum simile azer: & trahat odoratum suum, donec perueniat usque ad caassum, et egrediatur super guttur suum. Et multotiens quidem faciunt simile huic Attomi pueri in scholis: & est res facilis ei, qui uult. Deinde pone duas extremitates fili, extremitatem unam quae egreditur super nasum, & alteram quae remansit in naso. Deinde ad sinistra serraturam carnis cum nodis qui sunt in filo. Fac illud donec scias quod carnes iam sunt cum nodis fili. Deinde extrahe filum: & pone in nasum post abstersionem sanguinis licinium quod imbibisti in unguento aegyptio: fac illud tribus diebus, aut plus, donec unguetum corrodat totum quod remansit ex carnibus. Deinde pone in fine rei in nasum cannulam de plumbo, diebus aliquot, donec sanetur. Si autem indiget curatione quae exiccet, utere illa. Ad caput purgium faciendum, cum quo distillant olea, & aliae medicinae in nasum, fac illud ex argento, aut aere: quod sit simile lampadi paruae, apertum sicut conchula: & meatus eius similiter. Et si uis fac cannulam clausam, sicut canna. Et conchula instrumenti ad caput purgium faciendum, sit plena, detecta: cui sit manubrium in postremo eius, cum quo teneas ipsam, quando calefacis in ea oleum, aut

quod uis ex succis, & rebus fluxilibus. Et hæc est forma instrumenti. A



¶ De cura Thelul nasi.

Caput xxxv.

MULTOTIENS nascitur in extremitate nasi Thelul, & magnificatur, & augmentatur cū diebus, donec scædus fit aspectus eius. Et propter illud oportet, ut incidas illud in principio apparitionis eius, & eradices totum eius. Deinde pone super locum, aut cauteriū, aut medicinam comburentem quæ stat loco eius. Si ergo tardatur incisio eius, donec magnificetur, tunc considera, si est lapideum, durum, fusci coloris, pauci sensus: tunc non tangas ipsum cum ferro: quoniā apostema est cancerosum. Multotiens enim uidi, qui incidit hmoi apostema, & accidit ex eo malicia magna super illum qui ipsum habebat: Et si apostema est lenis tactus, non fusci coloris, & uides quod incisio possibilis est in toto eius, tunc euacua infirmum, & incide ipsum sine timore, absque pauore: & cura locum cum eo quod exiccat & constringit, donec sanetur.

Segna aposte
maris can-
crofi.

¶ De futura nasi, & labij, & auris.

Caput xxxvi.

SCITAS QVIA quando accidit solutio continuitatis in una harum cartilaginum, parum confert in ea operatio, nisi in quibusdam hominibus. Oportet ergo quando accidit alicui aliquid ex illo, ut consideres, si est uulnus recens cum sanguine suo: & tunc aggrega duolabia uulneris cum futura: deinde cura ipsum, donec sanetur. Et si solutionis continuitatis labia iam separata sunt, & facta est unaquæq; pars sana: tunc oportet ut excories omnem partem a cute sua apparente, donec sanguinetur. Deinde aggrega duo labia cum futura, et stringe ea, & pulueriza super ipsum sanguinem draconis, & olibanum trita: & pone supra pulueres frustum emplatri diafinicon, & alicuius alterius ex emplastris consolidatiuis: & dimitte ipsum ligatum duobus diebus, aut tribus. deinde solue ipsum, et permura medicinam: et dimitte ipsum, donec abscondantur fila per se, deinde cura ipsum cum unguento, donec sanetur. Modus autem futuræ est, ut aggredes solutionem continuitatis, aut cum

B

C acubus, sicut narrauimus in futura uentris: aut aggrega solutionem cum filo, sicut feci te scire.

¶ De extractione nodorum labiorum.
Caput XXVII.

M VLTIS QUIDEM hominibus accidunt plerumque in interioribus labiorum suorum apostemata dura similia granis herbi: & quædam eorum minora, et maiora. Ergo oportet ut conuertas labium, & findas super omnem nodum eius, & suspendas ipsum cum uncino, & incidas ipsum ab omni parte. Deinde impleas locum post incisionem zegeritro, donec abscindatur sanguis. Deinde colluatur cum acetone, & curetur locus cum eo, in quo est stipticitas, usquequo sanentur uulnera.

¶ De incisione carniæ natæ super gingiuam.
Caput XXVIII.

M VLTOTIENS nascitur super gingiuam caro addiat, quam antiqui nominant abulus. Oportet ergo ut suspendas eam cum uncino: aut teneas eam cum forcipibus, & incidas eam apud radicem suam, & dimittas saniem currere, aut sanguinem. Deinde pone super locum zegeritrum, aut alios pulueres stipticos, exiccatiuos. Quod si redit illa caro post curationem, nam multotiens redit, tunc incide eam secundo, & cauteriza ipsam: ipsa namque non redit post cauterium.

¶ De racione Dentium cum ferro.
Caput XXIX.

Q VANDO QVE aggregantur in superficiebus Dentium ab interiori & exteriori parte, et inter gingiuas cortices asperi, turpes, & quandoque denigrantur, & citrini fiunt, et uirides, donec peruenit ex illo corruptio ad gingiuam, et foedi fiunt dentes per illud. Oportet ergo ut facias sedere infirmum inter manus tuas, et caput eius in sinu tuo, et rade molam & dentem, in quo apparent tibi cortices, & res similis arenæ: donec non remaneat ex eis aliquid, & similiter fac de nigredine, & uiriditate, et citrinitate, & alijs donec mudentur.

Si ergo auferatur quod in eis est a principio racionis, bonum est: & si non, tunc itera super eos racionem die alio, secundo, & tertio, donec ad ultimum perueniat studium in eo quod uis. Et scias, quod dens indiget rasorijs diuersarum formarum, multarum figurarum: secundum quod preparatur operationi tuæ: propterea, quod rasorium quo raditur dens ab inferiori parte, est aliud a rasorio quo raditur inter dentes, secundum formas alias. Et istæ formæ rasoriorum sint apud te præparatæ, quas uides.

A

Formæ raso-
riorū Dentiū.

B

C

De extractione doloris Dentium.

Caput xxx.

OPORTET ut cures Dentem a dolore suo cum omni ingenio, & tardes in eradicatione eius. Non est enim quod uicem eius suppleat quando eradicatur: quoniam est substantia sublimis: donec quando non est excusatio de eradicatione eius, tunc oportet quando cogitur infirmus eradicare ipsum, ut firmetur, et certificetur apud te dens dolens. Multotiens enim decipit infirmum dolor, & putat quia est in dente sano, & eradicat ipsum: deinde non recedit dolor, donec eradicetur dens infirmus. Nos enim iam uidimus illud ex operatione phlebotomatorum. Cum ergo certificatur apud te dens dolens ipsemet, tunc oportet ut scarifices in circumfutu dentis cum spatumili, in quo sit quiddam uirtutis, donec soluiatur gingiua ab omni parte: deinde moue ipsum digitis tuis, aut

- C**um forcipibus subtilibus in primis paulatim, donec concutias ipsum. Deinde loca tunc in eo forcipes magnos locatione bona, et caput infirmi inter genua tua: quod iam bene tenuisti, ita quod non moueatur: deinde trahē dentem secundū rectitudinem, ut non frangas ipsum. Si ergo non egreditur, tunc accipe aliquod illorū instrumentorum, et intromitte ipsum sub eo ab omni parte cum facilitate, & conare motionem eius, sicut fecisti in primis. Si autē dens est perforatus, aut corrosus: tunc oportet ut impleas illud foramen panno: et stringas ipsum cum extremitate radij subtilis, ut non frangatur in hora constrictionis tuæ super ipsum cum forcipibus. Et oportet, ut exquisite agas cū scarificatione in circumitu gingiue ab omni parte multū. Et custodi fortitudinē tuam, ut non frangas ipsum, et remaneat pars eius, & redeat super infirmū ex ea malicia quæ sit maior dolore eius primo. Et caue, ne facias illud quod ignorantes faciunt phlebotomatores in festinatione sua, et audacia ipsorum super eradicationem eius, præter quod administrent illud quod narramus. Multotiens enim faciunt euenire super homines infirmitates magnas, quarum difficiliore sunt ut frangantur, et remaneant radices eius omnes, aut quædam earum: aut ut extrahant ipsum cum quibusdam ossibus mandibulæ: sicut testificati sumus multotiens illud. Deinde collatur post eradicationem eius cum uino, aut cum aceto & sale. Quod si accidat fluxus sanguinis ex locis (multotiens enim accidit) tunc tere aliquid ex zegi, & imple cum eo locum: & si non, cauteriza ipsum si non confert tibi zegi.




Formæ forcipum subtilium quibus mouetur dens in primis, sint longarum extremitatū, breuis manubrij, grossi, ut non duplicentur quando cum eis premitur super dentem: sint sicut uides grossorum manubriorum, donec quando stringis cum eis, non dent seipsas, neque duplicentur: breuium extremitatum, & sint ex ferro indo, aut ex faled decenter facti, directarum extremitatum: & in eorum extremitatibus sint dentes, quorū quidam ingrediantur in quosdam, et stringant constrictione decenti, forti. Et quandoq; fiunt extremitates sicut forma oris auis quæ nominatur ciconia, et sunt fortis constrictionis.

Q De eradicatione Dentium, & extractiōe ossium mandibularum fractorum. Cap. xxxi.
V A N D O remanet apud eradicationem Dentis qui frangitur aliquid, tunc oportet ut ponas super locum eorum cum butyro die uno, aut duobus diebus, donec mollificetur locus: deinde intromitte ad ipsum algasti, aut forcipes: quorum extremitates assilantur orī auis quæ nominatur ciconia. Forma autē hæc est forcipum.

A


Sint extremitates eorum factæ sicut lima dentium: aut sicut aliskilfegi. Si ergo non obedit tibi ad exitum cum istis forcipibus, tunc oportet, ut caues super radicem, & detegas carnem totam, et intromittas instrumentum quod nominatur Palanca parua, cuius forma est hæc.



Sit brevis extremitatis, grossæ parumper: et non sit imbibitum, ut non frangatur. Si ergo egreditur radix per illud, est bonum: & si non, iuuare oportet cum istis instrumentis alijs, quorum formæ sunt istæ. Forma primi triangulatæ extremitatis, in qua est quædam grossitudo.




Forma triangulatæ extremitatis subtilis.




B

Etiam iuuatur cum hoc instrumento habente duos ramos, cuius hæc est forma.




Et cum alijs instrumentis & ferramentis quæ præcesserunt in ratione dentium. Etiam sit iuuamentum cum hoc instrumento quod assimilatur uncino magno, huius formæ.



triangulatæ extremitatis tortæ, in qua est quiddam grossitudinis, ut non frangatur: et sit non imbibitum. Et scias, quod instrumenta dentium sunt multa: & similiter reliqua instrumenta non computantur, et artifex prudens, subtilis in arte sua inuenit per se ipsum instrumentum, secundum quod significant ei operatio & ægritudines ipsæ. Quoniã ex ægritudinibus sunt ad quas non dixerunt antiqui instrumentum, propter diuersitatem specierum earum. Si autem frangatur os ex mandibula, aut ex alijs ossibus oris, aut putrescit: tunc perscrutare super ipsum in loco suo cum eo quod conuenit ei ex instrumentis & forcipibus quæ dixi in extracti one radicem, & iuuare cum gesti, cuius forma est hæc.

C



Sit in eo quiddam grossitudinis paulatim, ut stringatur, uel teneat cum eo os, & non fugiat & uadat, donec egrediatur os: & restaura locū cum medicinis conuenientibus ad illud. Si autem in osse est putredo parua, tunc rade ipsum a putredine sua, et cura ipsum, donec sanetur.

Q De serratura Dentium eminentium super alios. Caput xxxii.

Q V A N D O Dentes eminent non secundum cursum suum naturalem, sceda fit per illud forma: & præcipue quando accidit illud in mulieribus, et puellis, scilicet uenalibus. Oportet ergo ut consideres. Nam si dens est natus post dentem alium, & non locatur, uel est possibilis eius serratura, neq; limatura ipsius: tunc eradica ipsum: et si est annexus cum dente alio, tunc incide ipsum cum isto instrumento, cuius hæc est forma.



D Est simile rostro paruo, & sit ex ferro indo, acutæ extremitatis ualde. Et sit incisio tua qua ipsum incidis in diebus multis, & propter duriciem dentis, & ut non commoueatur alius ex dentibus. Si autem est emiens expositus limaturæ suæ: tunc lima ipsum cum lima ex indo, cuius forma est hæc.




Sit totum ex indo, & manubriū eius minorū punctorum ualde, sicut lima cum qua fiunt acus: cum quo limetur dens paulatim in diebus multis cum facilitate, ut non comoueatur dens, et cadat: deinde leni ipsum, in fine rade ipsum cum quibusdam rasorijs. Quod si est dens, ex quo frangatur pars, et ledit linguam: tunc oportet ut limes eum etiam, donec auferatur asperitas illius fractionis, & æquetur: et applanetur, & non ledat linguam, neq; corrumpat sermonem.

Q De retatione Dentium cum filis auri. Caput xxxiii.

Q V A N D O accidit Dentibus anterioribus concussio & commotio a percussione, aut casu: & non potest infirmus stringere super illud quod comedit ut non cadat: et curasti eos cum medicinis stipticis, & non ualuit curatio: tunc ingenium in eis est, ut stringantur cum filo auri: quoniam argentum fit uiride, et putrescit post dies: sed

aurum nunquam mutatur. Et sic filum medium in subtilitate & grossitate secundum quantitatem quod capiat inter Dentes. Et forma quidem retationis est, ut accipias filum, & intromittas duplū eius inter duos dentes sanos: deinde tex eas cum duabus extremitatibus fili inter dentes motos, siue unus sit, aut plures, donec peruenias cum tela usq; ad dentem sanum alterius partis. Deinde itera texturam usq; ad partem a qua incipisti: & stringe manū tuam cum subtilitate & sapientia, donec non remoueat per os: et sit constrictio tua qua stringis filum, apud radices dentium, ut non euadat. Deinde incide extremitates fili superfluentes cum forficibus: et aggrega utrumq; et conuerte eas cum gesti: et occulta ipsas inter dentem sanum & dentem motū, ut non lædat linguam: deinde dimittatur ita strictū dum remanet. Si autem soluitur, aut inciditur, stringe eos cum filo alio, et stabit cum eo taliter tēpore toto. Et hæc est forma



Dentium, et figura retationis duorum dentium sanorum, & duorum dentium motorum, sicut uides. Et quādoq; fit, ut redeat dens unus, aut duo

post casum utriusq; in locis suis, & retentur sicut narrauimus, et remaneant: & non facit illud nisi artifex, prudens, et expertus. Et quādoq; aptatur aliquod ex ossibus uaccinis: et fit ex eo sicut forma dentis, & ponitur in loco, ex quo munitur dens & stringitur, sicut diximus: et remanet, & seruitur cum eo tempore longo.

¶ De incisione ligamenti quod accidit sub lingua, & prohibet loquelam.

Caput XXXIII.

QUANDO QUIBUS ligamentum hoc quod accidit sub lingua, est aut naturale, cū quo nascitur homo, aut accidentale, a uulnere quod iam consolidatum est. Et operatio in eo est, ut aperias os infirmi in capite eius in sinu tuo, & eleua linguam eius: deinde incide illud ligamentum neruosum per latitudinem, donec soluatur lingua a retentione sua. Quod si in eo fuerit quiddam duriciei & nodationis, & fuerit illud ex consolidatiōe uulneris: tunc proice in illud uncinum, & finde illud per latitudinem, donec incidas ligamentum, et soluatur nodatio. Et caue, ne sit fissura in profundo carnis, et incidas arteriam illic, et accadat fluxus sanguinis. Deinde colluatur in uestigio incisionis cum aqua rosata, aut cum aceto, aut aqua frigida. Deinde pone sub lingua linum ex lino, quod teneat infirmus in omni nocte: ut non consolidetur secundo. Si autem accadat fluxus sanguinis, tunc pone super locum regi trium. Si uero uincit te sanguis, tunc cauteriza locum cum cauterio lentiginoso, quod conuenit ad illud: deinde cura ipsum cum reliqua curatione, donec sanetur.

C

Ranulæ.

Indicia Can-
cri.

**¶ De extractione Ranulæ quæ sit sub lin-
gua. Caput xxxv.**

Q V A N D O Q V E accidit sub lingua apostema quod affimi-
latur Ranæ parvæ, prohibens linguam ab operatione sua
naturali: & fortasse magnificat adeo, donec implet os. Et operatio in eo
est, ut aperiās os infirmi coram sole: & considera apostema. Si ergo vi-
des ipsum fusci coloris, aut nigri, durum, cui non inuenit infirmus sen-
sum: tunc non tangas ipsum, quoniam est cancer. Et si est declivē ad al-
bedinem, in quo est humiditas, tunc projice in ipsum uncinum, & incide
ipsum cum spatulili subtili, & libera ipsum ab omni parte.


Quod si vincit te sanguis in hora tuæ operationis, tunc pone super
ipsum zegi tritum, donec abscondatur sanguis: deinde redi ad operatio-
nem tuam, donec extrahas ipsum cum complemento eius. Deinde cola-
tuatur cum aceto & sale: & cura ipsum reliqua curatione cōueniente ad
illud, donec sanetur.

Glandulæ.


D

**¶ De curatione apostematis duarum Ami-
gdalarum. Caput xxxvi.**


Q V A N D O Q V E accidunt inter guttur godad, id est, glan-
dulæ, quæ simulantur algodad, quæ accidunt de foris: & no-
minantur duæ Amigdalæ: quas quando curas cum eo quod diximus
in diuisione, et non sanantur, tunc considera. Si ergo est apostema du-
rum, fusci coloris, pauci sensus: tunc non tangas ipsum cum ferro. Et si
est rubei coloris, et radix eius est grossa: tunc non tangas ipsum etiam
cum ferro, timens fluxum sanguinis, imo dimitte ipsum, donec mature-
tur. Et tunc aut perforabis ipsum: aut rumpetur per se. Et si est albi co-
loris, rotundum, & est radix eius subtilis: tunc oportet ipsum incidi. Et
operatio in ipso est, ut consideres ante operationem suā, si quietus apo-
stema eius calidum quiete completum, aut imminuitur quadam dimi-
nutione: tunc ergo fac sedere infirmū coram sole, & caput eius sit in sinu
tuo: & aperi os eius, et accipiat seruiens inter manus suas, & premat lin-
guam eius inferius cum instrumento,
cuius hæc est forma,



Fiat ex argento, aut ære, quod sit subtile sicut cultellus. Cum ergo pre-
mis cum eo linguam, & ostenditur tibi apostema, et cadit super ipsum
uisus tuus: tunc accipe uncinum, & fige ipsum in amigdalam, et extrahe
eam ad exteriora quantum potes, præter quod trahas cum ea aliquid
ex tunicis. deinde incide eam cum instrumento,
cuius hæc est forma quæ sequitur.



Assimilatur forficibus: uerum tamen extremitates eius sint curuatae, ita quod orificium cuiusque earum est in directo alterius acute: unde cura ut sit ex ferro indo, aut alifuled imbibitum. Si autem non est presens hoc instrumentum, tunc incide ipsum cum spatumili, cuius hæc est forma,



Sit acutum a parte una, non acutum a parte altera. Et postquam incidis amigdalam unam, incide alteram secundum hanc eandem speciem incisionis. Deinde post incisionem gargarizet infirmus cum aqua frigida, aut cum aceto & aqua. Si autem accidat ei fluxus sanguinis, gargarizet cum aqua in qua bulliti sunt cortices granatorum: aut folia myrti, & similia illis ex stipticis, donec abscindatur fluxus sanguinis: deinde cura ipsum, donec sanetur. Et quandoque nascuntur in gutture apostemata alia, præter amigdalas duas. Incide ergo ea secundum quod dixi in incisione duarum amigdarum æqualiter. Et ego quidem iam medicatus fui mulierem ex apostemate, quod natum erat inter guttur eius, quod trahebat ad fuscadinem, pauci sensus, quod iam fere clauserat guttur: & mulier respirabat a meatu stricto, et iam prohibuerat ei comestitionem, et potum aquæ: & iam peruenerat ad mortem, si remansisset uno die, aut duobus diebus. Et apostema tantum ascenderat, quod emiserat duos ramos, donec exierant super duo foramina nasi. Properaui ergo festinanter, et fixi in unum eorum uncinum. Deinde traxi ipsum, & tracta ex eo est portio magna. Deinde abscidi eam, ubi comprehendi ex foramine nasi. Deinde feci illud ei quod processit ex foramine nasi altero. Deinde aperui os eius, & pressi linguam eius: et postea fixi uncinum in ipsum apostema: deinde abscidi ex eo partem eius, et non cucurrit ex eo nisi sanguis paucus: absolutum est ergo guttur mulieris, & incipit statim bibere aquam, deinde accipit ex cibo. Non ergo cessauit incidere ex illo apostemate multotiens tempore longo: & apostema succedebat loco eius quod incidebam, donec prolongatum est nimis & cum ea illud, ingenuiui ergo, & cauterizaui apostema inter guttur. Stetit ergo ab adiunctione: deinde ambulaui a parte, & non sciui quid fecit D E V S cum ea post me.


Aduersus fluxum sanguinis.

Experimentum Autoris.

De incisione apostematis uuulæ. Cap. xxxvii.


Q V A N D O descendit catarrus ad uuulam, & apostematur, & est longa: tunc ipsa nominatur perpendicularis: et si est in in-

Gferiori parte grossa, rotunda, tunc ipsa nominatur uua. Quando curatur cum eo quod diximus in diuisione, & non cōfert curatio: et uides quod apostema calidum quieuit ab ea, & est subtilis: tunc oportet ut incidas eam. Et quæ ex ea est aggregata rotunda, & non est ei longitudo, et est sanguinea, aut fusci coloris, aut nigri, et non est ei sensus: tunc oportet ut deuites incisionem eius. In ea enim est timor super infirmum. Oportet ergo quando uides eam secundum modum quem dixi ex albedine, & longitudine sua, ut facias sedere infirmum coram sole: & premas linguam eius cum instrumento, cuius præcessit narratio: deinde fige uncinum in uuam, & trahе eam inferius: et incide eam cum uno duorum instrumentorum quæ dixi in incisione duarum amigdalarum. Et oportet ut non incidas ex ea, nisi illud quod additur super naturalem terminum sine additione: nam si tu incidis ex ea plus, lædes uocem & sermonem. Deinde post incisionē utere eo quod narrauimus in incisione duarum amigdalarum: & cura eam, donec sanetur. Si autem terretur infirmus ab incisione: tūc oportet ut utaris ingenio in cauterizatione eius absq; timore & pauore. Et modus cauterij in ea non est, nisi cum aqua acuta: et est, ut ponas caput infirmi in sinu tuo. Deinde preme linguam eius cum instrumento quod diximus. Deinde accipe ex aqua quam dixi tibi in capitulo cauterizandi, & confice cum ea calcem non extinctā, & pone eam non spissam, neque subtilem, et imple ex ea concauitatem huius instrumenti, cuius hæc est forma.



Sit extremitati eius in qua ponitur medicina concauitas, sicut concauitas cochlearis radij: & pone instrumentum cum medicina super uuulam ipsam: et infirmus sit iacens super latus suum, ut currat salua ex ore eius ex intrinseca medicina, ut non descendat ex ea ad guttur ipsius aliquid, & laedat ipsum. Deinde tenē manum tuam cum medicina. Et tu exprime eam super uuulam quantitate medietatis horæ, donec uideas eam iam denigratam, et sedatam mordicationem medicinae. Et si uis ut accipias cotum, & inuoluas ipsum super extremitatē radij, et infundas cotum cum medicina, & intromittas radium cum coto in cannulam desuper, donec adhæreat cotum super uuulam. Fac illud multotiens, donec consequaris quod uis de cauterizatione uuæ. Deinde dimitte eam ipsa namq; arefcit, & cadit post tres dies, aut quatuor. Quod si indiges ut iteres medicinam, itera ipsam: et post cauterizationem absterge in

circumitu uue cum coto imbibito in butyro, & mundifica cum eo quod **A**
 est in circumitu eius ex medicina: & colluatur cum aqua frigida. Et cu-
 retur extrinsecus cum embrocis, & deintus cum gargarismis, donec sa-
 nes. Hec ergo species curationis est salubrior incisione & longinquior a
 timore. Et quandoq; curatur uuula etiam cum eo quod est subtilius
 quam cauterium & incisio: curatur enim cum suffumigatione, secundum
 hunc modum. Sume calamentum, & hyssopum, et origanum, & ru-
 tam, & fleah, et chamomillam, et abrotanum, & similia eis ex herbis: &
 aggrega ea omnia, aut quaedam eorum in olla, & submergantur cum a-
 ceto, & bulliant: et olla sit lutata cum luto deceter: & sit in medio olle fo-
 ramen, super quod componatur instrumentū conca-
 uum secundum hunc modum.



Fiat ex argēto, aut are: et intromittatur extremitas, in qua est granatum,
 in os infirmī, donec ascendat uapor ad uuulam super cannulam, donec
 obscuretur uuula multum. deinde itera super ipsam multotiens, donec
 arescat. Et caue, ne facias hanc curationem in principio aduentus aposte-
 matis. Placētq; enim addit in apostemate: & non oportet ut facias illud
 nisi apud declinationem apostematis eius calidi. Si autem non est prae-
 sens tibi hoc instrumentū, tunc accipe canam, et compone in extremitate
 eius cortice oui: ut nō comburatur os infirmī: quoniam cortex oui pro-
 hibet uaporem comburere os: & haec est ex bona curatione cum salute.

De extractione spinarum, & ossium de gula.

Caput XXXVIII.

MULTOTIENS adhæret in gutture os, aut spina piscis,
 aut aliud. Oportet ergo ut extrahas quod ex eis est appares super quod
 cadit uisus, postquā premis linguā cum instrumento apud solem, & de-
 claratur tibi quod est in gutture. Et quod non apparet tibi & occultatur
 in gutture, oportet ut facias uomere infirmū antequā digeratur eibus in
 stomacho. Fortasse em̄ egrediet res annexa per uomitū. Aut deglutiat
 infirmus frustū napi, aut radicē lactuca, aut deglutiat bucellā panis sicci:
 aut accipiat frustum spongię marinę sicca lenis: et liga ipsū in filo, de-
 inde deglutiat ipsum. Cum ergo peruenit ad locum ubi sunt spinæ, aut
 os, et extrahitur, tunc egreditur. Si ergo non egreditur cum eo quod dis-
 ximus: tunc utere instrumento ex plumbo secundū hanc formam.




C Sit grossius quam Radius parumper, & in extremitate eius sit curuitas, quam intromittat in guttur suum cum facilitate: & ipse habeat caput suum eleuatum sursum. Et caueat a tactu suæ epiglottis, ut non accadat ei tussis, & impellat cum eo os, aut spinam, aut intromittat ipsum medicus manu sua. Verum quod infirmus intromittat, hoc est melius: propter scientiam suam de loco rei annexæ: & impellat inferius, aut trahat manum suam cum instrumento sursum, totum illud secundum quantitatem quæ præparatur ei, donec egrediatur.

Q De extractione Sanguisugæ. Caput XXXIX.
V A N D O medicatur sanguisuga cum eo quod dixi in diuisione ex curatione cum medicinis, & non confert, tunc considera

in gutture infirmi coram sole, siue apud solem postquā premis linguam eius cum instrumento quod narraui tibi. Si ergo cadit uisus tuus super sanguisugam, extrahe eam cū uncino paruo, aut cum gestu subtilibus decenter. Quod si non est possibile cum eis: tunc accipe

cannulam concauam, & intromitte eam in guttur infirmi usque prope guttur: deinde intromitte in concauitatem cannulæ ferrum ignitum cum igne. Fac illud multotiens: et abstineat infirmus ab aqua tota die. Deinde accipiat uitreatam plenam aqua frigida, et aperiat os eius in ea: et colluat os suum cum ea, & non deglutiat ex ea aliquid: et moueat aquam una hora post aliam cum manu sua. sanguisuga enim ilico cum lenit a-

D quam cadit. Si autem non egreditur cum eo quod narrauimus, tunc suffumiga infirmum cum cimicibus, aut cum asa cum instrumento quod narraui in suffumigatione uulæ. Fac illud multotiens, quoniam ipsa cadet. Et modus operationis in suffumigatione est, ut accipias ollam, in qua sint prunę uiuæ cum igne: & olla sit cooperta cum coopertorio, in cuius medio sit foramen: & componatur in illo foramine extremitas instrumenti. deinde projice suffumigationem, & ponat infirmus os suum in extremitate cannulæ, & claudat os suum, ut non egrediatur suffumigatio, donec scias quod suffumigatio iam peruenit ad sanguisugam, nam sanguisuga statim cadet. Quod si non cadit, tunc itera suffumigationem multotiens. Et toleret infirmus sitim, & comedat salsa, & alia, & non bibat aquam. Necesse est ergo ut egrediatur cum hoc regime. Et hæc est forma instrumenti cum quo extrahitur sanguisuga ex gutture,



quando cadit super ipsam uisus. Est simile forcipibus, sicut uidetur, nisi quia est ei hæc curuitas quæ intromittitur ad guttur. Et extremitas eius similis ori aui quæ nominatur ciconia, in quo est asperitas li-
mae: quando comprehendit aliquid, non dimittit ipsum omnino.

A De apertione Apostematum, & eorum sectione, & cura in genere. Caput XL.

A P O S T E M A T V M species sunt multæ, multorum modorum, secundum quod uenit rememoratio eorum, scilicet unius, et unius in hoc libro: & sunt diuersæ in perforatione eorum, et sectione ipsorum ex duobus modis. Quorum unus est ex specie apostematis in seipso, & eo quod comprehendit ex humiditatibus: Et modus secundus est propter loca, in quibus accidit ex corpore: quoniam apostema accidens in capite, est aliud ab apostemate accidente in ano: et apostema accidens in loco carnoso, est aliud ab apostemate accidente in iuncturis: & unicuique eorum est iudicium suum ex operatione. Et ex apostematibus sunt quæ non oportet ut perforentur, nisi post maturationem saniei in eis, & complementum eius: et ex eis sunt, quæ oportet ut perforentur, dum sunt cruda, & non maturantur secundum complementum: sicut apostemata quæ sunt propinqua iuncturis. Quoniam apostema quando accidit prope iuncturam, et prolongatur esse eius, donec putrefit quod est in circumiunctis eius, fortasse corrumpuntur ligamenta, aut nervi illius iuncturæ: quare est causa propior contractionis illius membri. Aut est apostema apud membrum principale: quoniam si tu tardas perforationem eius, donec maturetur, nocebit uel illi, uel per illud membro principali. Aut est prope anum, perfora ergo ipsum immaturum: & non oportet, ut perfores, apostema crudum, non completæ digestionis, nisi quod est prope anum, ut non putrefiat profundum, & longetur ad interiora ani, et fiat fistula: aut fiat in termino eius quod non sanatur. Oportet ut scias horam perforationis apostematis, quod maturatum est secundum complementum, & est apud sedationem doloris, recessionem febris, et diminutionem rubedinis, et pulsationis, & acuitatem capitis apostematis: et reliqua signa. Et oportet, ut facias eandem perforationem in inferiori loco apostematis, & uehementioris emicentiæ: et sit perforatio uadens in longitudinem corporis, si apostemata sunt in partibus manuum & pedum, & locis lacertorum, & chordarum, et nervorum, & arteriarum, et ad ultimum in omnibus locis æqualibus, quibus non est reflexio. In illis autem quæ reflectuntur, uade cum perforatione secundum illud membrum. Quando uero apostema est in locis carnosissimis: tunc melius est ut diminas perforationem eius, donec confirmetur eius digestio, sicut diximus secundum complementum. Quoniam si tu perforas ipsum ante illud, prolongatur cursus uirus ex eo, & est multæ sordis & sordiciei, & fortasse indu-

Modus sectionis Apostemati duplex.

Apostemati uariatio.

Signa Apostematis maturi.

Cantur labia eius, & profunditas eius. Et quedam apostemata perforantur secundum latitudinem corporis apud necessitatem: aut secundum illud quo indiget membrum. Et oportet, ut administres in apostematibus parvis perforationē parvam, et in apostematibus magnis perforationē amplam: aut sectiones multas per similitudinē magnitudinis apostematis. Et sunt ex apostematibus, in quibus oportet ut concauetur cutis: et incidatur quando iam facta est sicut pannus, & facta est in termino, quod iam mortua est: sicut illud quod accidit in multis, ut dubelet, & bubonibus. Et ex eis sunt quæ secantur sectione habente tres angulos. Et ex eis est, ex quo inciditur sicut figura folij myrti, sicut apostema inguinum. Et ex eis sunt in quibus administratur sectio rotunda, & sectio lunaris: & similes eis ex sectionibus. Illud uero cui non est caput, sicut sunt apostemata lenia superficialia, oportet ut perfores ipsum perforatione superficiali, uel plana tantum. Et oportet, quando apostema est grossum, & iam collegit saniem multā, et perforas ipsum, ut non properes & extrahas pus totum in illa hora: imo extrahere ex ipso partem eius: Deinde opila apostema usque ad diem alium. Deinde extrahere quiddam ex pus iterum. Fac illud multotiens secundum gradationem, donec egrediatur: præcipue si infirmus est debilis uirtutis, aut mulier præguans, aut puer paruus, aut senex decrepitus: spiritus enim animalis ab animali multotiens resoluitur cum egressione saniei: & fortasse moritur infirmus, & tu non percipis. Caue ergo hoc capitulum cautela

Dmagna. Et post perforationem tuam, qua ista perforas apostemata, oportet ut abstergas uulnus: & considera. Si ergo est uulnus apostematis paruū, aut est sectio plana, tunc administra licinia ex lino, aut corio antiquo. Et si est apostema magnum, & fissuræ perforationis multæ sunt, oportet tunc ut intromittas in omnem fissuram licinium, donec perueniant adinuicem. Et si in apostemate abscidisti partem cutis, aut in circumfutu concauisti eam: tunc oportet ut impleas eam corio ueteri, aut sicut quando textitur pannus, aut raditur lanugine lini absque humiditate: & stringe ipsum usque ad tertium diem. Deinde proice ipsum, & cura illud cum eo quod oportet ex unguento, donec sanetur. Si autem accidat fluxus sanguinis in hora tuæ operationis, tunc administra aquam frigidam, & acetum, postquam imbibitur in eis pannus: et ponis ipsum super locum fluxus sanguinis multotiens. Si autem perseverat fluxus sanguinis, tunc oportet ut administres regimen, & curationem, & pulueres, quæ narraui in locis multis huius nostri libri, & ex diuisione. Si autem est in tempore hyemis, et locus apostematis est multorum neruorum: tunc oportet ut infundas puluillos cum uino, & oleo calidis: & ponas eos super loca. Et si fuerit in aestate, & loca sunt carnosa: tunc oportet ut ponas puluillos imbibitos in aqua, & oleo, aut cum uino & oleo, & totum illud frigidum. Donec

Cautela.

Contra fluxū
sanguinis.

quando erit dies tertius, sicut diximus, tunc oportet ut soluas apostema, & abstergas ipsum, & administres in curatione eius quod ei conuenit, donec sanetur. Hoc est ergo quod necessarium est ex cognitione curationis apostematum uniuersaliter. Secundum semitam uero distinctionis, iam dixi de omni apostemate, qualiter est uia ad curationem eius capitulatim singulariter.

A De sectione apostematum quæ accidunt in cute capitis. Caput XLI.

ACCIDUNT in cute capitis apostemata parua, & sunt ex speciebus Nodorum, quos continent tunicae, quæ sunt eis sacci: quasi ipsa sint haufolati gallinæ. Et ipsorum species sunt multæ. Ex eis sunt pingues: & ex eis sunt quæ continent humiditatem similem limo; et ex eis quæ continent humiditatem similem frislatis & pultibus: et eis similibus, et ex eis sunt, quæ sunt lapidea dura. Et in sectione omnium, & ipsorum extractio ne non est timor, dum apud ipsorum sectionem non facit contrarietatem arteria. Et operatio in sectione eorum est, ut experiaris ea cum instrumento, cuius forma uenit post hæc, quod nominatur. Intrinsum, donec scias quid contineat. Nam si est illud quod continet humiditas, tunc seca ipsum sectione secundum longitudinem sectione superficiali: secundum

hanc formam. Et incipe cum sectione ex linea b. ad lineam, g. Cum ergo euacuatur humiditas, tunc excoria kistin quæ continet illam humiditatem, & non dimittas ex ea aliquid penitus. Multoties enim redit, si remanet ex ea aliquid. Deinde submerge eorum in unguento ægyptio, si est præsens: & si non, in aqua & sale: & imple cum eo uulnus, et dimitte ipsum usque ad diem

alium. Ipsum enim corrodet quod remansit ex kisti. Deinde itera super ipsum eorum cum ægyptio secundo, & tertio, & si indiges illo, donec confidas quia non remanserit ex kisti aliquid, tunc enim cura uulnus cum unguento, donec sanetur. Quod si apostema continet nodum pinguem: tunc seca ipsum secundum hanc formam,

sectione habente formam crucis: & proijce uncinos inter duo labia sectionis, & excoria ipsum ab omni parte: & conare uirtutem tuam in extractione tunicae quæ continet ipsum. Si autem contrarietatem facit tibi arteria, tunc fac illud quod narrabo tibi post. Et similiter fac in apostemate, si est lapideum, ex sectione, & curatione eadem, secundum quod diximus. Et se-

ctio super apostema lapideum est facilius: quoniam est pauci sanguinis

C & humiditatis. Et quandoq; sunt quædam horum apostematum quæ sunt in capite in quibusdam hominibus, eum quibus penitus nō est humiditas. Quod est: quia ego secui super apostema in capite mulieris uetulae, & inueni apostema sicut lapis solidus & durus, asper, albus, qui non pōterat frangi: & si percuteretur cum eo aliquis proijciendo, uulnerat ipsum. In alijs uero apostematibus accidentibus in capite, præter hæc scilicet apostemata quæ accidunt in capitibus puerorum, & apud radices aurium, sectio eorum omnium sit sectio superficialis. Vel pone perforationem eorum semper ab inferiori parte eorum, ut alleuietur cursus saniei ad inferiora. Deinde cura ea cum eo quod conuenit eis ex curatione.

¶ De sectione Strophularum in collo.

Caput XLII.

MVLTOTIENS accidunt ista apostemata in collo, & sub assellis, & inguinibus: et quandoq; accidunt in reliquo corpore. Et super illa quæ ex eis accidunt in collo, sunt unum, et multa: & generantur ab inuicem: & omnis Strophula ex eis est intra tunicam propriam ei, sicut est in nodis & apostematibus capitis, sicut narrauimus. Et species harum Strophularū sunt multæ. Et ex eis enim sunt lapideæ: & ex eis sunt quæ continent humiditates: et ex eis sunt malignæ, quæ non obediunt curationi. In illa ergo quam ex eis uides bonæ dispositionis in tactu, cuius manifestū est propinquū colori cutis, & mouetur ad omnem partem, & nō est annexa cum neruis colli, neq; cum guidegi, neq; cum arteria, neq; est profunda: oportet ut feces eam sectione superficiali a superiori parte ad inferiorem partem corporis ex linea, b. ad lineam, g. & excoria eam ab omni parte: & extende duo labia cutis cum uncino, aut cum uncinis multis, si indiges illo, sicut diximus in apostematibus capitis, & extrahe eam paulatim. Et est super cautelam, ut non incidatur penna, aut neruus. Et sit spatium ille non acutum ualde: ut non addat tibi ma-
b
g
num tuam cum incisione, aut inquietet infirmum, & incidas quod non est necesse. Si autem incidis uenam, aut arteriam, aut prohibet te ab operatione, tunc pone in uulnus zegi tritum, aut quosdam pulueres qui abscindunt sanguinem, & stringe uulnus, & dimitte ipsum, donec quieteat acuitas apostematis, & mollificetur uulnus: uel incipit & uult putrescere. nam sanguis abscinditur tunc. Redi ergo ad operationem tuam, donec compleas. Deinde inquire digito tuo indice, si remansit aliquid ex Strophulis alijs paruis: ergo incide eas, & munda eas. Quod si est in radice Strophulæ uena magna: tunc oportet ut non incidas illam Strophulam ex radice sua: imo oportet ut liges eam cum filo duplato forti, et dimittas eam donec cadat per se absque nocumento. Deinde imple uulnus coto ueteri, quod iam submersisti in unguento ægyptio, Deinde cura

Verissimū est ad Strophulas, & ad alia apostemata, siue hemigranæ, seu alium antiquū morbum existentē a collo supius ali-

raipsum. Si inciditur Strophula tota, tunc oportet ut aggredas labia duo uulneris: & suas ipsum statim, postquam uides quia prorsus non remansit superfluitas. Si autem uides quod remansit superfluitas propter magnitudinem Strophulae, tunc oportet ut intendas ad incidendam radicem eius, & extrahendam eam: & administra futuram quam diximus. Et quae ex Strophulis continet humiditates, perfora illam perforatione superficiali: ut appareat tibi locus maturitatis eius: & pone perforationem ab eo quod sequitur inferius corporis, sicut diximus. Deinde administra post perforationem licinia cum unguento, & similia eis, ut corrodat quod remansit ex corruptione, donec quando uides uulnus iam mundatum esse: tunc cura ipsum cum unguento generatiuo carnis, donec sanetur.

D De sectione Epiglottis ab apostemate intra guttur
accidente. Caput XLIII.

DIXERVNT antiqui hanc sectionem in Epiglotti, et non uidi aliquem in terra nostra, qui eam fecerit: & haec est scriptura sermonis eorum. In habentibus autem synanchiam, oportet ut deuitetur sectio Epiglottis: cum non fiat iuuamentum per illud: propterea, quod omnes uenae & pulmo sunt infirmi. In illis uero qui habent apostema calidum in ore, aut gutture, aut duabus amygdalis, quando non est egritudo in canali, oportet uti sectione Epiglottis, ad fugiendum ex perditione quae fit ex praefocatione. Oportet ergo quando uolumus illud, ut secemus Epiglottim sub tribus circulis Epiglottis, aut quatuor, sectione parua per latitudinem, in eo quod est inter duos circulos per quantitatem, quod sit sectio in sifac, non in cartilagine: & iste quidem locus est conueniens sectioni, quoniam am est priuatus carne, et uasa sanguinis ab eo sunt longinqua. Quod si medicator est timidus, tunc oportet ut extendat cutem gutturis cum unguento. Deinde findat cutem, donec quando peruenit ad cannalem: deuitet uas sanguinis, si uidet ex eis aliquid. Deinde secet sifac quod narrauimus: & significatur super sectionem cannalis ex phlegmate quod egreditur ex ea, cum eo quod disrumpitur, et abscissione uocis. Et dimitte uulnus apertum tempore aliquo. Cum ergo remouetur hora in qua timeatur praefocatio, aggrega duo labia uulneris cutis, et sue ipsam solam absque cartilagine. Deinde administra medicinas quae faciunt nasci carnem, usquequo sanetur. Inquit Albueasis. Summa huius sermonis quem narrauimus, expositio non est, nisi quando uident, quod aliquod horum apostematum iam opilauit guttur infirmi: & sublimatus est infirmus super mortem, & uult interfecari anhelitus eius: uadunt ad secandum Epiglottim, ut respiret infirmus super locum uulneris quadam respiratione, & saluetur a morte: & propter hoc praeeperunt dimittere uulnus apertum, donec consumatur malicia aegritudinis, & est malicia

A cubi districti, quod patiens purget cum pilulis de aloë, & malicis: tamen diu, succellue tamen, quousque incurrat pauens dysenteriam. Postea succurre dysenteriae: & liberaliter: & illud facies cum licinio Galeni, semis apii, et opii thebaici ana omniū, tere & cribella, & cofige cum melle Carobiarum: quod sic fit. Accipe Carobias pingues, et incide eas minutim, & pone in v. lib. aquae: & fac bullire quousque tibi uisum fuerit: & cola, & liquorem illum pistam ad lentum ignem, donec ad spissitudinem mellis redigatur.

B

C eius tribus diebus, et quasi ipsa: tunc ergo præceperunt suere uulnus, & curare ipsum, donec sanet. Et illud quod uidi per me ipsum est, quod una ancilla accipit cultellum, & misit eum in guttur suum, et incidit cum eo partem cannalis pulmonis. Et uocatus sum ad curationem eius, et inueni eam mugire, sicut est mugitus mortui. Detexi ergo a uulnere, et inueni sanguinem qui egressus fuerat ex uulnere paruum. Confusus ergo sum, quod ipsa non absciderat uenam, neque guidegi: & uentus egrediebatur ex uulnere. Properaui ergo, et fui uulnus, & curaui ipsum, donec sanum est: et non accidit ancillæ aliquid, nisi rauedo in uoce: & rediit post dies ad meliorem dispositionum suarum. Hinc ergo dico: quod in sectione Epiglottis non est timor.

Experimentū
Autorts.

¶ De sectione Herniæ gutturis.

Caput

XLIII.

H O C A P O S T E M A nominatum Hernia gutturis, est apostema magnū, secundum colorem corporis: & est in mulieribus multum. Et est secundum duos modos: aut enim est naturale: aut est accidentale. In naturali certe non est ingenium. Accidentale uero est secundum duos modos: quorū unus est similis nodis pinguibus. Et modus alter, est similis apostemati quod fit ex nodatiōe arteriæ. Et in ipso est timor, & non oportet ut præsumptio fiat ad ipsum cum ferro, nisi in eo quod est paruū: & tu proba ipsum, et inuestiga ipsum cū Intromisso. Si ergo inuenis ipsum simile nodo pingui, et non est suspensum cum aliqua uenarū: tunc seca ipsum, sicut secantur nodi: & extrahe ipsum cū eo quod continet ex kisti, si est in kisti: et si non, tunc perscrutare totū eius. Deinde de cura locū cum eo quod oportet ex curatione, donec sanetur.

Hernia gut-
turis.

¶ De sectione super species Nodorum.

Caput

XLV.

N O D O R V M multæ sunt species, & ego iam dixi omnes species eorum in diuisione: et oportet ut narrem hic differētiā inter Nodum, & Exituram: cum sit dubitationem faciens. Dico ergo, quod cum Exitura est caliditas, et febris, & dolores uehementes, donec sedatur ebullitio superfluitatis, et completur putrefactio: tunc enim quiescunt febris & calor. Cum Nodo uero non est caliditas, neque febris, neque dolores, et continet eos kisti sisachin, qui est eis saccus proprius, & est secundum colorem corporis: & est incaptio eorum sicut cicer, & fit sicut batecha, & maior & minor. Et sunt secundum duas species: aut pingues: aut continent humiditatem. Et colores humiditatis sunt multi, secundum quod dixi in diuisione. Oportet ergo, quando peruenis ad curationem Nodi, ut experiaris eum, & inquiras ipsum in primis cum instrumento quod nominatur Intromissum, secundum quod ueniet forma eius in capitulo quod est post hoc. Et modus inquisitionis aposte-

Exitura.

Nodus.


matum, et Nodorum omnium est, ut accipias hoc instrumentum, et intro mittas ipsum in humidiores locum, quem inuenis in apostemate: & tu reuolue digitos tuos cum eo paulatim, donec scias quod instrumentum iam penetrauit eum. Deinde ultima manum tuam secundum mensuram magnitudinis apostematis. Deinde extrahe Intromissum, et considera illud quod egreditur in uestigio eius. Si ergo egreditur humiditas currens, quicunque color sit: tunc seca ipsum sectione superficiali, secundum quod dixi in reliquis apostematibus. Et si non egreditur humiditas in uestigio Intromissi, tunc scias quia est pinguis: seca ergo super ipsum sectione habente formam crucis, secundum formam hanc, sicut



doci te: & suspende ipsum cum uncinis, & excoria cutem ab omni parte cum facilitate: & custodi kistin si potes super illud, ut extrahas ipsam sanam cum Nodo. Si autem disrumpitur kistis apud operationem, & non est possibile extrahere ipsam sanam, multotiens enim accidit illud, tunc extrahe ipsam frustatum, donec non remaneat ex ea aliquid. Nam si remanet ex ea aliquid parum, aut multum, redit Nodus secundum plurimum. Quod si uincit, & remanet ex eo parum: tunc imple uulnus apud completionem tuam, quibusdam pulueribus corrosiuis acutis: & stringe uulnus, & pone supra ipsum quod sedet apostema calidum, & cura ipsum cum reliqua curatione, donec sanetur. Si ergo est Nodus magnus, tunc sue duo labia eius, et cura ipsum cum eo quod incarnat. Si autem est tibi contraria uena pulsantis, aut non pulsantis: tunc prope, & imple locum zegeritio, & dimittit ipsum strictum duobus diebus, aut tribus, donec putrescat uulnus, & quiescat ebullitio sanguinis: deinde redi ad incidendum.

illud quod remansit ex Nodo.

E De formis instrumentorum pro sectione & perforatione. Caput XLVI.
E I S sunt formae Intromissorum, et sunt triu specierum. Ex eis enim est magnum, & ex eis est medium, & ex eis est paruum.



Forma Intro-
missi magni.

Medij.

Parui.


Fiant ex ferro alfulud quadratarum extremitatum decenter, ut festinent introitum in apostemate. Et istae sunt formae Experientium, & nominantur albered, id est, perforantia: & unum eorum nominatur be-

Crib, id est, perforans: & sunt trium specierum. Ex eis enim est magnum, & medium, & paruum.

Forma Experientis magni.

Medij.

Parui.




Conueniunt, ut inuestigentur per ea apostemata, & exitura, & fistulae, & bubones ab eo quod inter ea est ex ossibus. Et alijs fiunt rotunda, terfa, lenia, sicut acus magnae quibus subsellia fiunt, ex citrino scilicet, aut ex aere, aut ferro, aut argento. Et meliora eorum sunt quae fiunt ex citrino. Et fiunt Experientia etiam de plumbo nigro, quae conueniunt ut per ea experiantur fistulae, quarum concavitate sunt reflexiones, ut reflectantur cum lenitate sua cum illis reflexionibus. Et sunt iterum trium specierum. Quonia ex eis sunt longa, ex eis media, & ex eis breuia, secundum quantitatem amplitudinis fistulae & stricture eius.

D

Forma Experientis ex plumbo nigro.

Medij.

Parui.




Forma Vncinorum, et sunt multarum specierum. Quoniam ex eis sunt simplices, scilicet quibus est curuatura una: & sunt trium specierum sicut uides, Magni, Medij, et Parui. Et ex eis sunt Vncini caeci: & sunt trium specierum. Et ex eis sunt uncini habentes duas curuaturas, & sunt trium specierum: & ex eis sunt uncini habentes tres curuaturas, & sunt trium specierum: & omnes isti sunt necessarii in loco suo.

Forma Vncini simplicis magni.

Medij.

Parui.



A
Forma Vncini cęci magni.

Medij.

Parui.

Forma Vncini magni habētis duas curuaturas,
Medij.

Parui.

Forma Vncini magni habētis tres curuaturas,
Medij.

Parui.

Et istę sunt formę Scalpellorum, quibus secantur & excoriantur Nodi, & apostemata: et sunt triū specierum: quoniā ex eis est magnū, mediū, et parū. Eorū extremitates quibus fit sectio sunt acutę, extremitates alię sunt non acutę: & non ponuntur taliter, nisi ut cum eis fiat iuuamentū in excoriatione Nodorū apud timorem incisionis uenę, aut nerui: & ut fanetur per ea infirmus, et inueniat tranquillitatem parū per ex adustione quam inuenit apud excoriationem apostematis.

B
Forma Scarpelli magni.

Medij.

Parui.

Forma Magda magni.


Medij.

Parui.

Istę sunt formę Magda, & sunt specierum trium.

C Fiunt ex aere, & sunt similia Radio, cum quo fit alcohol : & in extremitate lata est puncta Spatumilis occultata : & in ea currit ad interiora, & ad exteriora quando uis, sicut uidet.

Forma Spatumilis magni.



Forma Spatumilis medij.

Forma Spatumilis parui.


Forma Spatumilium quæ absconduntur inter digitos apud perforationem apostematum : & non percipiunt ea infirmi : et sunt trium specierum, magnum, medium, et paruum.

Mediæ.

Forma Ventosæ magnæ.



Forma Ventosæ parvæ.





D Formæ Ventosarum cum quibus absconditur fluxus sanguinis : & sunt trium specierum, magnæ, mediæ, & parvæ. Fiant ex aere, aut corno, rotundæ, ad longitudinem parui per, sicut uidet : & sint ad subtilitatem. Et oportet ut sint istæ species Ventosarum apud te magnæ, & parvæ, ut abscondas per eas sanguinem cum uelocitate apud necessitatem, & tunc quando non est tibi presens medicina. Verumtamen non utaris eis in abscissione sanguinis in omni loco corporis, & non utaris nisi in locis carnosissimis : sicut lacertis cruris, & coxæ, et lacertis brachiorum, & mammillarum, & uentris, et inguinum, & similibus eis, ex lacertis carnosissimis, humidis. Et quandoque fiunt ex eis instrumenta parua alia similia corticibus fistulicorum, secundum suam formam : quibus absconditur sanguis quando fluit ex loco phlebotomie, aut apud incisionem uenæ, aut arteriæ : & quandoque fiunt ex eis rotundæ secundum hanc formam.




Q De cura Mammillarum hominum quæ mammillis mulierum assimilantur. Caput XLVII.

VANDOQVE inflantur Mammillæ quorundam hominum apud complementum somni (id est, cum incipiunt pollui in somno) donec simulantur mammillis mulierum : & remanent

apostemose scede, Qui ergo abhorret illud, oportet ut secet super mam- **A**
 millas sectione lunari, secundum hanc formam ex linea, b.
 ad lineam, g. Deinde excoria pinguedinem totam. Postea
 imple vulnus ex medicamine incarnatio. Deinde aggre-
 ga duo labia vulneris cum futura, & cura ipsum, donec sa-
 netur. Si autem declinat mamilla ad inferiora, & mollificatur propter
 magnitudinem suam, sicut accidit mulieribus: tunc oportet ut findatur
 in duobus lateribus suis superioribus duabus sectionibus similibus fi-
 gura lunari, quarum unaquæque continetur cum altera apud fines utri-
 usque, donec sit linea maior continens minorem, secundum hanc formam ex
 linea, b. ad lineam, g. Postea excoria cutem quæ est inter
 duo labia, & aufer pinguedinem, et administra quod dixi-
 mus de futura & pulueribus, quod est necessarium ex curati-
 one, donec sanetur. Si autem non comples incisionem eius
 quod oportet te incidere, propter inquietudinem infirmi, aut propter flu-
 xum sanguinis: tunc oportet ut impleas vulnus coto submerso unguen-
 to corrosiuo, & dimitte ipsum, donec corrodat illud quod remansit ex
 pinguedine. Deinde cura ipsum, donec sanetur.

I De perforatione apostematis, quod accidit sub Tri- **B**
 tillico. Caput XLVIII.

I S T A apostemata quæ accidunt sub Trillico, sunt ex speciebus
 Strophularum dura, quæ continent kistis, & ex eis sunt quæ continent hu-
 miditates. Quæ ergo sunt ex eis quæ continent humiditates, oportet ut
 secentur sectione lunari, secundum hanc formam, ex linea
 b. ad lineam, g. cum ergo euacuatur totum quod est in apo-
 stemate ex sanie, tunc imple ipsum coto ueteri, et dimitte i-
 psum usque ad diem alium. Deinde auferatur cotum, & cu-
 retur cum unguento conueniente ad illud, donec sanetur. Quod si apo-
 stema fuerit ex specie nodorum Strophularum, tunc secinde super ipsum,
 sicut diximus in sectione super Strophulas æqualiter. Si autem extendi-
 tur vulnus in hoc ut emittat pus, tunc administra in eo cauterium, secun-
 dum quod diximus in eo quod præmissum est.

Q De sectione apostematis quod accidit propter Arte-
 riam & Venam. Caput XLIX.

Q UANDO disrumpitur Arteria, & consolidatur cutis quæ est
 supra eam, tunc multotiens accidit inde apostema: & simi-
 liter accidit Venæ etiā, ut accadat in ea apostema & inflatio. Et signa qui-
 bus cognoscitur, quod apostema & inflatio sint propter Arteriam et Ve-
 nam, sunt: quoniam, quando apostema est propter arteriam, est longum,
 aggregatum in profundo corporis: & quando impellit apostema digi-
 tis tuis, sentis quasi sit ei stridor. Et illud quod est propter Venam, est

Apostema
 Arteriarum.
 Venarum.

- C** rotundū in manifesto corporis . Et sectio super hoc apostema est error, & præcipue quod est sub ascellis, et inguinibus, & collo, et in locis multis corporis : et est magnū ualde. Oportet ergo, ut deuitet eius cura cum ferro, et quod ex eis etiam est in extremitatibus, aut in capite, oportet ut deuitetur. Super illud ergo quod ex eis est ex inflatione orificij Arterig, finde in cute sectione in longitudine. Deinde aperi sectionem cum uncinis, postea Arteriam : et libera eam ex tunicis, donec deregatur. Deinde intromitte sub ea acum, et fac eam penetrare usq; ad latus aliud, & stringe Arteriam cum filo duplo in duobus locis, secundū quod docui in extractione duarum Arteriarū quæ sunt in temporibus. Deinde punge locum, qui est inter duo ligamenta cum spatumili, donec egrediatur sanguis qui est in eo totus, et soluatür apostema. Deinde administra curationem quæ generat pus, donec cadant ligamēta : postea cura illud cum unguentis cōuenientibus ad illud, donec sanetur. Quod si fuerit apostema propter sectionem Venæ, tunc oportet ut teneas manu tua quod tibi possibile est ex apostemate cum cute. Deinde intromitte acum sub loco quem tenuisti manu tua, & fac eam penetrare : & sit in ea filum duplum, donec extrahas ipsum ex latere altero. Deinde liga cum ipso apostema ligamento bono : secundum quod dixi tibi in ligamento uuæ.
- D** duabus partibus cum duabus extremitatibus fili. Si autem times quod extrahatur filum, tunc intromitte acum aliam cum filo alio sub apostemate toto apud incisionem acus: preme, & stringe fila tua in quatuor locis. Deinde secā apostema in medio sui, donec quando egrediatur quod in eo est : tunc incide superfluitatem cutis, & dimitte quod ligatum est ex ea. Deinde pone super ipsum puluillum quem submersisti in uino, & oleo. Deinde administra curationem, quæ fit cum licinijs & unguentis, donec sanetur.

S De apostemate quod accidit ex torsione Nervorum. Caput L.

Apostema
Nervorum.

S I C V T accidit apostema in Arteria & Vena, similiter accidit apostema in Neruis: quod accidit in eis percussio, aut accidit a labore superfluo, et similibus: et fit plurimū illis in locis adiutoriorū, aut calcanei, & in omni loco in quo mouentur iunctura: et est apostema graue. Similatur color eius reliquo corpori, & est in pluribus dispositionibus absq; dolore: et quando stringitur cum uehementia, sentit in eo infirmus simile stupori. Et non est apostema aggregatum in profundo corporis, imo est sub cute, & ipsum mouetur ad omnē partem, et non uadit ad anteriora, uel ante, neq; retro ad posteriora. Quod ergo ex eis est in iuncturis, non oportet ut inuadatur cum ferro. fortasse enim accidet contractio. In illo autē quod ex eis est in capite, aut in fronte, finde cutem cum spatumili. Si ergo est apostema paruum, tunc tene ipsum cum forficibus, & abscinde ipsum a radice. Et si est magnum, tunc suspende ipsum.

rum uncino, & excoria ipsum: deinde aufer ipsum, & aggrega uulnus cum futura: & cura ipsum, donec sanetur.

¶ De sectione apostematis, quod accidit in uentre. Caput LI.

ACCIDUNT quibusdam hominibus multotiens in uentribus eorum, & in reliquis corporibus ipsorum, thelil, quæ nominantur Fungalia, per similitudinem ipsorum cum fungis. Quorū radix est subtilis, & ipsorum caput est grossum, & conuersa sunt labia eorum. Et est ex eis paruū: & est ex eis quod magnificatur ualde. Et ego quidem iam uidi uirum, et in uentre eius erant duo thelil, quæ erant magis quam rebus alijs similia fungis: non erat differentia inter ea, alba, minutæ radicis, & inuersabantur labia eorum, & findebantur, et humiditas curiebat ex eis semper. Incidi ergo ea, & inueni in pondere unius quasi .x. & viii. unc. & in altero quasi .vi. unc. Et operatio in incisione eorū est, ut consideres tunc, si infirmus est humidus, & color thelil est albus, humidum, subtilis radicis: tunc incide ipsum cum spatumili lato, & sint in præsentia tua cauteria in igne. Multotiens enim expellitur apud sectionem eius sanguis multus: propterea ergo si te uincit sanguis, tunc cauteriza ipsum. Quod si uides infirmum pauidum & timidum ab incisione cum ferro, tunc accipe filum ex plumbo decenter factum, et stringe cum eo athelul: cuius modus est quem diximus, & dimitte ipsum duobus diebus. Deinde adde in strictura plumbi. Non ergo cesses stringere plumbum, quotiens imprimit in thelil, donec abscindat, & cadat per se absq; labore. Si autem thelil grossæ fuerit radicis, tunc in incisione eius est quiddam timoris & pauoris: præcipue quod est in uentre. Verumtamen possibile est, ut incidas medietatem eius. Deinde cauteriza ipsum, ut non redeat. Deinde cura ipsum, donec sanetur uulnus. Et caue ne præsumas incidere thelil quod est fusci coloris, pauci sensus, foedi aspectus, ipsum enim est apostema cancerosum: & ego ueniam cum rememoratione Cancris post hoc.

¶ De cura eminentiæ Umbilici. Caput LII.

FIT eminentia Umbilici ex causis multis. Aut ex fissuris sisac, quod super uentrem est: & exit ex eo althub, aut intestinum, secundum quod accidit in reliquis rupturis. Aut ex sanguine qui fluit ex Vena, aut ex Arteria, secundū quod præmissum est. Aut ex uentositate coartata in eo. Si autē est propter fissuram sisac, et exitum thirbi: tunc est color apostematis similis colori corporis: & est lene, absq; dolore: & apparet diuersi situs. Et si est propter egressionem intestini, tunc est situs eius, cum eo quod narrauimus, uehementioris diuersitatis. Cum ergo tu premis ipsum digitis tuis, occultatur: deinde redit, & fortasse est cum eo sonitus: et magnificatur multū apud introitum balnei, & laborem uehementē. Si uero est propter humiditatē, est lene, tunc non occultat quan

Fungalia.

B

Causæ eminentiæ Umbilici.

Cdo premis ipsum manu tua, neq; constringit, neq; additur. Quod si est propter sanguinē, tunc cū istis signis apparet apostema ad nigredinē de clare. Si autē est propter carnē natam: tunc est apostema graue, grossum, durū, et figitur scđm quantitatē unam. Si uero est propter uentositatē, tunc tactus eius est lenis. Et operatio in illo est, ut cōsideres tūc, si eminentia umbilici est propter sanguinē Arteriæ, aut Venæ, aut uentositatem: tunc oportet ut prohibearis a curatione eius. Nam in illo est timor & pavor, sicut docui te in capitulo, in quo dixi apostemata propter arteriam & uenā. Quod si eminentia umbilici est propter intestinū, aut zirrbum: tunc oportet ut præcipias infirmo, quatenus teneat anhelitū suum, & ster stans extensus. Deinde signa cū encaustro in circūitu umbilici totius. Postea præcipe ei, ut resupinet inter manus tuas super dorsum suū. Deinde circūda cū spatulili lato in circūitu umbilici super locū quem signasti cū encaustro. Postea extende mediū apostematis ad superiora, cum uncino magno. Deinde liga eum in circūitu forti cum filo, aut cum chorda de serico ligamēto firmo: et sit nodus ligamētū alexorati. Deinde aperi mediū apostematis extensum supra ligamentū. Si ergo inuenis ipsum iam captū a ligamento: tunc extrahē alexorati, & intromitte in ipsum digitū indicem, et impelle intestinū ad interiora uentris: & si inuenis zirbū, tunc accipe ipsum cū uncino, et incide superfluitatem eius.

Si autē contraria est tibi arteria, aut uena: tunc circūda ipsum multū. Deinde redi ad operationem tuam. Et accipe duas acus, & intromitte in eis duo fila fortia: & intromitte duas acus in circūitu quem fecisti circa apostema in modū crucis, quas facis penetrare. Deinde stringe apostema in quatuor locis super acus: & si uis, aufer acus, et dimitte locum, donec putrefiat caro extensa: & cadat per se: aut incide ipsam quando subtiliatur & putrefit. Deinde cura ipsum cum eo quod oportet ex unguentis, donec sanetur. Quod si eminentia umbilici est ex carne nata in eo, aut ex humiditate: tunc oportet ut concaues apostema, sicut diximus. Et extrahas sanguinem, aut humiditatem, quam inuenis in eo. Deinde cura ipsum cum eo quod solidat locum.

De cura CANCRI.

Caput LIII.

IAM diximus in diuisione species Cancrī, & qualiter est uia ad curationē eius cum medicinis: et cauendū ab eo cum curatione eius cum ferro, ut non ulceretur: et diximus Cancrum generatū in matrice, & cautelam a curatione eius. Et dixerunt antiqui, quod quandoq; Cancer est in loco, ubi possibilis est eius eradicatio: sicut Cancer qui est in mamillis, aut in coxa, & eis similibus, ex membris locatis ad extrahendum totū eius: præcipue quādo est incipiens paruus. Quando uero antiquatur, et est magnus, non oportet ut appropinques ei. Ego enim non potui sanare ex eo aliquē: neq; uidi aliū ante me qui peruenerit ad illud. Et operatio in eo, quando est locatus sicut diximus, est, ut præcedas,

& soluas infirmū ex cholera nigra aliquotiens. Deinde phlebotomā i- A
psū si inuenis cū repletionē manifesta. Deinde præpara infirmū præ-
paratione, in qua locet cum operatione. Deinde proijce in Cancrū un-
cinos qui cōueniunt ei. Postea concava ipsū ab omni parte cū tute, se-
cundū perscrutationē, donec non remaneat aliquid ex radicibus eius: et
dimitte sanguinē currere, & nō abscindas ipsū uelociter, imo exprime
loca, et absterge sanguinē grossū totū manu tua, aut cū quo possibile
est tibi ex instrumentis. Si aut contrarietatem facit tibi fluxus sanguinis
grossi ex incisione arteriæ, aut uenæ: tunc cauteriza uenā, donec abscin-
datur sanguis. Deinde cura ipsū cū reliqua curatione, donec sanetur.

¶ De cura Hydropisis.

Caput LIIII.

I A M narrauimus in diuisione species Hydropisis, et qualiter sit ag-
gregatio aquæ: & signa omnis speciei, et curationem eius cum me-
dicinis. Et illa quæ curatur cum ferro, non est nisi species ascitis sola: &
non approximat cum ferro speciei tympanitis: neq; speciei hypofaræ
penitus: nam illud mortale est. Quādo tu iam medicatus es hanc spe-
ciem Hydropisis tympanitis cum medicinis, & non contulit medicatio
tua: tunc considera, nam si infirmo iam consecuta est debilitas, aut est
cum eo infirmitas alia præter Hydropisim: sicut si sit cum eo tussis, aut
uentris solutio, & similia illis: tunc caue ne mediceris ei cum ferro: quo B
niam est timor illud. Si autem uides infirmum exuberantis uirtutis,
neq; est cū eo ægritudo præter Hydropisim solam: et non est puer, neq;
senex: tunc modus operationis in eo est, ut tu eleues infirmum stantem
inter manus tuas, & minister post ipsū exprimāt uentrem eius manu
sua impellendo aquam ad inferiorem partem pectinis. Deinde accipe
spatūmile spinosum, secundum hanc formam.



Spatūmile
spinosum.

Sit duarum partiū acutarum, longū, acutæ extremitatis sicut Spatūmī-
le. Verūtamen in eo sit quiddam breuitatis paulatim, ut non pertranse-
as cum eo apud operationē usq; ad intestinū, & lædas ipsū. Deinde
considera. Nam si est generatio Hydropisis ex parte intestinorum, tunc
oportet ut elongeris cum sectione ab umbilico quantitate trium digito-
rum, ad inferiora in directo eius supra pectinem. Si uero generatio Hy-
dropisis est propter ægritudinē epatis: tunc sit sectio tua sinistra ab um-
bilico tribus digitis. Et si generatio eius est propter splenem, tunc sit sec-
tio in latere dextro: & non oportet etiā ut sit sectio in latere super quod
uult iacere infirmus, ut non currant superfluitates ad illum locum debi-
lem. Deinde perfora cum instrumento cutem totam. Deinde intromitte
te in illam sectionem, & eleua manū tuam cum Spatūmili inter cutem,
& sisac, quasi tu excories ipsū: & sit quantitas quæ excoriatur quanti-

Ctas unguis, aut circiter illud. Deinde perfora sisac, donec perueniat Spatumile ad locum uacuum: & est locus aquæ. Deinde extrahe ipsum, & intromitte in foramen instrumentum, cuius hæc est forma.




Et est simile cannulæ: sit ex argēto, aut ære, aut aurichalco, lene, tersum: cui in inferiori parte sui est foramen paruum, & in lateribus eius sunt tria foramina, duo ab una parte, & unum a parte altera: et facta est extremitas eius incisa, secundū modum incisionis calami, sicut uides: in extremitate eius superiore est armilla. Nam quādo instrumētum pertuenit ad aquam, tunc ipsa descendit statim super instrumentum, ergo euacua ex



aqua in hora quantitātē mediam. Quoniā si tu euacuas ex ea plus quam oportet, in hora fortasse moritur infirmus per resolutionē spiritus sui animalis: aut accidit ei syncopis quæ appropinquat morti. Verum euacua ex ea secundū quantitatem uirtutis eius, et secundū quod significat tibi dispositiones infirmi ex uirtute pulsus eius, & ex bonitate eius. Deinde extrahe instrumentum, & retine aquam. Quod est, quia retinetur statim propter cutem quæ retinet foramen quod est super sisac: de quo narraui, ut perfōres ipsum secundū illum modum. Deinde itera instrumentum die altero, si uides infirmum tolerare illud: & extrahe etiam ex aqua quantitātē paruam. Fac illud diebus aliquot sine timore, & custodi te ab errore: donec non remaneat ex aqua nisi parum. Si autem times super infirmū, et dimittis ex aqua rem multam: tunc cura ipsum cum seepultura in harena calida, & sudore multo in balneo & sole, et expectet super sitim: & cura ipsum cum medicinis exiccatiuis, donec sanetur: & cauteriza super stomachum, & epar, et splenem, post extracōnē aque: secundum quod narraui in eo quod præcessit.

Q De cura infantium qui nascūtur locis urinæ eorum non perforatis. Caput LV.

ex uobis
QUANDO egreditur aliquis infantium ex uentre matris suæ, & caput mutonis eius est non perforatum, aut est foramen strictum, aut in non suo loco. Oportet ergo succurrere cum perforatione eius statim tū nascitur cū Spatumili subtili ualde, scđm hanc formā.



Deinde pone in foramine clauum subtilem ex plumbo, & liga ipsum: et tene ipsum tribus diebus, aut quatuor. Quando ergo uult urinam emitte, remoueat, et mingat. Deinde reduc ipsum. Et si tu non ponis plum

bum, iam possibile est, ut urina quæ incedit super locum, non permittat ipsum claudi. Ille autē cuius foramen est strictum, medicatur cū plumbo, sicut diximus, diebus multis, donec amplificetur. Illi autē in quibus est foramen in non suo loco, læduntur. Quod est, quia ex eis qui nascitur, foramen est apud finem capitis uirgæ: quare non potest mingere ad anteriora, donec eleuat uirgam manu sua ad superiora. Neq; est ei generatio, propterea, quod sperma non potest peruenire ad matricem secundum rectitudinem: & est ægritudo fœda ualde. Et modus operationis in illo est, ut resupinetur infirmus super dorsum suum. Deinde extende caput uirgæ eius manu tua sinistra extensione uehementi, & incide caput capitis uirgæ ex loco priapi, cum acumine, aut spatumili acuto: sicut est incisio calami, aut sicut tu radis aliquid, ut medium eius ueniat simile capiti uirgæ: & ut cadat foramen in medio secundum quod oportet. Et caue tibi apud operationem tuam a fluxu sanguinis. Multotiens enim accidit illud. Oppone ergo ei cum eo quod abscindit sanguinem, & cura uulnus, donec sanetur.

C De Albather quæ accidunt in præputio & capite uirgæ, & corruptione, nigredine, & adhærentia.


Caput

LVI.

MULTOTIENS accidunt istæ Albather in uirga, & est eminentia carnis fœdæ. Et ex ea alia est maligna, & alia non maligna. Non malignā ergo oportet ut suspendas cum uncino subtile, & abscindas eam, donec mundes eam totam. Deinde pone super eam cotum submersum in unguento ægyptio. Deinde cura ipsum post illud cum unguento dyasfinicon, donec sanetur. Quod si Albather est maligna, fœdicoloris, tunc oportet ut administres in ea cauterium post incisionem eius & ipsius rasionem. Si autem Albather est in præputio captiui, non circumcisi, & est pars Albather inter præputium, et pars eius extra: tunc oportet ut auferas Albather, quæ est intus in primis, donec quando consolidatur, tunc cura ipsum exterius: quoniam quando tu curas eam simul, non securatur præputiū quin preforetur. Et iam accidunt etiam in testiculis, & præputio nigredo & corruptio. Oportet ergo, ut tu concaues totum quod iam denigratum est, et quod uult corrumpi, aut iam corruptum est. Deinde line super ipsum post illud cum melle quod iam concussum est cum farina corticum granatorum, et herbi tritorum cribellatorum. Deinde cura illud cum reliqua curatione, donec sanetur. Si autem accidat fluxus sanguinis, tunc administra cauterium cum cauterio lunari, secundum hanc formam.

B Albather.

Argumentū,
Autorem fuisse
sectæ Hebræ
orū. Vide supra
fol. 219, ca.
pit. 69.



Achærentia
præputij.

Cauterium enim est iuuatiuū ad duas dispositiones simul; scilicet ad fluxum sanguinis, et uulnus quando corrūpitur. Quod si corroditur caput uirgæ, & destruitur totū in hora: tunc oportet ut intromittas in meatū priapi cannulā ex plumbo, ut mingat infirmus super eam. In achærentia uero præputij cū capite uirgæ, et hæc quidem adherentia non accidit, nisi in eo cuius præputiū est sanum, & non exigit super ipsum circūcisio: et quandoq; accidit adherētia propter uulnus, aut apostema: oportet ergo ut excories eam cū Spatuli obtuso, donec soluantur ligamentū, & liberet caput uirgæ ab omni parte. Quod si est difficile discernere ea exquisite, tunc oportet ut excories aliquid ex capite uirgæ, & ex præputio, quod est, quia præputiū quando est subtile, fortasse perforatur propter subtilitatē suam uelociter. Deinde separa inter præputiū, & caput uirgæ cū panno lini subili, qui iā madefactus est in aqua frigida, ut nō adhereant iterū. Deinde curet cum uino stiptico, donec consolidet.

C De mundificatione infantium, & curatione ex errore eis accidente. Caput LVII.

De Circum-
cisione.

De Circumcisione. **C**IRCUMCISIO nō est solutio cōtinuitatis, sicut reliqua uulnera: uerūtamen cū sit ex operatione nostra, uolūtate nostra, & usus eius sit in pueris proprie, est necesse ut signemus in ea operationē meliorem, & uiam leuiorē perducentem ad salutē. Dico ergo, quod antiqui nō dixerunt circūcisionem in aliquo suorū librorum: quoniam non inuenitur in legibus suis, & non est nisi quod acquisiuius per experimentū. Quod est, quia ego inueni maiore partem artificū, & phlebotomatorū uti mundificatione, circūcidendo cū nouacula, & cū forficibus: & utuntur alfecati, & ligando cum filo, et incisione cū ungula. Et ego quidē iam
 .. probaui oēs istos modos, & non inueni meliorē mundificationē cum forficibus, & ligamento cum filo. Quoniam in mundificatione cū nouacula, multoties effugit cutis. Quoniam cutis præputij duas habet tunicas: ergo forsitan incidit cutis superior, & remanet tunica inferior: cogit ergo ad incisionē ad incidendum alterā, et dolorem futurū. Et cum mundificatione quæ fit per alfecati, id est, digitalis, quo utuntur sutores, non secuta tur incisio extremitatis uirilis membri; quoniam fortasse ingreditur in foramen eius. In mundificatione autē cum ungula, fortasse euadit ferum, & corrumpit operatiōem tuam: & cutis quidem pueri est brevis natura, & multoties nascuntur taliter, quod non indigent mundificatione: & iam uidi illud. Mundificationis autem cum forficibus, & ligamento cum filo, bonum experimentum detexit mihi: quoniam forfices sunt proportionalis incisionis: propterea, quod acuitas quæ est superius, est sicut acuitas quæ est inferius. Cum ergo premis manum tuam, proportionantur duæ acuitates, & incidunt secundum operationem unam in tempore uno: & fit compressio simili figura, continens cutem uirgæ ab omni parte, cum qua non cadit error omnino. Et modus operatio-

Ex his uerbis
colligitur proffundius
quidam fuisse
albarius

nis proprię est, ut facias extimare, puerum præcipue, si est ex eis qui in- **A**
 telligunt parumper, quod tu non facis, nisi quod ligas filum in uirga sua
 tantum: et dimittas ipsum usque ad diem alium. Deinde fac eum gaudere et
 latari omnimodo quo possibile est tibi illud, ex eo quod recipit intelli-
 gentia sua. Deinde fac eum stare inter manus tuas preparatę staturę, et
 non sit sedens: & occulta forfices in manica tua, aut sub pede tuo, ne ui-
 deat eos puer omnino, neque aliquid ex instrumentis. Deinde intromitte
 manum tuam ad uirgam eius, et suffla in cutem, & trahе eam sursum, do-
 nec egrediatur caput uirgę. Deinde mundifica ipsam ex eo quod aggre-
 gatur in ea fordicię. Deinde liga locum signatum cum filo duplo. Post
 ea liga inferius eo parumper ligamentum secundum. Deinde tene cum
 indice tuo, & pollice locum ligamenti inferioris retentione pone, & in-
 cide inter duo ligamēta. Deinde eleua cutem sursum uelociter, et extra-
 he caput uirgę. Deinde dimitte sanguinem currere paulatim (est enim
 melius) & pone puluerem desuper: et super puluerem pannum in quo
 expansus est uitellus oui decocti in aqua rosata, concussum cum oleo ros-
 aceti bono: & dimitte eum super ipsum usque ad diem alium: et cura ipsum reliqua
 curatione, donec sanetur. Forma aut forficis ad mundificationem hæc est.

**B**

Sint hebetes duę extremitates, & sint incidentes: ne egrediatur in eis ra-
 mus clauī: & sit longitudo duarum acuitatum, sicut longitudo duorum
 manubriorum æqualiter. Error uero cadens in mundificatione est:
 quoniam fortasse effugit cutis intrinseca tota, aut pars eius apud incisio-
 nem. Ergo oportet, ut extendas eam ex hora tua cum ungue tuo ante ap-
 ostemationem loci: & incidas eam secundum æqualitatem. Quod si
 non potes tenere eam cum ungue tuo, tunc extrahe eam cum uncino, et
 incide eam. Si autem præterierint ei tres dies, & remanet quod est
 sub uirga inflatum, apostematum: tunc dimitte illud, donec sedetur apo-
 stema calidum, & excoria illud cum facilitate, & incide illud secundum
 quod præparatur tibi: & caue tibi a capite uirgę. Non enim nocebit
 ei illud. Cura ergo illud cum eo quod consolidat uulnus ex pulueribus,
 quos narrauimus in tractatu de pulueribus: & si inciditur ex cute supra
 mensuram, & euadit ad superiora, non nocet ei illud etiam. Cura ergo
 illud cum eo quod diximus, donec sanetur.

De extractione Vrinę retentę in uesica.

Caput

LVIII.


V

R I N A E retentio in uesica, fit ab opilatione facta ex lapide,
 aut sanguine congelato, aut pus, aut carne nata, & similibus illis ex eis
 quę diximus ex modis curationis in diuisione. Et si nõ soluitur Vri-

Vrinę re-
tentio.

Cna, & uides retentionem eius esse propter Lapidem, qui iam est in collo uesicæ: tunc oportet ut sit infirmus super genua sua curuatus. Deinde componantur pedes eius super dorsum eius, et extendat ventrem suum ex superiori parte dorsi eius, & stringat infirmus anhelitum suū quantum possibile est ei. Cogitur ergo cum collo uesicæ ad expulsionem Lapidis ad posteriora: quare absoluitur Vrina. Quod si non soluitur cum eo qđ diximus, et uehemēs sit res super infirmū: tunc oportet ut administres extractionē eius cū instrumēto, qđ noiāt siringa, cuius hæc est for-


Siringa.




Sit ex argento, et sit subtile, lene, concauum sicut cannula pennæ auis in subtilitate radij, longū in similitudine palmi unius & medij: cui sit cannula subtilis in capite eius. Et modus exitus Vrinæ per ipm est, ut accipias filum duplicatum, & liges in extremitate eius lanam, aut cotum, ligatura bona: & intromittas extremitatem fili in inferiori parte Siringæ: & incide cum forficibus si superfluit aliquid ex lana, uerum intromitte in cannulam cum uehementia, sicut alzer. Deinde inunge siringam cum oleo, aut cum butyro, & albugine oui: et fac sedere infirmum super sedem, & embroca uesicam, et ipsius uirgam cum oleis humidis, & oleo oliuæ, et aqua tepida. Deinde intromitte siringā in uirgam cum facilitate, donec perueniat ad radicem uirgæ. Deinde dupla ipsam superius a parte umbilici. Deinde impelle siringam intra ipsam, donec perueniat ad Vesicam, & sentiāt eam infirmus iam peruenisse ad rem uacuum: & non fit hoc secūdum hunc ordinem, nisi quoniam meatus, in quo uadit, est in quo est tortuositas. Deinde extende filum cum lana paulatim. Vrina enim sequetur lanam. Deinde extrahe eam, & fac currere Vrinam per uiam urinæ: & itera siringam, & nō cesses facere illud, donec euacuetur uesica, & inueniat infirmus alleuiationem.

¶ De qualitate clisterizationis uesicæ cum Clepsidra. Caput LIX.

QUANDO accidit in uesica ulcus, aut sanguis in ea congelatur, aut cōartatur in ea pus, & uis distillare in eam aquas & medicinas: tunc fiat cum instrumento quod nominatur Clepsidra, & hæc est forma eius.



Est enim surda, id est, clausa. Et in eo sunt tria foramina, duo ex parte una, & unum ex parte altera, sicut uides. Et locus concauius, in quo est illud quod impellit, sit secundū quantitatem quod opilet ipsum sine additione, donec quando trahitur cum eo aliquid, ex humiditatibus attrahatur: et quando impellitur, cum eo expellatur ad longinquū: secundum quod facit clepsychra, qua proficitur naphra, id est, ignis grecus in prælijs martis. Cum ergo uis projicere humiditates in uesicam, intromitte extremitatem clepsychræ in humiditatem, & trahere cum eo quod impellit ad superiora. humiditas enim trahitur in concauitatem clepsychræ. Deinde intromitte extremitatē eius in uirgam, secundū quod narrauimus in siringa. Deinde impelle humiditatē cum eo quod impellit, illa namque humiditas peruenit ad uesicā statim, ita quod sentit eam, infirmus. **Forma clisteris subtilis, quo clisterizatur uesica.** Fiat ex argento, aut au-




ricalco: cuius caput altius sit simile alcama paruo, & sub eo sinus inter quem cadat ligamentū. Deinde accipe uesicam arietis, & pone in ea humiditatem, quā uis clisterizare uesicam. Deinde liga eam inter duos sinus ligaturā fortī cum filo duplo: & calefac illam humiditatem parum per super ignē. Deinde intromitte extremitatē clisteris in uirgam, postea stringe manū tuam super uesicam cum humiditate strictura decenti, donec sentiat infirmus, quod illa humiditas iam peruenit ad uesicam. Si autem non est tibi præfens uesica, tunc accipe frustum pergameni, et fac ex eo circulum, & perfora ipsum ab omni rotunditate sua. Deinde intromitte filum forte in illis foraminibus, sicut reuoluuntur. Deinde aggrega circulum, sicut aggregatur aliofratu: postquam tu ponis in eo illud quod uis ex humiditatibus, & oleis, et aquis. Deinde liga ipsum in instrumeto: & fac cum eo sicut fecisti cum uesica ex expressione cū manu tua, donec perueniat humiditas ad uesicam.

I De extractione Lapidis. Caput LX.

IA M diximus in diuisione species Lapidis, & curatiōem eius cum medicinis: et dixi differentiam inter Lapidem generatum in renibus, & uesica, et signa illius totius: & dixi Lapidem in quo cadit operatio cum manu & sectio: et est Lapis generatus in uesica proprie: & ille qui figitur in uirga: & ego sum narrans illud cum expositione manifesta & abbreviatione. Dico ergo, quod Lapis generatus in uesica, plurimum accidit pueris. Et ex signis eius est, quod urina egreditur ex uesica similis aquæ in subtilitate sua: & apparet in ea harena alba, & fricat in-

- C** firmus uirgam suam, & laborat cū ea, et multotiens pendet. Deinde erigitur, & egreditur cum eo anus in multis eorū. Et est facilis sanatio puerorum, ex eo usquequo consequuntur quatuordecim annos. Et est difficilis in senibus. In iuuenibus autem est media, in eo quod est inter illud: & eius cuius Lapis est maior, curatio facilior: & si paruus, est e conuerso illius cura. Cum ergo peruenimus ad curatiōem, oportet in primis, ut mundificemus infirmum cum clisteri, quod extrahat totum stercus quod est in intestinis suis: ipsum enim quandoq; prohibet inuentionē Lapidis apud inquisitionem. Deinde accipiatur infirmus: cum pedibus suis, & concutatur, et moueatur ad inferiora: ut descendat Lapis ad profundum uesicæ, aut saltat de loco alto aliquotiens. Deinde fac eum sedere inter manus tuas præparatum, & manus eius sint sub coxis ipsius, ut fiat uesica tota declinans ad inferiora. Deinde perquire eum, et tange eum extrinsecus. Si ergo sentis Lapidem in spacio, tunc propera statim cum sectione super ipsum. Quod si non cadat sub tactu tuo omnino, tunc oportet ut abstergas digitum indicem cum oleo manus sinistrae, si infirmus est puer: aut digitum mediū si est iuuenis completus: & intromittas ipsum in anum suum, & perquire de Lapide, donec stat sub digito tuo: & conuerte eum paulatim ad collum uesicæ. Deinde preme super ipsum eum digito tuo, et impelle ipsum ad exteriora aduersus locum, cuius sectionem uis: & præcipe ministro, ut premat uesicam manu sua, & præcipe alij ministro, ut extendat testiculos manu sua dextra ad superiora: & alia manu sua, ut remoueat cutem, quæ est sub testiculis in parte a loco in quo est sectio. Deinde intromitte Spatumile incidens, cuius forma hæc est.



Et finde in eo quod est inter anum & testiculos, et non in medio, ad latus natis sinistrae: & sit sectio super ipsum lapidem, & digitus tuus sit in ano: & fiat sectio transuersa, ut sit sectio exterius ampla, & interius stricta, secundū quantitatem quod sit possibile egressio Lapidis ex ea non maior. fortasse enim comprimit digitus, qui est in ano Lapidem apud sectionem, et egredit absq; difficultate. Et scias, quod ex Lapide est cui sunt anguli & margines, quare sit difficilis exitus eius propter illud. Ex eo est lenis, similis glandulæ, et rotundus: & sit facilis egressus eius. Si ergo cui sunt anguli, & margines, adde in fissura. Quod si non egreditur ita, tunc oportet ut ingenes super ipsum: aut stringas super eum cum gestu decenter, cuius extremitas sit sicut Luna, quæ stringat super Lapidem, & non euadat ab ea: aut ut intromittas sub eo instrumentum subtile, curuata extremitatis. Si autem non potes super eum, tunc amplifica foramen parumper. Quod si uincit te aliquid ex sanguine, absce-

Lapidis sectio.


Lapidum uarietas.

de ipsum cum zegi. Si uero lapis est plus quam unus, tunc impelle in primis magnum ad os uesicæ. Deinde incide super ipsum. Postea impelle paruum post illud: & similiter fac si sunt plures duobus. Quod si magnus est ualde, tunc ignorātia est ut seces super ipsum sectione magna. Quoniam accidit infirmo una duarum rerum, aut ut moriatur, aut accidit ei distillatio urinae assidua: propterea, quia non consolidatur locus omnino. Verum administra expulsionem eius, donec egrediatur: aut ingenia in fractura eius cum forficibus, donec extrahas eum frustra- tim. Cum ergo compleueris operationem tuam, tunc imple uulnus thure, & aloe, et sanguine draconis: et stringe ipsum, et pone super ipsum pannum infusum oleo & uino, aut oleo rosato, & aqua frigida: ut sedetur apostema calidum. Deinde resupina infirmum super collum suum, & non soluas ligamentum, usque ad diem tertium. Cum ergo solueris ipsum, embroca locum cum aqua, & oleo multo. Deinde cura ipsum cum unguento dyasfinicon, & unguento basilicon, donec sanetur.

Cura post sectionem.

Si autem accidit in uulnere apostema calidum additum, & corrosio, & illi similia: sicut si congeletur sanguis in uesica, & prohibeatur ex eo urina: & cognoscitur illud ex egressione sanguinis cum urina. Intromitte ergo digitum tuum in uulnus, & extrahe illum sanguinem. Nam si remanet, prouocat ad corruptionem uesicæ, & putrefactionem eius. Deinde ablue uulnus cum aceto, & aqua, & sale: & oppone omni speciei cum eo quod conuenit ex curatione, usquequo sanetur. Et oportet in horis curationis totius, ut liges duas coxas, et aggredes, causa medicinarum quæ ponuntur super locum. Quod si lapis est paruus, et sit in meatu uirgæ, et figitur in eo, & prohibet urinae exitus: tunc cura ipsum cum eo quod narro antequam peruenias ad sectionem. multotiens enim a sectione excusaris per hanc curationem. iam enim probaui illud. Et est, ut accipias Perforatorium ex ferro alferico, cuius hæc est forma,

Perforatorium.



triangulatæ extremitatis, acutū, fixum in ligno. Deinde accipe filum, & liga cum eo uirgam sub lapide ut non redeat ad uesicam. Deinde intromitte ferrum perforans in uirgam cum facilitate, donec perueniat Perforatoriū ad ipsum lapidem: et reuolue Perforatoriū manu tua in ipso lapide paulatim: & coneris perforationem eius, donec facias ipsum penetrare a parte altera. urina namque absoluitur statim. Deinde preme manū tuam super illud quod remansit ex lapide ab exteriori parte uirgæ. ipse enim frangitur, & egreditur cum urina, et sanatur infirmus. Si autem non præparatur tibi hæc curatio, propter aliquid quod prohibet ab il-

C lo: tunc liga filum sub lapide, & filum aliud supra lapidem. Deinde seca super lapidem in ipsa uirga inter duas ligaturas. Deinde extrahe ipsum. Postea solue ligamentum, & mundifica sanguinem congelatum, qui sit in uulnere. Et non est necessarium ligamētum fili sub lapide, nisi ut non redeat ad uesicam: & ligamentum aliud desuper, nisi ut quando soluitur filum post egressionem lapidis, redeat cutis ad locum suum, & cooperiat uulnus: & propter illud necesse est tibi illud quando ligas filum superius, ut eleues cutem ad superiora, ut redeat apud complementum tuum, & cooperiat uulnus, sicut diximus.

P **¶ De extractione Lapidis mulierum.**

Caput

LXI.

Lapis mulieris difficulter curatur.

A R V M generatur Lapis in mulieribus. Si autē accidat alicui earū lapis, tunc difficilis est curatio, & prohibetur propter modos multos. Vnus eorū est: quod mulier fortasse est uirgo. Et secundus est, quia tu non inuenis mulierem quæ detegat seipsam medico, quando est caesa, aut ex habentibus maritos. Tertius est, quia tu non inuenis mulierem bene scientē hanc artem, præcipue operationem cū manu. Et quartus est longinquitas a loco lapidis: quare indiget sectione profunda, & in illo est timor. Quod si necessitas prouocat ad illud, tunc oportet ut accipias mulierē medicam, bene scientem: et parū inuenitur. Si uero priuaria ea, tunc quere medicū castum, subtilem, et præsentā mulierē obstetricem bene doctā in re mulierū, aut mulierē quæ in hac arte innuit partem artis: fac ergo eam præsentem, et præcipue ei, ut faciat totū quod præcipis ei ex inquisitione super lapidem. In primis quod est, ut aspiciat si mulier est uirgo: tūc oportet ut intromittat digitū in anum eius, & quærat lapidem. Si ergo inuenit ipsum, cōartet eum sub digito suo, & tunc præcipe obstetrici, ut intromittat digitum suū in uulua in firmā, et inquirat super lapidem, postquam ponit manū suā sinistram super uesicam, et comprimit eam cōpressionē bona. Si ergo inuenit lapidem, tunc oportet ut gradatim moueat eum ab orificio uesicæ ad inferiora cū summa uirtutis suæ, donec perueniat cum eo ad radicem coxæ. Deinde fecerit super eum apud oppositionem medietatis uulua apud radicem coxæ, ex quacūq; parte præparatur ei, & sentit lapidem in illa parte: & digitus eius non remoueatur a lapide, cōartans sub eo: & sit sectio parua in primis. Deinde intromittat radium super illam sectionem. Si ergo sentit lapidem, tunc addat in sectionem secūdum quantitātē proportionatā quod lapis egreditur ab ea. Et scias, quod species lapidis sunt multæ. Ex his enim est paruus, & magnus, lenis & asper, longus, & rotundus habens ramos. Scias ergo species eius, ut significetur tibi per hoc super illud quod uis. Si ergo uincit te sanguis, tunc adde in loco zegerium, & tene ipsum hora una, donec abscindatur sanguis. Deinde redi


ad operationem tuam, donec egrediatur lapis: & fac, ut præpares te **A**
cum ex instrumentis, quæ dixi in extractione lapidis in uiris, ut adiue-
ris per ea in operatione tua. Quod si uincit te fluxus sanguinis, & scis
quod expulsio sanguinis est ex arteria quæ incisa est: tunc pone pulue-
rem super locum, et stringe eum cum puluillis strictura decenti: et non
mutes illud: & dimitte lapidem, et nō extrahas ipsum, fortasse enim mo-
rietur mulier infirma. Deinde cura uulnus. Cum ergo sedatur acuitas
sanguinis post dies, & putrefit locus, tunc redi ad operationem tuam,
donec egrediatur lapis.

¶ De sectione super Herniam aquosam.


R **Caput** **LXII.**

A M E X aquosa non est, nisi aggregatio humiditatis in sisac **Ramex**
albo, quod est sub cute, testiculi continente ouum: & nominatur sisac **aquosa.**
Et quandoq; est in panniculo proprio sibi, quem præparauit ei natura
in parte oui, donec putetur: quod est ouum aliud, et est cutis testiculi in-
ter sisac album, quod diximus: & nō fit illud nisi raro. Et generatio qui-
dem huius ramicis, est ex debilitate quæ accidit testiculis: quare effundi-
tur ad eos hæc materia. Et quandoq; accidit ex percussione super testi-
culos: Et hæc humiditas est habens colores multos. Aut enim est color
eius decliuus ad citrinitatem, aut est sanguineus rubeus, aut feculentus,
niger, aut est aquosus albus, & est illud quod est plus: Et signa quibus **B**
scitur ubi sit aggregatio aquæ, sunt ista. Nam si est in sisac albo quod di-
ximus, tunc apostema est rotundum ad longitudinem, parum per sicut
figura oui: & non apparet testiculus, quoniam humiditas continet eum
ab omni parte. Et si est humiditas in panniculo proprio sibi, tunc apo-
stema est rotundum cum parte oui, & propter hoc extimat homo quia
est ouū aliud. Et si humiditas est inter cutem testiculorū et sisac album,
tunc cadit sub sensu. Quando ergo uis cognitiōem coloris humiditatis,
tunc experire colorem humiditatis in apostemate cum Intromisso qua-
drato, cuius forma præcessit. Secundum illud ergo quod egreditur in
uestigio Intromissi, iudica de illo quod est inter ipsum. Cum ergo ue-
nimus ad curationem cum ferro, tunc oportet ut præcipias infirmo, ut
phlebotometur si possibile est ei illud, & uides corpus eius plenū. De-
inde resupinetur super dorsum suum super rem altam parum, & pone
sub eo pannos multos. Deinde sede tu super sinistram eius, & præcipe
ministro, ut sedeat a dextra eius, qui extendat uirgam eius ad unū duo-
rum laterum cutis testiculorū, & ad partem mirach uentris. Deinde
accipe sparumile latum, & seca cutem testiculorum ex medio per longi-
tudinem, usq; prope pectinem: & fiat sectio secundum rectitudinem æ-
quedistantis lineæ quæ diuidit cutem testiculorū, donec perueniat ad
sisac album comprehendens: & excoria ipsum & obserua, uel caue ex

C hoc, ut feces ipsum: & sit excoriatio tua qua ipsum excorias, ex parte quæ suspenditur cum ouo plus: & subtiliter scrutare cum excoriatione secundum quantitatem quod tibi possibile est. Deinde perfora sisac plenum aqua perforatione ampla, & extrahe totam aquam. Deinde separa inter duo labia sectionis cum uncinis, & extende sisac ad superiora, & non tangas cutem testiculorum comprehendentem: et incide sisac qualitercunque est possibile tibi incidere ipsum, aut cum totalitate sua, aut frustatim, præcipue latus eius subtile. Nam si tu non exquisite perscrutaris, in incisione eius non fit securitas, quin aqua redeat. Si autem procedit ouum exterius a cute sua in hora operationis tuæ: tunc quando compleueris sectionem sisac, reduc ipsum. Deinde aggrega duo labia cutis testiculorum cum futura. Deinde cura ipsum sicut reliqua uulnera, donec sanetur. Quod si inuenis ouum corruptum ex nigredine alia, tunc oportet ut liges uasa, quæ sunt suspensorium, timens fluxum sanguinis. Deinde abscinde testiculum cum suspensorio, & extrahe ouum: postea cura illud cum eo quod diximus. Si uero aqua est aggregata in duabus partibus, tunc scias quia sunt duæ ramices: seca ergo partem aliam secundum quod fecisti in altera æqualiter. Et si æquatur tibi, ut sit operatio una, tunc fac: deinde absterge sanguinem. Et introduce in sectiones lanam submersam in oleo, aut in oleo rosato: & pone de foris lanam aliam quam submersisti in uino & oleo, & expande eam super duos testiculos, et mirach uentris: & pone de super pannos duplicatos, et sunt puluilli: & liga eos de super cum ligamento, quod est habens sex secundum hanc formam.



Deinde sumantur duo panni, et suantur, & impleantur lana carminata, secundum hanc similitudinem: et fiant extremitates quibus premitur ex coto, aut lana humida: et aggregentur cum strictione in lumbari bracharum: et una extremitas accipiat super anum usque ad dorsum, et secunda accipiat ad partem pectinis: & duæ extremitates super duas coxas inferius, & duæ extremitates alie super duo inguina, et aggregetur strictione tota in lumbari bracharum. Et, quandoque artificialiter medicatur hæc rax mex cum cauterio loco sectionis cum ferro: & est, ut accipias cauterium cultellare subtile, & feces cum eo cutem testiculorum: et est ignitum, secundum quod narrauimus: donec quando detegitur sisac album continens aquam: tunc accipe cauterium, secundum hanc formam.



Assimilatur literæ græcæ. Deinde perfora cum eo illud sisac, & est ignitum.

tum, donec egrediatur humiditas tota. Deinde extende fīfac cum unciis **A**
 nis, & excoria cum cauterio subtili ignito, & incide ipsum secundum
 quod possibile est tibi, donec eradices totum eius. Et caue ex ouo, ne tan-
 gat ipsum ignis. Et scias, quod hæc operatio est saluior, & longinquior
 a fluxu sanguinis, & melior quam operatio cum sectione. Si uero con-
 trarietatem tibi facit in hora sectionis, aut in hora cauterij apostema cas-
 lidum, aut fluxus sanguinis, aut aliquid aliud: tunc oportet ut cures quod
 contrarietatem tibi facit ex illo cum curatione quæ conuenit ei, secundū
 quod præmissum est. Si autem infirmus est timidus, & non expectat
 super hanc operationem, propter horribilitatem suam: tunc administra
 perforationem secundū quod ego narro illud: & est. Quando certifica-
 tur tibi apud te per illud quod diximus de significationibus, qđ ramex
 est aquosa: tunc oportet quod facias federe infirmū super sedem eleuatā.
 Deinde perfora apostema in inferiori parte sui cū spatium lato: & po-
 ne perforationem secundū longitudinem corporis, et sit apertio ampla,
 donec currat aqua tota. Deinde pone super locum cotū, & liga ipsum,
 & dimitte ipsum ut currat residuum aquæ: deinde cura ipsum, donec sa-
 netur uulnus. Si autē contrarietas sit egressionī aquæ in hora qua per-
 foras ipsam: & non sit illud nisi propterea, quia panniculus albus con-
 trarietatem facit in orificio uulneris, et prohibet exitū aquæ: tunc opor-
 tet ut intromittas pennam in uulnus, aut instrumentū cum quo extrahi **B**
 tur aqua hydropicorum, cuius forma præcessit: aut adde in operatione
 uulneris parūper. Et scias, quod aqua redit, & aggregatur post sex men-
 ses, aut circiter eos. Cum ergo aggregatur, tunc perforetur secundū eun-
 dem modum, & pertransibit infirmus dies suos.

Cura perfora-
tionis.

¶ De cura Ramicis carnosæ. Caput LXIII.

S C I A S, quod in sectiōe super hanc Ramicem, est ex timore per-
 ducēte ad perniciem in pluribus dispositionibus. Quapropter ui-
 detur mihi eius dimissio saluari ex ea. Et ego sum rememorans operati-
 onem in ea, & species apostematis. Dico ergo, quod accidunt apostema-
 ta multa in corporibus, ex quibus componuntur testiculi: et sit illud ex
 caussis multis, scilicet. Aut ex superfluitate acuta, uel acri, quæ effunditur
 ad testiculos. Aut ex percussione. Et est color apostematis secundū co-
 lorem corporis, & non inuenitur ei dolor: et est apostema graue. Et for-
 tasse est apostema lapideum, cuius color est fuscus, & non est sensus ei.
 Et quandoq; sit ex nodatione arteriarum, & inflatione earum: sicut iam
 præcessit eius rememoratio: aut ex inflatione uenarum. Quod ergo
 est ex eis ex inflatione arteriarum, cognoscitur per dispositionem apōste-
 matis, quando comprimis ipsum digitis tuis. Et non oportet ut tangas
 ipsum prorsus. Illud uero quod sit ex inflatione uenarum, non dispergi
 tur ex eo aliquid apud compressionem cum digitis. Et iam possibile est,
 quod super hanc speciem fiat sectio, & super reliquas carnes: & est, ut

C feces cutem testiculorum. Deinde extende ouum ad sursum, & extrahe ipsum cum sisach albo: & libera suspensorium ex uasis, et liga uasa: & incide suspensorium postquam tu liberas ipsum ab omni parte ex partibus oui. Si ergo ouū consolidatū est cum illis carnibus natis, tunc oportet ut attrahas ouum, & incidas ipsum. Et si adhærentia est inter aliquid ex siphaket, aut in eo quod est inter uasa: tunc oportet ut liberes totam illam adhærentiam, & incidas eam incisione rotunda. Si autem est natiuitas carnis in loco adhærentiæ quæ est retro: tunc oportet ut incidas totum eius, & extrahas ouum, sicut diximus. Cum ergo completur operatio tua, tunc imple uulnus in lana infusa in oleo rosato, & uino: deinde cura ipsum cum reliqua curatione, donec sanetur.

V De cura Ramicis, quæ est cum Vite. Caput LXIII.

Vitis.

I T I S, est apostema inuolutum quadam inuolutione, simile botro, cum mollificatione testiculorum: & fit difficilis super infirmum motus & exercitium, et deambulatio. Et in curatione huius ægritudinis est ex timore, propter illud cuius præcessit rememoratio. Verum oportet, ut dicamus operationem in ea secundū quod fecerunt primi. Dico ergo, quod oportet ut facias sedere infirmū super sedem eleuatā. Deinde impelle suspensoriū testiculorum ad inferiora. Deinde tene cutem testiculorū cum digitis uis, cum uasis quæ sunt propinqua uirgæ: & teneat ea minister alius, et extendat ea extensione uehementi. Deinde incide cum spatumili lato acuto sectione transversa in directo uasorū, donec detegātur uasa. Deinde excoria ab omni parte, sicut diximus tibi in extractione Arteriarū quæ sunt in temporibus. Postea fige in eis acū in qua sit filum duplū, et liga ipsum in primo locorū quibus accidunt Vites: et liga ipsum iterū in ultimo eorū. Deinde seca ea in media sectione recta secundū longitudinē corporis, et extrahe quod aggregatur ex humiditatibus sæculētis corruptis. Deinde cura uulnus cū curatione reliquorum uulnerū, in quibus uis generari saniem, ut cadant uasa quæ nutriūt unum testiculorū. non est enim malū per illud. Si autē accidat Vitis omnibus uasis, tunc oportet ut extrahantur propter hoc testiculi cum uasis: ut non priuetur ouum nutrimento, propter incisionem, & tabescat, uel arefcet, & non sit iuuamentum cum eis.

E De cura Ramicis intestinalis. Caput LXV.

Alias * intestinalium.

V E N T V S huius Ramicis est ex sectione, quæ accidit in sisach extenso super uentrē in parte inguinū ex mirach uentris. Quare descendunt intestina ex illa Ruptura ad unū * testiculorū. Et hæc Ruptura est aut ex sisach, aut extensione eius. Et accidunt istæ duæ species ex causis multis. Aut ex percussione. Aut saltu. Aut clamore. Aut elevatione rei grauis, et similibus. Et signum, quando est ex extensione sisach,

est, quod accidit paulatim in tempore longo, & non accidit subito: et est apostema a quale uersus profundū: propterea, quod sisach cōprimit intestinū. Et signum eius quando est ex sectione sisach, quia facit accidere ex principio sui dolore uehementē subito: et est apostema diuersum, apparens sub cute propinque: & illud est propter exitū intestini, et curus eius ad exteriora sisach. Et quandoq; egreditur cum intestino zirbum: et nominat hęc Ramex intestinalis, et zirbia: et quandoq; fit cum uentositate. Et quādoq; currit in intestinū stercus, et retinetur illic: & est cum eo pernicies infirmi: quoniā facit accidere dolorem prauū, et pręci pue quando premitur. Et in curatione specierū ægritudinis huius cum ferro est timor: quare oportet, ut caueatur casus in ea. Et modus operationis est, ut pręcipias infirmo, ut reducat intestinū manu sua ad interiora concauitatis suę, si obedit reditui. Deinde resupinetur super collū suum inter manus tuas: et eleua crura eius. Deinde extende cutem quę sequitur cutem ad superiora, & seca cutem testiculorū totam per longitudinem. Deinde fige in duobus labijs sectionis uncinos, secundū quod indiges ad aperiendum sectionem cum eis: & sectio sit secundum quantitatem, quod sit possibile, ut egrediatur ex ea ouum. Deinde excoria siphach, et quę sunt sub cute testiculorum, donec quando detegitur sisach album, durum ab omni parte: tunc intromitte digitum tuum indicem in eo quod sequitur testiculum, in eo quod est inter siphach album, quod est sub cute oui, & inter sisach secundum, & absolve cum eo adhærentiam quę est in posteriori parte oui. Deinde moue cum manu dextra ad interiora cutem testiculorum: & cum hoc extende sisach album ad sursum, cum manu sinistra: & eleua ouum cum sisach ad partem sectionis: & pręcipe ministro, ut extendat ouum ad sursum: & tu solue adhærentiam, quę est retro solutione completa. Et quare digitis tuis, ut non sit aliquid illic ex intestino inuoluto in sisach albo duro. Si autem inuenis ex eo aliquid: tunc impelle ipsum ad uentrem inferius. Deinde accipe acum, in qua sit filum grossum, factum licinium ex decem filis: & intromitte ipsam apud postremū sisach, id est, tunicę, quod est sub cute testiculorum quę sequitur sectionem: deinde incide extremitates quę eminent ex filo, donec sint quatuor fila. Deinde compone quędam eorum super quędam cum figura quę sit in modo crucis: & liga cum eis alsisach, de quo diximus, quia est sub cute testiculorum ligamento uehementi, donec non possit aliquid ex uasis, quę nutriunt eos mittere ad eos aliquid: ut non accidat inde apostema calidum. Et pone iterum ligamentum secundum extra ligamentum primum, longinquum ab eo minus duobus digitis. Et post ista duo ligamenta dimitte ex sisach, quod est sub cute testiculorum, quantitatem magnitudinis digiti: & incide reliquum totum secundum rotunditatem, & aufer ex eo ouum. Deinde seca in inferiori parte cutis testiculorum sectio-

Ramex intestinalis.

B

Cne, ex qua currit sanguis, & sanies: sicut narrauimus in eo quod premis-
sum est. Deinde administra lanam submersam in oleo, & pone in uul-
nus: & administra ligamentum quod narrauimus. Et quandoq; cauter-
rizatur sisach albū quod diximus, post incisionem eius timendo de flu-
xu sanguinis. multotiens enim accidit illud. Et dimitte ligamentū, donec
cadat per se. Si autem tardatur casus eius, tunc embrocetur cum aqua ca-
lida: & pone super ipsum illud quod diximus, donec cadat. Deinde cura
ra uulnus cum reliqua curatione uulnorum, donec curetur.

I De Ramice uentosa. Caput LXVI.
N H A C Ramice non uidi aliquem qui ausus fuerit super cura-
tionem eius cum ferro. Et primi quidem dixerunt, quod sit sic
ut narrauimus in Ramice quæ est cum Vite. Quod est, ut liges uasa post
sectionem super ea cum facilitate inferius: deinde seca in medio, & cura
postremo cū eo quod aperit ipsum, donec cadant uasa: & cura uulnus,
secundum quod diximus, donec sanetur.

Q De disruptione quæ fit in inguinibus. Caput LXVII.
V A N D O accidit Ruptura in inguinibus, sicut diximus, &
eminet locus, et non descendit ad testiculos aliquid ex inte-

Dstinis: & si descendit, est illud parum, et redit in omnibus horis: uerum
si prolongatur cū ea tempus, additur fissura in sisach, donec descendit
intestina in sisach. Et accidit illud ex extensione sisach, qd est in inguini-
bus, sicut diximus. Quod est, quia extendit sisach: deinde mollificatur,
& apostematur locus, et eminet. Et cura eius est cum cauterio, sicut præ-
cessit eius narratio. Et quandoq; curatur cū ferro, secundū hunc mo-
dum: & est, ut iaceat infirmus super dorsum suū inter manus tuas. De-
inde seca locum Rupturæ apostematū et eminentē, sectione per latitudi-
nem, secundū quantitatem triū digitorum. Deinde stringe alsifak et, quæ
sunt sub cute, donec quando detegit sisach albū, quod est sub cute quæ
sequit ipsum. Tunc accipe radiū, et pone ipsum super locū eminentem
ex sisach, & preme ipsum ad profundum uentris. Deinde sue duo loca
eminētia super extremitatem radij ex sisach, et annecte cū sutura unum
eorū cum altero: deinde extrahe extremitatem radij. Et non incidas alsif-
ach omnino, neq; tendas ouū, neq; aliud, sicut feci te scire in curatione
ramicis intestinalis. Deinde cura illud curatione uulnerū. Cum ergo in-
cidis fila, mūdifica illud, & restaura uulnus, donec consolidetur. Sisach
enim contrahitur, & non additur eminentia Rupturæ. Et cauterium est
melius in hoc loco: quoniam est propinquius ad salutem.

M De mollificatione cutis testiculorum. Caput LXVIII.
V L T O T I E N S mollificatur cutis testiculorum in qui-
busdam hominibus, propter quod mollificantur carnes quæ sunt in

ea, & scedatur aspectus eius. Ergo necesse est ei qui rogatur in curatione eius, ut faciat iacere infirmum super dorsum suum, & incidat totam cutem quæ mollificata est super cutem naturalem. Deinde aggreget duos labia cum futura: & si uis, sue in primis superfluitatem cutis mollificatæ tribus futuris, aut quatuor, & firma futuram. Deinde incide inter futuras. Deinde cura curatione reliquorum uulnorum, usquequo sanetur, & cadant fila.

¶ De Castratione.

Caput LXIX.

SC I A S, quod Castratio in lege nostra excommunicata est: & propter illud liceret mihi, ut nō rememorarer eius in libro meo isto: & non est necessaria rememoratio eius, nisi propter duos modos. Quorū unus est, ut sit illud in scientia medici quando interrogatur de ea: & ut sciat curationem eius cui accidit. Et modus alter est, quod nos multoties indigemus castratione quorūdam animalium, propter iuuenta nostra per illud. sicut arietum, hyrcorum, et gattorum, & similibus ex animalibus. Dico ergo, quod Castratio fit secundum duos modos. Aut per attritionem. Aut per fissuram, & sectionem. In illa autem quæ fit per attritionem, uia operationis est: quod nos faciamus sedere animal in aqua calida, donec mollificentur testiculi eius, et leniantur, & pendeant: deinde attere eos manu tua, donec resoluantur et non appareant sub tactu. In castratione autem per fissuram & sectionem, oportet ut teneas animal, & premas cutem testiculorum eius cum manu sinistra. Deinde liga suspensorium, et seca super omne ouum sectione una, donec quando procedunt duo oia: tunc incide ea postquam excoriaris utrumque, & non dimittas super ea ex sisaket aliquid præter sisac subtile, quod est super uasa. Et iste modus castrationis est melior eo qui fit per attritionem: quoniam attritio fortasse relinquit aliquid ex testiculis, quare desiderat animal coitum. Deinde cura uulnus, donec sanetur.

Ecce Auctore
sectę hebraicę.

Castratio.

¶ De cura Hermaphroditæ duorum modorum.

Caput LXX.

H E R M A F R O D I T A ex uiris est secundum duos modos. Vnus eorum est, quia apparet in eo quod sequitur spacium, aut in cute testiculorum, in eo quod est inter duos testiculos, figura quasi uulua mulieris, in qua sunt pili: & quandoque currit urina ex eo quod est in cute testiculorum. In mulieribus autem est species una, et est uulua mulieris super pectinem sicut testiculi uiri parui omnino, eminentes ad exteriora: quorum unus est sicut priapus uiri, & duo sicut duo testiculi. Et curationis trium specierum, duarum ex uiris, et speciei unius ex mulieribus, est: quia oportet ut incidās carnes additas, donec effugiat impressio eorum. Deinde cura eas curatione reliquorum uulnorum. In specie autem secunda uirorum, ex qua egreditur urina, quæ est in cute testicu-

B

Clorum, non est operatio, neq; est eius curatio omnino.

T. ¶ De incisione Tentiginis, & carnis eminentis in uuluis mulierum. Caput LXXI.

Aegritudo
caudata.

TENTIGO fortasse additur super rem naturalem, donec foedatur & turpis sit aspectus eius: et quandoq; magnificat in quibusdam mulieribus adeo, donec expanditur sicut in uiris, et peruenit usq; ad coitum. Oportet ergo ut teneas superfluitatem Tentiginis manu, aut cum uncino, & incidas: et non ultimes in incisione, præcipue in profunda dicis: ut non accadat fluxus sanguinis. Deinde cura ipsam curatiõe uulnerum, donec sanetur. Caro autem orta, est caro quæ nascitur in orificio matricis, donec impleat ipsum: & fortasse egreditur ad exteriora secundum similitudinẽ caudæ: & propter illud quidam primi nominant aegritudinẽ caudatam. Oportet ergo ut incidamus eam sicut incidimus Tentiginem, & curemus eam, donec sanetur.

Alratice.

A. ¶ De cura Alratice, quæ est uulua mulieris non perforata. Caput LXXII.

AL R A T I C A est, ut sit uulua mulieris non perforata, aut sit foramen paruum. Et est aut naturalis, aut accidentalis. Accidentalisis ex aegritudine quæ præcessit: & ipsa quidem fit aut ex carne nata addita, aut sisach subtili, aut spisso: & fit aut in profundo matricis, aut in lateribus eius, aut in superiore ipsius, aut inferiori eius: & prohibet a coitu & impregnatione, & partu, & fortasse prohibet menstrua. Et cognitio illius fit per aspectum obstetricis, si opilatio est apparens propinqua. Si autem non est apparens, tunc quære eam digitis tuis, aut cum radio. Si autem opilatio est ex sisach subtili, et est propinqua duobus labijs: tunc propera, et dirumpe ipsam. Et est, ut ponas super duo labia puluillos. Deinde pone indices tuos duarum manuum simul, & mulier sit super dorsum suum expansis cruribus suis. Deinde extende duo labia cum fortitudine, donec dirumpatur sisach subtile, & aperiat opilatio. Deinde accipe lanam, & imbibe eam in oleo, & pone ipsam super locum: & coeat mulier omni die, ut non consolidetur locus uice alia. Si autem sisach est grossum, spissum: tunc oportet ut seces ipsum cum spatulam lato simili folio myrti. Si autem opilatio est ex carne nata, tunc suspende eam cum uncinis, & incide eam: et sint te cum medicina quæ fluxum sedant sanguinis absq; mordicatione, sicut acacia, & sanguis draconis, & thus aggregatũ cum albugine oui. Deinde administra cannulã ex plumbo amplã, ut non consolidet uulnus uelociter, teneat eam diebus aliquot: et administra liciniũ ex lino sicco, deinde curet reliqua curatione, donec sanetur. Et quandoq; nascit in matrice natiuitas carniũ aliarum: oportet ergo ut incidant secundũ hunc mo-

dum: dum non est apostema cancerosum. apostemati enim canceroso **A** quod est in matrice, non fiat contrarietas cum ferro omnino.

H De cura hemorroidaū, Athelil, et Bothor rubeæ in uuluis mulierū. Caput LXXIII.

H E M O R R O I D E S quidem sunt apertio orificiorum uenarum, donec currit ex eis sanguis multus assidue. Cum ergo antiquantur hemorroides, fiunt thelil: & iam dixi in diuisione species earum, & signa ipsarū: et dicam hic quæ ex eis recipiunt curationem, & quæ non.

Dico ergo, quod hemorroides quæ sunt in orificio matricis, & nō apparent sensui: tunc non est ei curatio cum ferro. Quæ autē ex eis sunt in orificio matricis super quas cadit sensus, sunt quæ curant. Oportet ergo ut intromittas mulierē in domū frigidam. Deinde extende athelil cum forficibus, aut cum panno aspero, & incide eas ex radicibus suis. Deinde pulueriza super eas apud fluxum sanguinis ex uno puluerum incisurorum absq; mordificatione: sicut acacia, & sanguis draconis, & thus, & similia eis. Deinde impellat pedes eius ad parietem hora una. Postea depone eam in aquam frigidam. Quod si perseverat fluxus sanguinis: tunc fac eam sedere in decoctione sumach, & corticum granatorum, et gallarū, & similiū. Deinde accipe farinam hordei, et confice eam cum melle & aceto, & fac emplastrum cum eo super dorsum eius. Si ergo abscinditur sanguis cum eo, bonum est: & si non, fac adhæ **B** rere dorso uentosas, et mammillis, absq; scarificatione. Deinde accipe laminam, & submerge in succo tarathit, aut succo arnoglossæ, aut succo ramorum alaulat, id est, aglanter, uino pontico, et fac adhærere loeo. Cum ergo quiescit apostema, tunc cura locum cum unguētis, donec sanetur. Albarth uero rubeum est simile capitibus alhaasse, & est asperi aspectus. Oportet ergo ut incidas quod apparet ex eo, secundum quod dixi in thelil æqualiter: et cura ipsum, donec sanetur.

A De perforatione Exituræ quæ accidit in matrice. Caput LXXIIII.

A C C I D V N T in matrice species multæ apostematum. sicut cancer, et apostema lapideum, & ulcera, et adubelati, et alekilati, id est, herpes, æstiomemus, & fistulæ, & hemorroides, & ragadia, & thelil, & apostema calidum. Et ego quidem iam dixi omnes has ægritudines & species earum, & signa ipsarum, & earum curationes in diuisione: necesse est ut dicam in hoc tractatu apostema calidum quod accidit in matrice, quando est ex apostematibus quæ colligunt saniem, & uis scire qualiter fit eius apertio cum ferro. Oportet ergo ut consideres. Tunc si dolor apostematis in incæptione sua est acutus cum percussione sua, & flamma, et febre: et uides ipsum rubere: si cadit super ipsum sensus, tunc non properes cum perforatione eius: & cura ipsum cum eo eo quod iu-

Apostemata
Matricis.

- C**uat super maturationem, donec quando quiescat acuitas accidentium; Tunc oportet ut facias sedere mulierem super sedem quæ habeat duo sedilia, & reclinetur, uel appodietur super dorsum suum, & aggreget pedes suos ad partem inferiorē uentris: & sint coxæ eius expansæ, et ponat brachia sua sub genibus suis, & liget utraq; ligamento conueniente ad illud. Deinde fedeat obstetrix a latere dextro, & administra instrumentum quo aperitur orificium matricis. Cuius formā uenit in eis quæ sunt post. Et oportet quando uis administrare hoc instrumentum, ut frigas cum Radio profundum matricis mulieris: ut non sit illud, quod ingreditur ex instrumento plus, quam profundum matricis, & lædat in firmam. Si autem fuerit instrumentū magis quam profundum, tunc oportet ut ponas puluillos super tecturam profundū matricis: ut prohibeatur introitus instrumenti totius in profundum matricis: & oportet ut ponat uertiginem, quæ currit in instrumento, ex latere superiore: & ut teneat instrumentum, & ut reuoluat minister uertiginem, donec aperiat profundum matricis. Cum ergo apparet Exitura, & tangitur manu, et est lenis & mollis: tunc oportet ut seces ipsam apud caput suum cum spatulili lato. Cum ergo euacuatur sanies, tunc oportet ut ponas in uulnus licinium submersum in oleo rosaceo: aut oleo uiridi, in quo sit quædam stipticitas: & pone licinium, et extrahe sectionem in profundum matricis. Et pone exterius super matricem, & super pectinem lanam mundam submersam in aqua, in qua bullitæ sunt maluæ. Deinde curetur post duos dies cum unguento quod conuenit ad illud, donec sanetur. Et quandoq; abluitur matrix & uulnus, ita quod clisterizatur cum aqua & melle: deinde cum aqua in qua bullita est radix lilij, aut aristolochia longa: deinde redeat ad unguentū. Quod si uulnus absconditum fuerit interius in matrice, tunc oportet ut prohibearis ex curatione eius cum ferro, imo cura ipsum cum eo quod diximus in diuisione.
- D**

¶ Doctrinæ Obstetricum, qualiter medicentur embriones uiui, secundum figuram non naturalem egressi.

Caput xxv.

NECESSÉ est Obstetrici, ut cognoscat in primis figurā partus naturalis. Ex signis ergo eius est, quod quando uidet mulierem comprimi ad inferiora, & desiderat odorare aërem, et alleuiatur super eam quod super ipsam est de partu, et festinat exitus embrionis: tunc scias quod iste partus est secundū figuram naturalem, & est exitus ejus super caput suum, et secundina cum eo: aut suspensā, uel pendens ex umbilico. Cum ergo uidet hæc signa, tunc oportet ut comprimat uenter ejus, ut descendat embrio uelociter. Nam quando descendit super caput suum, descendit secundina cum eo; & mundatur ex illis superfuitibus mundificatione bona. Qui autem est præter hunc partum, est innaturalis, illaudabilis. Quoniam quandoq; egreditur fœtus super pedes suos,

Signa partus naturalis.

& egreditur corpus eius ante caput ipsius, & pedes eius, et manus eius una, aut pes eius unus: aut egreditur caput eius & manus eius: aut egreditur uentrinus: & fortasse conuertitur super collum suum, & similia ex figuris illaudabilibus. Necesse est ergo Obstetrici, ut sit prudens, subtilis in istis rebus omnibus, & caueat sibi ab errore & decapitione: et ego sum ostendens omnem figuram ex eis, & qualiter est ingenium in ea, & significetur per illud, et steretur super ipsum. Quando egreditur foetus super caput suum egressione sua naturali, & uehemēs fit illud super mulierem, & difficilis fit ei partus, et uides uirtutem eius iam debilitatam: tunc fac eam sedere super sedem, aut mulieres teneant eam: & uapora uuluam eius cum scœnugræco decocto, & cum oleis humidis. Deinde intromittat Obstetrix inter digitos suos Spatumile paruum, & findat cum eo secundinam, & secet eam ungue suo, donec currat quod est in ea ex humiditate: & preme uentrem mulieris, donec descendat foetus. Si autem non descendit, tunc oportet ut clisterizetur mulier ex mucillagine scœnugræci, cum oleo sisamino. Deinde præcipe ei post clistere, ut comprimatur: & fac eam sternutare cum condisi, & tene os eius & nasum ipsius hora una. Foetus enim egredietur statim. Quod si egrediuntur duæ manus foetus in primis, iunc oportet ut reducas eas cum facilitate paulatim. Si autem non obedit in introitu, tunc pone mulierem super sedem, & eleua pedes eius sursum: deinde concute sedem super terram: & mulier teneatur, ut non cadat apud concussionem. Si ergo non egrediuntur manus, & moritur foetus: tunc incide eas, & extrahe residuum foetus: & liga manum eius cum panino, & extrahe ipsum cum æqualitate: nam ipse egredietur.

Obstetricum
officium.

¶ Exitus embrionis super pedes suos.

QUANDO egreditur foetus super pedes suos, tunc oportet ut impellat eos sursum: deinde conuertat foetum paulatim: postea æquet ipsum. Deinde accipiat unum pedum eius, & extendat eum paulatim. Cum ergo egrediuntur usque ad coxas, tunc præcipe ei, ut comprimatur, & fac eam sternutare cum condisi: egredietur enim, si DEVS uoluerit. Et si non egreditur cum eo quod narrauimus, tunc reduc foetum paulatim, donec ponas eum secundum figuram naturalem, nam ipse egredietur tunc egressu facili. Quod si prohibeatur cum eo toto quod narrauimus: tunc accipe ex mucillagine altææ, & oleo sisamino, & gummi soluto: et percutite totum in mortario percussione bona: deinde line cum eo uuluam mulieris, & inferius uentris eius. Deinde fac eam sedere in aqua tepida, donec consequatur hypochondria. Cum ergo uides quod iam calefacta sunt inferiora eius, tunc fac ei sies de myrrha: & suppone ipsum. Quando ergo tenet sies hora una, tunc fac eam sedere super sedem, deinde fac eam sternutare: & stringe ipsius os & nasum.

C sum: & preme inferiorem partem uentris compressione facili. Nam foetus egreditur statim.

¶ Exitus foetus super genua & manus.

Q V A N D O egreditur secundum hanc formam, tunc ingeni- et in intromittendo manus suas paulatim. Deinde resupinetur mulier super collum suum, et pendeant pedes eius ad inferiora: & ipsa sit iacens super lectum, et complicit manus suas. Deinde preme supra uentrem eius paulatim. Deinde extrahe quod est sub pedibus eius ex puluinaribus, donec sit præparata in inferiori parte. Quod si non egreditur foetus, tunc accipe pedes eius, & moue eos motu uehementi. Deinde preme quod est supra hypochondria paulatim, donec ascendant foetus ad superiora. Deinde intromittat manus suas, & æquet foetum paulatim: & præcipe mulieri, ut comprimatur, donec egrediatur foetus.

¶ Exitus foetus latitudinaliter pendens ex manibus.

I N G E N I E T V R in reductione manus eius. Si autem non potest reducere eam, tunc eleua mulierem, & fac eam ambulare. Si uero ambulare non potest, tunc fac eam iacere super lectum: & concute crura eius concussione uehementi. Deinde administra linimentum quod præparasti ex mucillaginibus. Quod si accipit eam partus, tunc fac eam sedere super sedem. Deinde stude in reductione manus, et aqua foetum secundum figuram naturalem: & fac sternutare mulierem, & præcipe ei, ut comprimat se, donec egrediatur.

¶ Exitus foetus super collum suum, expansis manibus, & est facies eius ad dorsum matris suæ.

O P O R T E T ut teneat Obstetrix manum foetus, deinde reuoluat eum paulatim, et æquet eum cum facilitate. Cum ergo æquatur, tunc pone super uuluum eius quod narrauimus ex oleo & mucillaginibus. Deinde præcipe ei, ut moueatur paulatim. Cum ergo feceris illud, tunc fac eam sedere super sedem, & præcipe ei ut inclinetur ad latus dextrum. Deinde præcipe ei, ut comprimatur: & fac eam sternutare cum conditi.

¶ Exitus foetus præparati super latus.

Q V A N D O descendit ad orificium matricis secundum hunc modum cum secundina, tunc scinde secundinam cum ungue tuo, donec euacuetur ex humiditate. Si ergo suspenditur super faciem foetus, & collum eius, tunc incide eam ex umbilico: ut non retineatur, & moriatur. Deinde impelle foetum ad interiora, donec ponas eam secundum quod oportet: & præcipe mulieri, ut comprimat se aliquotiens: ipse enim egreditur exitu leui.

S C I A S. ¶ Exitus Geminorum, aut foetuum multorum.
 S C I A S, quod Gemini multotiens nascuntur: & quandoq; nascuntur tres, & quatuor. Verumtamen illud extraneum est, et raro contingit. Quinq; uero est res extra naturam, et non uiuunt penitus: & continer eos, quamuis multiplicentur, secundina una: & separantur per sisach, distinguens inter eos ligatum in umbilico cuiusq; eorum. Et quandoq; egrediuntur sicut egreditur foetus unus exitu naturali, facili: & egrediuntur exitu illaudabili, sicut narrauimus. Quod si difficiles fuerint quidam eorum apud partum, & perueniunt ad illud quod diximus ex figuris innaturalibus, tunc cura eos sicut narrauimus: & sit obstetrix subtilis, et faciat quod facit cum facilitate & tarditate, et ingenietur secundum omnem figuram cum eo quod preparatur ei ex ingenio ducente ad salutem.

Q U O D. ¶ Rememoratio eius quod formatur in matrice ex embrionibus, et abortiuntur.
 V A N D O Q V E formatur in matrice unus, et duo, & tres, & quatuor, et quinq;, et sex, & septem, et plures decem: & iam uerificatum est apud me, quod mulier abortiendo emisit septem, & alia quindecim, omnes formatos. Quod factum est mensuratione gloriosi sapiētis. Hoc ergo totū oportet ut sit in sciētia Obstetricis. Forassem perueniet ad eam simile illius: opponat ergo ei cū illo quod oportet.

Q U O D. ¶ De extractione foetus mortui. Caput LXXVI.
 V A N D O curas foetum mortuū cum eo quod dixi in diuisione ex medicatione, & non egreditur, et cogeris uti operatione cum manu, tunc oportet ut consideres. Si ergo mulier est sanæ uirtutis, & non est cum aliquo ex accidentibus, ex quibus timeatur super eam perditio: tunc oportet ut resupinet mulier super lectū, super dorsum suū, et sit caput eius inclinātū inferius, & crura eius eleuata: & sinistra teneat eam a duabus partibus, aut ligetur ad lectū, ut non extrahatur corpus eius apud extractionē foetus. Deinde humecta os matricis ex oleis humidis cum mucillagine altee, et scenograci, & seminis lini. Deinde inungat Obstetrix manū suam cum istis oleis & mucillaginibus: deinde intromittat eam in matricem cum facilitate. Deinde quærat cum ea locum in quo figat uncinos ex foetu, et loca conuenientia ad illud. Considera ergo tunc, si foetus est preparatus ut descendat super caput suum: tunc fige uncinos in oculos eius, aut in collo eius, aut in ore eius, aut in palato ipsius, aut sub barba eius, aut in furcula ipsius, aut in locis propinquis costis, et sub hypochondrijs. Si autem descendat est super pedes eius, tunc in pectine, & costis eius medijs. Et oportet, ut teneat uncinū cum manu dextra: et ponat curuitatem eius in eo quod est inter digitos sinistrae manus: et intromittat cum manu cum facilitate, & fir-

- C** gat uncinum in aliquo illorum locorū quę diximus, donec perueniat ad rem uacuam. Deinde figat in oppositione eius uncinum alium, aut tertium, si indiges: ut sit contractio æqualis, et non declinet ad partem. Deinde extendatur extensione æquali, & non sit extensio secundum rectitudinem tantum, imò moueatur ad omnem partem, ut alletuietur exitus eius: sicut fit cum dēte apud eradicationem eius. Et oportet in eo quod est inter illud, ut mollificetur extensio. Quod si retineatur ex eo pars, tunc oportet ut inungat Obstetrix quosdam digitos cum oleo, & intro mittat eos ex parte, ut reueluat cum eis quod retinetur. Si ergo egreditur pars foetus, tunc permutentur uncini ad locum alium qui sit altior: fac hoc donec egrediatur foetus totus. Si ergo egreditur manus ante alia, & non est possibile reducere eam, propter cōartationem eius: tunc oportet, ut inuoluatur super eam pannus. Deinde extrahe eam donec quando egreditur tota, incide eam aut in iunctura plantę, aut in cubito: & ita oportet ut facias in manu altera, et in duobus pedibus. Si autem caput foetus est magnum, aut accidit ei cōartatio in exitu, aut est in capite eius aqua aggregata: tunc oportet ut intromittat inter digitos Spatulum spinosum, & findat cum eo caput, et extrahat aquam: aut disrum pat ipsum cum instrumēto quod nominatur Almisdac: cuius forma uenit cum formis reliquorum instrumentorum in capitulo quod est post hoc.
- D** Similiter faciat si foetus est magni capitis natura, tunc oportet ut feces algengematu: aut extrahas ipsum cum misdach, sicut diximus, deinde attrahas ossa cum forcipibus. Quod si egrediatur caput, & cōartetur apud furculam: tunc findatur, donec effundatur humiditas quę est in pectore. Si autem non complicatur, neq; obedit ad exitum: tunc incide caput frustatim, secundum quod possibile est tibi. Quod si inferius uentris est apostematum, aut est in eo hydropisis: tunc oportet ut perfores ipsum, donec curret humiditas ex eo. Si uero foetus est super pedes suos, tunc attractio eius est facilis, & directio eius ad os matricis est leuis. Si autem cōartatur apud uentrem, aut pectus: tunc oportet ut extrahas ipsum cum panno quem inuoluisti super manum tuam: & findat uentrem, aut pectus, donec curret quod est in eis. Si autem auferuntur reliqua membra, & redit caput: tunc intromittat Obstetrix manum sinistram. Si ergo os matricis est apertum, tunc intromittat manum in profundum matricis, & quęrat cum ea caput, & attrahat ipsum cum digitis usq; ad os matricis: deinde intromittat in eo uncinū unum, aut uncinos duos, & attrahat ipsum cum eo. Quod si os matricis cōartatur, propter apostema calidum quod accidit ei: tunc non oportet ut laboretur super ipsum, imò oportet tunc administrare effusionem rerum humidarum, pinguium: & administra emplastra: & sedeat in aquis quę mollificant & humectant. Quod si foetus est super latus suum, tunc possibile est ut aquetur: tunc administretur quod diximus in fo-


tu uiuo. Quod si non est possibile illud, tunc incidatur frustatim, & extrahatur. Et oportet ut non dimittas aliquid ex secūdina intus omnino. Cum ergo compleueris operationē tuam, tunc administra quod diximus in apostematibus calidis quę accidunt in matricibus. Quod si accidat fluxus sanguinis, tunc descendat in aquis stipticis, & administra reliquam curationē. Et ego quidem iam uidi mulierem, in cuius uentre mortuus erat foetus: deinde impregnata est sup ipsum uice alia, postea mortuus est foetus aliū etiā. Accidit ergo ei post tempus longū apostema in umbilico suo, & inflatum est, donec apertū est: & coepit emitte pus. Vocatus sum ergo ad curationē eius, & medicatus sum ei tempore longo: & non consolidatum est uulnus. Posui ergo super ipsum ex quibusdam emplastris fortis attractionis: & exiuit ex loco os. Deinde præterierunt ei dies aliquot, & exiuit os aliud. Miratus sum ergo inde, cum in uentre nō sit os. Cogitaui ergo, quia erant ex ossibus foetus mortui. Inquisiui ergo uulnus, & extraxi ossa multa, muliere existente, in melioribus dispositionibus suis: & iam uixit taliter tempore longo, & mituit ex loco pus parum. Et ego non firmaui hic hoc extraneum, nisi quoniam in eo est scientia, & adiutorium ad illud, quod administrat medicus artifex cum manu ex curatione.

Experimentū
Auctoris.

H De formis Instrumentorum necessariorum in extrahitione foetus. Caput LXXVII.


I C inferius est forma Strictorij, quo æquantur libri, cui æqualiter sunt duæ uertigines in duabus extremitatibus duorum lignorum. Verumtamen hæc Vertigo oportet ut sit subtilior strictorio: & ut fiat, aut ex ebano, aut ex ligno busli. Et sit latitudo omnis ligni quasi duo digiti: & margo cuiusq; amborum est quasi digitus unus, & longitudo cuiusq; eorum est palmus & medietas: & in medio duorum lignorum sunt duo additamenta ex genere eiusdem ligni, quæ iam firmata sunt in utrisq; quorum longitudo est medietas palmi & plus parum: & latitudo utriusq; est quasi duo digiti, aut plus parum. Et ista duo additamenta intromittuntur in os matricis, ut aperiat cum eis quando tu reuoluas duas Vertigines.

Forma Vertiginis qua aperitur matrix.



C


Forma alia ad simile illius, subtilior, & leuior.

Matricis aper-
tio.


Fiat ex ligno ebani, aut buffi, secundum similitudinem forcipum. Verumtamen in extremitate eius sint duo additamenta, sicut uides hic supra: & longitudo omnis additamenti ex eis est quasi palmus: & latitudo utriusque est, duo digiti. Cum ergo uis aperire matricem cum eo, tunc fac sedere mulierem super lectum, pendentibus pedibus eius, aperto quod est inter crura eius. Deinde intromitte ista duo additamenta coniuncta in matricem: & tu es tenens extremitatem instrumenti inferius inter coxas eius. Deinde aperi manum tuam cum instrumento, sicut facis cum forcicibus, æqualiter secundum quantitatem quam uis ex apertione oris matricis, donec faciat Obstetrix quod uult.

Forma Vertiginis alterius quam dixerunt antiqui

D




Forma Impellentis quo impellitur foetus.




Forma Almisdac, qua conteritur caput magnum: & assimilatur forcipi, cui sunt dentes in extremitate, sicut uides. Et quandoque fit oblungum, sicut forcipes secundum hanc formam, sicut uides, cui sunt dentes sicut dentes serræ, quo inciditur & conteritur.


A



Forma Almisdac quo conteritur caput paruum.




Forma Vncini habentis spinam unam.



Forma Vncini habentis spinas duas.




Forma forcipis cui sunt dentes serræ, cum quo conterit caput fœtus.




B

Forma Spatulis habentis duas extremitates ad
abscindendum caput.



Forma duorum Spatulilium etiam latorum.



C




Ista instrumenta omnia exercentur, & quanto plus multiplicantur species eorum, & præparata sunt apud artificem, est uelocior ad operationem suam, & altior apud homines, propter quantitatem suam. Non ergo despicias ex eis instrumentum, quin sit apud te præparatum. Inexcusabilis est enim necessitas eorum.

Q De extractione Secundinæ. Caput LXXVIII.
 V A N D O retinetur Secundina apud partum, tunc oportet ut præcipias infirmæ, ut retineat anhelitum suum. Deinde fac eam sternutare cum conditi: et strigge manum tuam super os eius, & nares ipsius. Si ergo egreditur per hoc, bonum est. Si non: tunc accipe ollam, & perfora in coopertorio foramen: et pone in ea herbas aperientes os matricis, sicut calamentum, rutam, & anetum, & camomillam, & sseham, et cassiam ligneam, & centauream: accipe omnes istas herbas, aut quasdam earum, & submerge eas cum aqua, & pone eas super ignem. Deinde pone embulam arundinis super foramen coopertorii ollæ, & extremitatem aliam in os matricis: & teneat eam donec perueniat uapor ad concuitatem matricis. Deinde fac eam sternutare, sicut diximus. Secundina enim egredietur cum facilitate. Si autem remaneat post hanc curationem, & non egredietur: tunc præcipe Obstetrici, ut submergat manum suam in oleo sisamino, aut mucillagine alteæ. Deinde intromittat in uuluam, & quærat cum ea Secundinam. Cum ergo inuenerit eam, tunc accipiat eam, & extendat ipsam paulatim. Si autem fuerit annexa in profundo matricis, tunc intromittat manum, secundum quod narrauimus, donec quando inuenerit Secundinam, & extrahat eam paulatim secundum rectitudinem, ut non cadat matrix apud attractionem uehementem: imo oportet, ut permutetur cum facilitate ad latera dextra & sinistra: deinde addatur in quantitatem attractionis. Ipsa enim obedit tunc, & seruat, & euadit ab adhærentia. Quod si os matricis est coartatum, sicut nos iam narrauimus: cura eam cum sternutatione, & ex medicatione ollæ cum herbis. Si autem non egreditur cum omnibus quæ narrauimus, tunc caue ne fatigeris super eam in iteratione extractionis. Verum oportet, ut quod egreditur ad os matricis ex ea, liges ad coxam mulieris. Deinde clisteriza eam cum unguento tetrapharmacum. Ipsum enim putrefaciet eam post dies, & dissoluetur, & egredietur. Verumamen quando putrefit, eleuatur ex ea odor malus ad stomachum & caput, et lædit illud infirmam. Oportet ergo ut administrantur suffumigationes conuenientes ad illud. Quidam autem antiquorum iam experti sunt suffumigationem nasturtij, et sicui siccarum. Forma instrumenti quo suffumigat mulier apud retentionem Secundinæ & menstruo-

rum. Fiat ex uitro simile alcama, aut ex zere: & ponat extremitas ampla super ignem: & suffumigatio sit posita super prunas: teneat eam, donec consumatur illa suffumigatio: & itera aliam.

A



Instrumentum
quo suffumi-
gantur muli-
eres.

N De curatione Ani non perforati.
Caput LXXIX.
ASCVNTVR multi puerorum, & Ani eorum sunt non perforati, quos iam opilauit sisac subtile. Oportet ergo, ut obstetrix perforet illud sisac digito suo: & si non, perforet ipsum cum Sparumili acuto: & caueat lacertum, ne tangat eum. Deinde pone super ipsum lanam infusam in uino & oleo. Deinde cura ipsum cum ungentis, donec sanetur. Si autem times quod opiletur, tunc pone in foramine cannulam de plumbo diebus multis, et auferatur quando puer uult egerere. Et iam accidit opilatio Ani etiam ex consolidatione uulneris, aut apostematis. Oportet ergo ut secetur illa consolidatio, deinde curetur cum eo quod diximus ex curatione & plumbo.

F De curatione Fistularum quae accidunt in inferiori parte.
Caput LXXX.
ISTVLAE quae accidunt in inferiori, sunt Nodatio, & Grosse tudo quae accidunt prope anum deforis: aut in spacio unius partium: et est Fistula una, aut plures. Cum ergo antiquatur illa Nodatio, aperitur, & currit ex ea humiditas aquosa alba, aut pus subtile. Et quandoque sunt ex istis Fistulis penetrantes. Ergo penetrantes cognoscuntur per illud quod egreditur ex egestione, & uentositate, quando utitur infirmus egestione: et fortasse egreditur ex eis uermis. Et sunt ex eis Fistulae quando sunt in spacio penetrantes usque ad uesicam, et usque ad meatum uirgae. Et sunt ex eis penetrantes usque ad iuncturam coxae, & usque ad nodum caudae. Ex eo autem quo cognoscitur Fistula penetrans usque ad anum, etiam a non penetrante, est, ut intromittas digitum tuum indicem in anum: & intromittas tentam subtilem in Fistulam ex aere, aut ferro: quando non est tortuositas. Quod si in ea est tortuositas, tunc intromitte in eam tentam ex plumbo subilem, aut pilum ex pilis equarum, donec sentias tentam, aut pilum in digito tuo. Quod si non sentis ipsam penitus, neque procedit ex foramine aliquid ex egestione, neque uentositas, neque uermis sicut dixi: tunc scias, quia est non penetrans: propterea ergo ad curationem. Et quando Fistula est penetrans usque ad uesicam, aut ad meatum uirgae: tunc significatio eius est exitus urinae ex ea, et prohibitio eius ab hoc.

B

Fistularum
uarietas.


- C** ut consolidetur locus cum medicinis. Si uero est penetrans usque ad iuncturam coxæ, aut ad os coxæ: tunc signum eius est, quod perueniat tenta usque illuc, si non est in ea tortuositas usque ad os: & inuentio doloris in circumitu partis, et quod egreditur pus ex ea semper: & quod non ualet in ea medicatio, neque consolidatur cum unguento. Et in istis Fistulis omnibus penetrantibus non est curatio omnino: et curatio earum est labor & uanitas ei, ex stultis medicis, super quem formatur. In illa autem quæ non est penetrans, & non antiqua, speratur sanatio cum ferro: secundum quod ego narro tibi, et ego iam probaui: & est, ut faciat in firmus inter manus tuas super dorsum suum: & eleua crura eius usque supra coxas ipsius, & coxæ eius sint inclinatæ ad uentrem ipsius. Deinde intromitte tentam plumbi, aut æris, si est in Fistula tortuositas, donec scias ubi peruenit tenta. Si autem sentit eam infirmus circa anum, tunc oportet ut intromittas digitum tuum indicem in anum. Si ergo sentis in digito tuo tentam iam penetrasse per seipsam detectam, præter quod sentias inter digitum tuum, & inter ipsum sifac, aut carnem: tunc ergo scias certe, quia est penetrans: non ergo labores in ea, quoniam non est eius sanatio, sicut diximus. Dixerunt tamen, quia sanatur in quibusdam hominibus caro, & ex medicatione qua ei speratur iuuamentum, est, ut
- D** ignias cauterium subtile secundum amplitudinem Fistulæ, sicut præcessit, & intromittas ipsum ignitum in Fistulam, donec perueniat circa anum. Deinde itera illud bis, aut ter, donec scias, quia iam adustæ sunt omnes illæ carnes additæ filtratæ, quæ sunt similes cannulæ peninæ auis. Deinde cura illud cum licinijs inuolutis in butyro, donec egrediantur illæ carnes, quæ adustæ sunt: deinde cura illud cum unguentis generantibus carnem & consolidantibus. Si ergo sanatur, bonum est. Et si non, tunc non sanatur cum alia curatione unquam. Et si egreditur tenta, & non peruenit usque ad digitum tuum, qui est in ano, & est inter ipsum & tentam uelamen spissum ex carne, aut sifac: & uides Fistulam in eo quod sequitur superficiem cutis, tunc seca cutem ab initio Fistulæ, & tu uadis secando cum tenta quod est in fistula, donec perueniat secatio ubi peruenit tentæ extremitas, & liberatur tenta & cadit. Deinde mundifica illas carnes filtratas, quæ assimilantur cannulæ peninæ auis, ut non remaneat ex eis aliquid. Si autem uincit te sanguis, & soluit inter te & inter operationem tuam ut feces illas carnes: tunc melius quod fit, & uelocioris iuuamenti, cauterizare eam cum igne, aut cum medicina acuta. Quoniam cauterium cum igne aggregat habitudines bonas, adustionem illarum carniū additarū, & abscissionem sanguinis, & exiccationem humiditatum. Deinde cura illud cum licinijs inuolutis in butyro, aut caulibus tritis, donec locus emittat pus, & egrediantur illæ carnes adustæ in pus. Deinde cura tunc uulnus cum unguentis consolidatiuis, generantibus carnē duram: et sunt medicinæ in quibus sunt

Cura Fistulæ
nō antiquatæ.

stipticitas & exiccatio. Nam quando restaurantur, tunc iam sanatur: & non times iterationem. Si autem Fistula iam peruenit usq; ad profundum ani, & elongatur a superfluitate corporis: tunc intromitte digitum tuum in anum, et inquire cum eo. Si ergo sentis tentam, & inter te, et inter eam est uelamen ex sifac, aut carne, et est propinqua penetrationi: tunc non est operatio in illo, nisi secundum uiam fiduciæ & spei. Quod est, quia administratur in eo unus trium modorum: aut ut cauterizes ipsam, sicut diximus: aut seces eam, donec consequaris concauitatē eius, ut sit possibile tibi intromittere licinia, et curationē ex proximo. Et non procedas multum cum sectione, ut non incidas lacertum continētē anum, et accidat super infirmū exitus egestionis absq; uoluntate. Deinde cura illud cum eo quod diximus, fortasse enim sanabitur: aut elonges ipsum uelamen, & mundes ipsum postquā secas ipsum usq; prope anū, sicut diximus, aut cum tenta, aut cum instrumento alio acutæ extremitatis. Deinde mundifica illas carnes filtratas quæ sunt in sectione, usq; ubi potes cum perscrutatione. Deinde conare restaurationem uulneris totius cum sectione, & orificio superiore ubi consolidatur: & remanet Fistula aperta in interiore parte anus, & erit leuius super infirmum. Et quandoq; suitur Fistula secundū hunc modum: et est, quando intromittis tentam in Fistulam: & est in latere ani circa superficiem corporis cum cute & margine ani: tunc accipe tentam perforatæ extremitatis, quæ est sicut acus aleskes, id est, præparantū coria, secundum hanc formam.

Tenta. 9

Et intromitte in eam filum inuolutum ex quinque filiis, & circiter ea. Deinde intromitte tentam cum filo in Fistulam, donec consequatur concauitatem eius. Si ergo est penetrans in margine ani interius prope, tunc extrahe filum ex illo foramine: ita ut intromittas digitum tuū in anum, & extrahas extremitatē fili, et aggreges duas extremitates simul: & stringe utramq; et dimitte illud die uno, aut duobus diebus: & quanto plus incidit filum in carne, stringe ipsum bene, donec incidantur illæ carnes quæ sunt inter duas extremitates fili, & cadant: deinde cura uulnus, donec consolidetur, & sanetur. Si autem orificium Fistulæ non est penetrans: tunc fac ipsum penetrare quocuncq; modo præparatur tibi, nisi sit in profundo multum. Non enim inest tibi, ut facias illud propter lacertum, ut non incidas ipsum. Deinde fac cum ea sicut diximus, donec sanetur. Forma Spatumilis spinosi quo finditur Fistula, cuius curatio uitas est acuta ualde, & pars altera est non acuta, ut non incidat illud quod non est necesse, sicut uides.



C De futura Hemorrhoidarū, ex quibus currit sanguis ex incisione earum: & cura fissurarū. Cap. LXXXI.

S VNT Hemorrhoides secundum duos modos. Aut enim sunt intra anum, similes uescis carbonū, uel prunarum: aut quasi ipsæ sint grana uuae. Et ex eis sunt paruae, & magnæ: et sanguis currit ex eis semper, & est una, et sunt multæ. Et sunt extra anum, & in extremitatibus eius. Verumtamen istæ quæ sunt extra anum, sunt secundum plurimū paucæ humiditatis, ex quibus currit aqua citrina, aut parum sanguinis cur su assiduo: & sunt secundum colorem corporis. Et curatio eius quæ est intra anum, est, ut præcipias infirmo ut assellet: & exprimat, donec egrediatur anus, & appareant athelil tibi. Propterea ergo et suspende cum uncinis: aut tene eos cum ungue tuo. Deinde incide eos apud radices suas. Si autem non retinentur in eis uncini, propter humiditatem eorum & ipsorū mollificationem: tunc cape eos cum panno aspero, aut cum coto ex diploide lanea, et extrahe eos cum digitis tuis. Deinde incide eos, & pulueriza super eos post incisionem quosdam pulveres calidos, ut stent eis loco cauterij. Aut cauteriza eos secundum quod præcessit in capitulo cauterizandi. Deinde cura eos cum reliqua curatione, donec sanentur. Quod si non obedit anus egressioni, tunc clisteriza infirmum. clisteri in quo sit mordicatio parua, ut lauetur cum eo quod est in ano, & obediat egressioni uelociter, quando exprimit se infirmus.

Si autem athelil sunt extrinseci ab ano, tunc res eorum est levis, facilis: & est ut capias eos cum ungue tuo, aut capias eos cum uncino, & incidas eos. Deinde cura eos cum eo quod diximus, donec sanentur.

Et qui abhorret incisionem cum ferro, tunc oportet ut administres suturam eorum secundū hunc modum. Accipe filum inuolutū, & intro mitte ipsum in acum. Deinde extrahe athelil ad superiora, & fac ipsum penetrare cū acu in radice eius ex parte altera: & inuolue duas extremitates fili, in inferiori parte acus, & sint latitudinaliter: et stringe athelil strictura forti. Deinde noda filum, & extrahe acum. Fac illud cū omnibus athelil, et dimitte ex eis unum: nec suas ipsum, ut currat ex eo superfluitas sanguinis. Deinde pone super anum pannum infusum in oleo rosato, aut cæroto, & pone ipsum super anū: et præcipe infirmo, ut quiescat. Deinde dimitte ipsum, donec cadat. Cum ergo cadunt athelil, cura eos cum unguentis, & reliqua curatione, donec sanentur.

M De cura Fissurarum. **U**LTOTIENS enim accidunt ex exiccatione stercoris, & constrictione naturæ. Cum ergo antiquantur, et non ualet in eis medicina: tunc oportet ut radas cum puncta Spatulis, aut cum ungue tuo, donec fiant humidæ, & auferatur ab eis cortex superior qui prohibet eas a consolidatione. Deinde cura eas, donec consolidentur secundum quod oportet. Si autem non consolidantur: tunc itera eas cum

ratione uehementiori quam prima, donec sanguinentur multum, et ex. A
corientur. deinde cura eas, donec sanentur.

S De curatione Almirmar inuerforum, et non inuerforum:
et Athelil siccorum, & Formicæ. Caput LXXXII.

S C I A S quod Almirmar non est nisi nodus rotundus secundum Almirmar.
colorem corporis, similis capiti clau: & fit in toto corpore, præcipue in
inferioribus partibus pedum, & digitis: et accidit ex eis dolor apud am-
bulationem. Oportet ergo ut secetur quod est in circumitu clau, & te-
neatur cum forficibus, aut cum uncino, et eradicetur ex radice sua. deinde
de cura illud: & si uis cauteriza illud secundum quod præcessit in capitulo
suo. Ex athelil aut siccis unus est eminētia parua, aspera, filtrata, rotunda
supra superficiem corporis. Et multotiens accidunt in manibus pue-
rorum. Et curatio eius est, ut extendas athelil, & incidas ipsum: aut strin-
gas ipsum cum filo de serico: aut cum pilo, donec cadat. Et si uis, cauteri-
za ipsum secundum quod præmissum est cum igne, aut cum medicina acuta:
& iam eradicantur athelil inuerfi, et non inuerfi cum instrumento quod
ego dicam. Formica autem est etiam eminentia parua filtrata, grossa, Formica:
super superficiem corporis, uadens in profundum ualde: & quando inue-
nit eam frigus, sentitur in ea simile mordicationi formice, & fit in corpo-
re toto: et plurimum eius fit in manibus. Et curatio eius est, ut accipias
cannulam ex penna anseris, aut penna uulturis forti: & pone illam can-
nulam super Formicam, donec contineat circulus cannulæ ex partibus
eius. Deinde reuolue manum tuam cum cannula, donec feces quod est
in circumitu Formicæ: et ponas eam in profundo carnis, & eradices For-
micam ex radice eius. Et si uis, fac illud cum cannula æris,
aut ferri, secundum hanc formam.




Sit superius cannulæ ad sublimitatem trahens surdum inuolutum, ut al-
leuietur super digitum apprehensio eius & ipsius reuolutio. Et si uis, Surdum, id est,
cauteriza Formicam secundum quod præmissum est in cauterizatione: non perfora-
tum.
Athelil in capitulo de cauterio.

Q De formis Instrumentorum quæ administrantur ad Clistere-
ria in ægritudinibus Ani, & solutionis uentris, &
colicæ. Caput LXXXIII.


Q UANDOQUE Clistere fit ex argento, aut ex aurichalco,
aut ex ære fuso, aut malleato. Et quandoque fit ex istis In-
strumentis paruum, & magnum, secundum illos in quibus administrantur

C tur. Illud ergo quod administratur in curatione puerorum paruorum, sit paruū: et quorum ani sunt debiles; aut dolorosi, sic & clisteria eorū.

Clistere magnum.




Clistere paruum.



D Canna eius, id est, caput superius in quo ligatur uter, sit amplum secundum hunc modum: et sit ei distinctio ut ligetur uter sicut uides, & extremitas eius inferior quæ intromittitur in anum, sit surda, id est, non aperta, lenis, ualde, trahens ad subulitatē: & in uno laterū eius sint duo foramina, et in latere altero foramen unū. Et sit amplitudo foraminis secundum grossitudinem radiorū, & grossius parū, Et sit uter in quo ponuntur medicinae ex uesica animalis: aut ex charta ouis, quæ sit secundū formam alofrati paruæ: cuius radix sit palmus unus. Et perforetur foraminibus multis sicut reuoluitur, & sit spacium quod est inter omne foramen grossitudo digiti. Deinde intromitte in illa foramina filum forte ex filo crudo, quod sit ex decem filis, aut circiter ea, & aggrega cum eo utrem sicut alofrati. Cum ergo ponitur in eo uter, stringatur in capite clisteris inter duo distinguentia constrictione forti. Deinde clisteriza cum

Forma circuli utris.



eo. Et hæc est forma circuli utris hic depicta, & foraminū. Qualitas autē clisterizandi cum eo, est: ut impleas utrem, aut uesicam ex medicina, quæ sit calefacta secundū quantitatem tolerantiaē infirmi: & caue ne sit calida ualde, aut frigida ualde. Deinde resupinetur infirmus super dorsum suum, & eleuet crura sua ad superiora: et pone sub eo inthaan, id est, coriū super quod iacent homines, aut linteamen. Deinde inūge extremitatem Clisteris cum oleo, aut cum albugine oui, aut cum mucillagine fœnugræci, aut similibus. Deinde intromitte ipsum in anum cum facilitate. Deinde accipiat minister utrem cum duabus manibus suis simul, & exprimât ipsum cum uehementia, donec euacuet totum quod est in Clisteri in intestinum. Deinde extra

he Clistere, & eleuet infirmus crura sua ad parietem. Quod si medicina **A**
 cogit eum ad exitum, tunc teneat quantum potest. Et si dormit cum ea
 nocte tota, est magis ultimum in iuamēto. Si autem clisterizas eum
 in agritudinibus solutionis ventris, & festinat exitus eius: tunc itera cli-
 stere, donec sanetur. Quod si in ano sunt hemorroides, aut apostema
 talædentia, tunc sit clistere subtile ualde, lene, ex clisteribus quibus cli-
 sterizantur pueri. Et hæc sit forma clisteris subtilis
 super quod sit stricta cutis.

I De curatione Vulnerum capitis sine fractura ossis.

Caput. LXX XIII.

I A M. dixi in diuisione de curatione uulnerum quod conueniebat
 libro, & ego dicam hic curationem eorum cum manu, et cum medicinis
 secundū complementum. Dico ergo, quod uulnera diuersificantur se-
 cundū illud quo fiunt uulnera, et secundū locum super quem cadit uul-
 nus. Res ergo quibus fiunt uulnera multotiens, sunt sicut iactus lapidis,
 aut incisio ensis, aut cultelli: aut percussio cum lancea, aut ligno, aut sagit-
 ta: & similibus illis ex rebus multis. Vulnera autē quæ fiunt secundum
 loca corporis sunt, sicut uulnus, quod cadit super caput, aut collum, aut
 pectus, aut uentrē, aut epar: & similia ex eis membris. Et ego sum nar-
 rans curationes quorundam uulnerū, ut ponam eam ratiocinationē &
 regulā super reliqua uulnera. Et ego incipiām a uulneribus capitis sim-
 plicibus: quoniā rememoratio compositorū ueniet in principio capituli
 tertij. Dico ergo. Quando accidit in capite uulnus simplex, & non **B**
 est fractura ossis: considera tunc, si est ex iactu lapidis, aut ei similibus, &
 iam fregit cutem tantū: et est uulnus magnū, & times super infirmū eue-
 tum apostematis calidi: tunc propera, & phlebotoma cephalicam sta-
 tim: & non tardes illud: et extrahe ei ex sanguine secūdum quantitatem
 uirtutis eius: si non fuerit prohibens aliquid a phlebotomia, præcipue si
 fuerit sanguis qui egreditur ex uulnere paucus. Et sit phlebotomia ex
 contrario partis uulneratę. Et caueat infirmus sibi a repletionē, & uinō,
 & cibis grossis. Si autē minutionem prohibet aliquid, tunc minores
 tur ex cibo, & non appropinquet carnibus, neque uinis. Et pone super
 uulnus si accidit ei apostema calidum, cotum infusum in oleo rosato so-
 lo, aut cum uino in quo est stipticitas. Si autē securus fueris ab aposte-
 mate calido, tunc pone super uulnus, si est recens cum sanguine suo, &
 non mutauit ipsum aēr, puluerem quē ego narrabo post paululum: et si
 iam mutauit ipsum aēr, tunc pone super ipsum quædam unguenta, do-
 nec sanetur. Si autē uulnus est magnum, aut est ex incisione ensis,
 & similiū: & non aggregantur labia eius per puluillos, tunc aggrega
 ipsa cum sutura, secundū quod ego narrabo in uulneribus uentris de su-
 tura eorū. Si autem uulnus iam detectum est ab ossē, & pendet, et nō est
 retentio eius, nisi in suspensorio paruo: tunc incide ipsum. Deinde cura

Vulnerum
diuersitas.

C uulnus cū medicinis, & restaura in eo carnem duram loco cutis, & præcipe infirmo, ut alatur cibus in quibus est grossitudo, sicut sunt capita, & triticum coctum, donec sit ut puls: & eis similia. Quod si inuenis in cute putrefactionem, & non adhæret ossi: tunc incide putrefactum totum, & proijce ipsum: deinde cura illud. Si autem in his uulneribus est arteria, aut uena ex qua fluit sanguis: & non abscinditur per medicinas, tunc inquire super arteriam. Si ergo inuenis eam non secliam, tunc seca eam cum Spatumili, aut liga eam. Quod si necessitas prouocat quando non confert illud quod diximus, tunc cauteriza eam, donec abscondatur sanguis. Si autem uulnera ista sunt parua, simplicia, tunc res eorum est facilis, leuis: ita ut puluerizes super ea hunc puluerem: quoniam, consolidat ea antequam mutet ea aer.

¶ Modus Pulueris incarnatiui.

Recipe olibani partem unam, & sanguinis draconis partes duas, et calicis non extinctæ partes tres: teratur totum multum, & cribelletur: et impleatur ex eo uulnus, & constringatur constrictione bona, donec adhæreat super ipsum bene, et coaguletur cum sanguine. Deinde stringe ipsum desuper cum puluillis, & dimitte ipsum, neque soluas ipsum: dum permanet, ita quod non apostemet. Nam non eradicatur ab eo medicina, donec sanet. Et quandoque facit illud calx sola, quando non sunt tibi in præfenti olibanum, & sanguis draconis etiam facit eandem operationem in multis ex uulneribus magnis, quando conuenit ut ponatur super ea & stringantur, et sunt uulnera recentia cum sanguine suo, quæ non altera aer.

D Quod si iam alterauit ea aer quadam alteratione, præcipue quando est in tempore æstatis, tunc non est in positione huius pulueris intentio: cura ergo ipsum cum eo quod diximus, ita ut ponas super ea quædam unguenta digestiua: aut ponas super ea pulues ex farina hordei, facias cum aqua & melle, donec emittant pus. Deinde cura ea reliqua curatione, donec sanentur. Si uero accidat cum uulnere fractura in osse, & est parua, tunc extrahe illud cum Gestis: et ego iam dicam curationem fracturarum capitis in eo quod futurum est.

¶ De uulneribus Colli, Caput LXXXV.

S I AUTEM uulnus accidat in Collo, tunc non est inter ipsum differentia in medicatione, et inter uulnus capitis: quando est simplex. Si autem iam incisus est nervus Colli, aut arteria: tunc si est nervus, non est in eo ingenium, nisi ut deuitetur curatio eius cum eo quod facit stipticitatem uehementem, sicut zinzar, & zegi, et eis similia: quoniam nocent nervis, & contrahunt eos. Et non ponias super uulnus aliquid frigidum omnino: quoniam substantia neruorum est frigida, et continuatio eius est cum cerebro, quod est sublimius membrorum: & sit illud quod curatur ex medicinis leni, sicut calx lora cum aqua dulci aliquotiens infusa cum oleo, aut cum oleo rosato, & tuthia, quando abluitur etiam cum

aqua dulci: & reliqui lapides minerales, secundum hunc modum, & un- A
guenta humida. Si autem uulnus est magnum, tunc ad sinistra sutur-
ram: aut coarta labia eius cum puluillis. Deinde cura ipsum, donec sa-
netur. Si uero uulneri est profunditas, aut accidit in eo sinus in inferi-
ori parte eius, in quo iam aggregatur pus, tunc perfora ipsum in magis
depresso loco in eo. Quod si iam incisa est in uulnere arteria, & consecu-
tus est sanguinem eius fluxus: tunc separa, uel seca eam, et liga ipsam: aut
cauteriza eam, si prouocat necessitas ad illud. Si autem iam incidit spon-
diles gutturis, aut totum, & saluatae sunt alhaudegi: tunc aggrega labia
cutis cum sutura super cannam gutturis, & non tangas guttur, imo aqua
ipsum, & reduc ipsum super figuram naturalem. Deinde stringe ipsum
strictura decenti, & dimitte ipsum diebus aliquot. Deinde cura ipsum
cum unguentis in quibus est stipticitas & exiccatio, donec sanetur.

Si autem uulnus iam fecit impressiōem in ossē, tunc perquire ipsum:
tunc si in ipso sunt fragmenta ossis, extrahe ea omnia, aut quae potes ex
eis: & quod non preparatur, dimitte illud, donec putrescat uulnus, &
separetur & alleuietur egressio eius. Quod si uulnus fuerit recens,
tunc pulueriza super ipsum puluerem quem narraui. Si autem uide-
tur in uulnere os, & fit Fistula: tunc cura ipsam cum eo cuius rememo-
ratio uenit in capitulo suo.

De uulnere in Spatulis. Caput LXXXVI.

B
S E S T percussio lanceae, aut cultelli: & uides eius profundita-
tem, tunc considera. Si ergo ex uulnere egreditur uentositas, quan-
do anhelat ex eo infirmus, tunc scias, quia uulnus est mortale. Quod
si non fuerit ei profunditas, & est recens cum sanguine suo: tunc non po-
nas in eo a prima hora puluerem, neque stringas ipsum, ut non retine-
atur sanguis in profunditate eius, & reuertatur ad cor, et interficiat in-
firmum: sed pone in ipso unguentum attractiuum, et solue ipsum in die
bis. Si uero unguentum non est tibi praesens, tunc pone in orificio uul-
neris cotum uetustum, ut sugat illud quod egreditur de eo ex humidi-
tatibus: & fac ut dormiat infirmus super uulnus, ut currat quod aggre-
gatur in eo. Si uero iam praeterierint uulneri tres dies, aut plures, &
non accidit infirmo spasmus, neque tremor cordis malus, neque strictu-
ra in anhelitu, & uides reliquas dispositiones eius bonas: tunc scias,
quia uulnus est saluum. Cura ergo ipsum & cum licinijs, et reliqua cu-
ratione, donec sanetur. Si uero excusatur sanatio eius, & iam aperitur
semper, tunc scias, quia iam factum est Fistula. Cura ergo ipsam ex ca-
pitulo suo. Et si uulnus est ex incisione ensis, aut cultelli, et est simplex
in superficie pectoris, aut dorso: tunc cura ipsum cum eo quod praecessit
ex sutura, si est magnū: aut cum puluere, si est paruū. Si autem iam fe-
cit impressiōem in ossē, et incidit ex eo frustra: tunc inquire uulnus, & pro-

C pera ad extrahendum illa frustra, si sunt separata. Si uero non sunt separata, tunc dimitte ea, donec putrefiat uulnus. alleuiatur enim extractio eorum. Reliquorū autem uulnerum accidentiū in reliquis membris iudicium in curatione, est iudicium eius quod diximus.


¶ De uulneribus Ventris, & exitu intestini, et exitura eorum. Caput LXXXVII.

D I S R V P T I O quæ accidit uentri, est magna, & media, & parua. Ex magna igitur quandoque egreditur intestinum, aut numerus intestinorum. Quare fit intromissio eorum, & eorum sutura uehementior & difficilior. Et disruptio parua etiam fit difficilis ex modo alio. Sequitur ergo, ut sit reductio eorū difficilior, si non properas in intromissione sua ad locum suū statim: quoniam inflatur, aperitur, et ingrossatur, quare fit difficilis introitus eius. Propter hoc ergo fit melior disruptio: num disruptio media: quoniam cum ea non fit difficilis reductio intestini, sicut fit difficilis in his duabus speciebus. Scias, quod sutura uentris est secundū quatuor modos. Duæ suturæ cōmunes cōueniunt in sutura uentris, et in sutura reliquorum uulnerum corporis: & duæ suturæ aliæ proprie cōmunicant reliquis uulneribus. Verumtamen sunt magis propriæ cum sutura uentris: et ego narro tibi unamquamque cum expositione, & declaratione. Dico ergo, quia quando uulnus est paruum, et egreditur ex eo aliquid ex intestino, et fit difficile reducere ipsum: tunc illud est propter unum duorū modorum. Aut propter paruitatem disruptionis, sicut diximus: Aut quoniam in intestino est inflatio propter frigus aeris. Quando ergo illud est ita, tunc oportet ut calefacias ipsum, ita ut submergas spongiam, aut pannū humidum in aqua tepida sola. Aut decoquas in aqua squinātum, & cyperum, et spicam, & embroces cum ea intestinum, donec resoluatur inflatio. Quandoque facit illud unum in quo est stipticitas: & est melius quam aqua sola in resolutione inflationis. Cum ergo uides inflationem iam resolui, tunc humecta intestinum cum aqua in qua decocta est altea, aut malua. Nam per illud alleuiatur introitus eius cum re parua. Si autem excusatur reditus eius post hanc curationem, tunc finde in disruptione parum, cum instrumento quo secantur hemorrhoides. Et curatio prima est melior quando præparatur, quam sectio: & non fit cōactio ad secandum post necessitatem & defectum instrumenti. Sit pars eius una quæ est torta, acuta, & pars eius altera non acuta, et extremitas subtilis non sit cum subtilitate spatulæ.

Sutura uentris modi quatuor.

D Disruptio parua.

Calefactio Intestini infrigidati dislocati.



imo sit obtusior parumper: & est illa quæ similatur caida, sicut uides. Cum ergo amplificatur uulnus, & ingreditur intestinum, tunc oportet, ut sit reductio eius secundum formam suam naturalem in loco suo sitibi proprio, si possibile est super illud: quoniam est melius. Quando uero disruptio est ampla in inferiori parte uentris: tunc oportet ut facias iacere infirmum super dorsum suum, & pone crura sua altiora capite suo. Et si est in superiore parte uentris, tunc pone caput eius, & pedes eius ipsius altiora quam eius inferiora. Et similiter si est disruptio in una duarum partium uentris, tunc pone intentionem tuam, & tuam considerationem semper in hoc, ut pars in qua est uulnus sit altior parte altera. Et ita oportet, ut administres illud in uulneribus magnis, & in uulneribus medijs. In uulneribus autem paruis, pone illud secundum quod præparatur tibi. Deinde fac ut sit præsens inter manus tuas minister pius, qui teneat disruptionem totam manu sua: & aggrega labia eius. Deinde detege ex ea ei qui sequitur futuram aliquid post aliquid: & iste est modus futura communis unius. Et est, ut accipias acum, aut numerum acum secundum quantitatem amplitudinis uulneris. Deinde dimitte ab extremitate disruptionis quantitatem digiti anularis, id est, medici: et fige acum unam præter quod intromittas in eam filum in duabus extremitatibus cutis, cum duabus extremitatibus sisac, quod est sub cute ab interioribus, donec facias eam penetrare ab alia parte, & tu iam aggregasti duas extremitates cutis, & duas extremitates sisac: & fiunt quatuor ordines. Deinde stringe cum filo duplo in circumitu acus aliquotiens a duabus partibus simul, quousque sint aggregata duo labia uulneris aggregatione decenti. Deinde dimitte grossitudinem digiti etiam; & fige in eis acum aliam: postea reta eam cum filo, sicut fecisti cum acu prima. Non ergo cesses facere illud cum eo quo indiges ex acubus, donec compleas constrictionem uulneris totius. Et sint acus mediae inter grossitudinem & subtilitatem: quoniam acus subtiles ualde uelociter incidunt carnem: & grossæ sunt difficilis introitus in cutem: propter illud oportet ut sint mediae in subtilitate, & grossitudine. Et non oportet, ut figatur acus in duabus extremitatibus cutis propinqua multum: ut non incidatur caro uelociter, & aperiatur uulnus ante consolidationem sui, & non elongentur etiam cum futura, ut non prohibeatur uulnus a consolidatione. Deinde incide extremitatem acuum, ut non lædant infirmum apud somnum suum: & pone eis puluissimos ex pannis ab omni parte, qui teneant extremitates acuum: & dimitte eos, donec scias quod uulnus iam consolidatum est. Et hæc quidem species futurae cum acubus taliter est convenientior in uulneribus paruis. Quoniam sufficit in futura eorum acus una, aut duæ, aut circiter eas. Sutura autem secunda communis est, ut aggredes cum futura extremitates quatuor: extremitates, duas cutis, & extremitates

A

Disruptio
ampla.Extremities
Anatomia

B

Acuū dispo-
sicio.

Ctes duas sisac in uice una, cum acu in qua sit filum inuolutum a quale in subtilitate, & grossitudine. Deinde quando penetraueris cum acu has extremitates quatuor, reduc acum a parte a qua incipisti eadem, ut cadat filum retatum a superiori parte uulneris: ut sit futura, sicut futura panni quo stringuntur panni, et pone inter omnem futuram quantitatem grossitudinis digiti minoris. Hanc autem futuram sciunt homines. Et cum hac futura ego fui uulnus quod acciderat uiro in uentre suo, qui fuerat uulneratus cum cultello, & erat disruptio uulneris maior palmi uno: & exierat ex intestinis circiter duos palmos ex intestino medio, et erat disruptio in medio uentris. Reduxi ergo illud postquam stetuit intestinum eius extra uulnus. xxiii. horis. Consolidatum est ergo uulnus in spacio quod fuit circiter. xv. dies: & curauit ipsum, et sanatus est: & uixit post illud annis multis; conuersatus in suis dispositionibus. Et medici iudicauerant, quod non sanaretur. Et ex miraculo fuit, quod non curauit illud cum unguento. Quoniam fui in loco in quo non inueniebatur unguentum; neque aliquid ex medicinis. Posui ergo super uulnus cotum uelustum bis in die, & assiduauit ablutionem eius cum aqua mellis, donec sanatum est. *Experimenti A* *Authoris.* *origini. Cl. antiqua*

Duas autem species future proprias dicam secundum narrationem sermonis. Et est, ut incipias cum futura acuta: & intromittas acum ab exteriori ad interiorum partem. Cum ergo penetrat acus in cutem, & in lacertum euntem secundum longitudinem & latitudinem totius corporis: dimitte extremitatem sisac in latere in quo intromisisti acum, & fac penetrare in extremitatem aliam ab interiori parte ad exteriorum in extremitate altera mirach. Cum ergo feceris eam penetrare, tunc fac eam penetrare secundum hoc in eadem hac extremitate mirach ab exteriori parte ad interiorum: & dimitte extremitatem sisac, quæ est in hoc latere, & fac penetrare acum in extremitatem alteram ab interiori parte ad exteriorum: & fac penetrare cum penetratione tua quæ facis eam penetrare in sisac extremitate mirach, quæ est in parte eius, donec penetret in ipsum totum. Deinde incipe etiam ab hoc eodem demlatere, & sue ipsum cum extremitate, quæ est ex sisac in latere alio, & extrahe acum ex cute quam penetrauit. Deinde reduc eam in illam cutem, & sue extremitatem sisac, quæ est in latere alio, cum hac extremitate mirach: & extrahe eam ex cute quæ est ex parte eius, & fac illud uice una, & alia: et fac illud uice post uicem, usquequo suas extrinsecum totum secundum illud exemplum. Et summa huius future, est ut suas futura secipariorum qua sunt pelles: ita ut suas sisac uice una ex parte una extremitate cutis: & ut dimittas eam uice alia ex parte alia, donec compleas. *Experimenti A* *Authoris.* *origini. Cl. antiqua*

Secunda species future propriæ, quam dixit Gale-nus. Iste eius sermo narratus est, ut suas eam secundum similitudinem, qua sunt eas quidam medicantium, ita quod aggregant omnem partem ad comparem suam conuenientem per naturam: & applicant

extremitatem sisac ad eius aliā extremitatem, & extremitatē mirach ad extremitatē eius aliā. Et illud fit secundū quod narro tibi. Oportet ut figas acum in extremitatē mirach propinquā tibi ab exteriori parte, et facias eam penetrare ad interiorem in eo solo: & dimittas duas extremitates sisac. Deinde reuolue acū, & fac eam penetrare ab exteriori parte ad interiorem in duas extremitates sisac, scilicet utrinq;. Deinde reuolue utraq;, etiam fac penetrare utraq; ab interiori usq; ad exteriorē, in duas extremitates mirach alias, quæ sunt in latere opposito. Et iste modus futuræ est melior futura cōmuni facili, et est futura cuius præcessit rememoratio. Iste est ergo sermo Galeni etiam. Et dixerunt quidam. Rectificatur futura uentris cum duabus acubus. Quod est, ut intromittas in eis utrisq; filum unum: & incipe cum intromissione acus, ex eo quod est apud te, & fac eam penetrare usq; ad latus aliud, secundū futuram eorū qui sunt coria æqualiter. Et scias, quod quando disruptio est in medio uentris: tunc futura eius est difficilior quam reliquorū locorū uentris. Iudicium uero medicationis uulneris, est iudicium reliquorū uulnerrum. Quod est, quia quando tu consequeris uulnus recens cum sanguine suo, antequā alteret ipsum aer: et reducis intestinum, & suis ipsum, & aptas ipsum: tunc pone super puluerem incarnatiuum. Quod si aer iam alterauit uulnus: tunc pone super ipsum quædam unguenta, quæ sunt tibi præsentia, donec faciant pus: & cadant fila, et consolidentur sisac, & mirach. Deinde cura illud sicut est curatio reliquorum uulnerū, donec sanetur. Si autem non sunt tibi præsentēs medicinae, tunc pone super ipsum statim, ex quo incipit emittere pus, cotum uetus: & permuta ipsum bis in die, sicut docui te, donec sanetur. Nam tu non indiges medicatione aliā in pluribus dispositionibus, quando uulnera sunt simplicia. Si autē times, quod cōmunicet uulnus mēbris principalibus in læsione, tunc oportet ut submergas lanā lenem in oleo temperatæ caliditatis, aut in oleo rosato: & pone ipsam in circumitu locorū quæ sunt inter inguina, & sub ascellas. Quod si sentis dolorem, aut punctiones, aut putrefactionem in intestinis suis (nam multotiens accidit illud) tunc clisteriza ipsum cum uino stiptico, nigro, tepido: præcipue si putredo iam peruenit in intestino, & facta est exitura penetrans usque ad concauitatem eius. Et scias, quod illud quod est ex intestino grosso, est facilioris sanationis: & quod ex eis est ex subtili, difficilioris sanationis. Intestinū autē quod nominatur leiunū, non suscipit sanationem ex uulnere quod accidit in eo omnino: & illud est propter multitudinem eius, quod est ex uenis, et magnitudine earū, & propter subtilitatem corporis eius, & propinquitatem ipsius naturæ neruorū. Si autem illud quod prodest ex uulnere est zirbum, et consequeris ipsum recens: reduci ipsum secundū reductionem tuam, qua reducis intestina æqualiter. Si uero præterijt ei spacium, & iam factum est uiride, aut nigrum: tunc oportet ut

C stringas ipsum cum filo supra locū qui denigratus est ex eo, ut non accidat fluxus sanguinis. In zirbo enim sunt uenæ & arteriæ. Deinde incide quod est præter illud ligamentū, & pone duas extremitates fili pendentes ex inferiori parte uulneris extra ipsum: ut alleuiet super te attractio eius, et extractio ipsius apud casum zirbi, & emissionē pus uulneris.

¶ Rememoratio uulneris quod accidit in Intestino.

Q VANDO accidit disruptio in Intestino, et est parua: tunc possibile est, ut restauret in quibusdā hominibus: propterea: quia ego uidi qui fuit uulneratus in uentre suo cū percussione lanceæ, & erat uulnus a dextra stomachi, et antiquatū est uulnus: et factum Fistula, & exiuit ex eo egestio, et uentositas. Posui ergo curationem, usq; quod ego non fui confusus in sanatione eius: neq; cessauī subtiliare ipsum, donec sanatus est, et consolidatus est locus. Postquam ego uidi locum iam consolidatū, timui super infirmū, quod accideret super infirmū accidens malū in uentre suo: & nō accidit ei ex illo accidens malū. Et remansit in melioribus dispositionibus suis, comedens & bibens, & futuens, et intrauit balneum, & exercitatus est in dietis suis. Etiam dixerunt quidam experimentatorum, quia quando accidit in Intestino uulnus, et est paruū: tunc oportet ut ligetur secundū hunc modū. Et est, ut accipias formicas magnorū capitum. Deinde aggrega duo labia uulneris, & pone formicam unam ex eis quæ habeant os apertū super duo

D labia uulneris. Cum ergo capit super ea, & stringit os suū, abscinde caput eius, adhæret enim, & non soluiť. Deinde pone formicā aliam prope primā, et non cesses facere illud cū formica post formicam secundum quantitātē uulneris totius. Deinde reducipsum, et sue uulnus. Illa enim capita remanent annexa in Intestino, donec cibetur Intestinum, & sanetur, & non accidat infirmo nocumentū penitus. Et iam possibile est, ut ligetur Intestinum etiam cum filo subtili: quod absterfum est ex intestino animalis, annexo cum eo postquam intromittitur in acū. Et est, ut accipias extremitatem huius fili ex intestino, & excarnetur multū. Deinde liga in extremitate eius filum lini subtile inuolutum. Deinde intromitte illud filum in acū, & sue cum eo intestinū. Deinde reducipsum in disruptiōem. Et iste modus futuræ cum formicis & intestino, non est nisi secundum uiam fiducię & spei. Scias, uulnus quod est magnum, amplum, præcipue si est in uno intestinorū gracilium: tunc non est ingenium nisi subtiliatio, neq; est eius sanatio omnino.

¶ De cura Zuchemen, & Fistularum.

Caput

LXXXVIII.

SICIAS, quod omne uulnus, aut apostema quando ueterascit & antiquatur, & fit ulcus, et non cōsolidatur, & emittit pus semper, et non abscinditur: tunc nominatur uniuersaliter in quocunq; membro fuerit Fistula, et nōs nominamus ipsum Zuchemen. Et Fistula quidem est se-

Experimentū
Aitoris.

Fistula pro-
pria quæ sit.

cundum ueritatem nodatio filtriata, dura, alba: cum qua non est dolor, cui est concauitas pennæ auis: & propter illud nominant eam quidam Risati, id est, pennā. Et est in quibusdam horis humida, quæ emittit pus. Et fortasse scinditur humiditas in quibusdam horis. Et quādoq; est hæc humiditas multa, & est pauca: et est grossa, & est subtilis. Et ego iam premissi in diuisione, tunc cum dixi uulnera, quod omne ulcus quod non sanatur, neq; nascitur in eo caro, non est illud nisi propter unam nouem caussarum. Quarum una est, aut propter paucitatem sanguinis in corpore: aut propter maliciam eius: aut quoniam inter ipsum, et super labia eius est caro dura, prohibens natiuitatem carnis: aut quia est multa sordis & sordicie: aut quoniā ulcus in seipso est putridū, et materia quæ mittitur ei est malæ qualitatis: aut quoniā medicina est inconueniens in curatione eius: aut quoniam corruptio cadens in regione est genus pestilentie, aut per proprietatem in regione, sicut accidit in Cæsaraugusta: in qua fit difficilis digestio ægritudinum, & tardatur in ea sanatio apostematū per naturam: aut quoniam in eo est os unū, aut numerus ossium. Ego iam ostendi omnes istas causas & signa earū, et curationes ipsarum cum medicinis in diuisione: & oportet hic ut faciam te scire curationem Fistulæ & Zuken, quæ fit per uiam operationis cum manu.

Indicium Vlcerum.

Scias ergo, quod Fistula accidit in omnibus membris corporis. nam ex eis sunt Fistulæ quæ peruenerunt ad uenas magnas & arterias, aut nervos, aut sifac: aut ad intestinū, aut ad uesicam, aut ad aliquam ex costis: aut ad aliquam ex spondilibus dorsi, aut ad aliquam iuncturam compositarum compositione: sicut manus, & pedis: et ex eis sunt quæ uadunt ad propinquitatem membri principalis, et similibus. Quæ ergo ex his Fistulis est secundum hunc modum, est ex ægritudinibus difficilis sanationis, & non recipit curationem, & occupatio cum ea est labor & ignorantia. Quod si est ex Fistulis aliqua cuius profunditas non peruenit ad hæc loca quæ dixi: & speras, et confidis in curatione eius, & uis peruenire ad cognitionem illius, tunc accipe tentam ex ære, aut ferro, si Fistula tendit secundum rectitudinem, & perquire eam cum ipsa. Si autem in Fistula est tortuositas, tunc inuestiga eam cum tenta de plumbo subtili. Quoniam plumbum cum lenitate sui corporis alleuiatur, et curuatur circa tortuositatem. Quod si Fistula est habens orificia multa, non est tibi possibile ut significes super eam cum tenta. Clisteriza ergo ex eis orificium ex orificijs suis. nam humiditas qua clisterizas ipsum, uadit uersus orificia alia, & currit ex eis. Deinde exquisite inquire secundum quæmodum est tibi possibile: ut cognoscas quod illic est os, aut nervus, & est Fistulæ concauitas longinqua, aut propinqua: aut est Fistula una cui sunt orificia multa, et sta super totum illud, cum summa fortitudinis tuæ: cum interrogatione tua, qua interrogas infirmum, & inuentione doloris apud compressionem cum manu tua super locum, et simi-

B

C libus ex significationibus & caussis accidētibus apostemati. Cum ergo steteris super omnia illa statione uera, tunc uade ad curationem secundum confidentiam: & est, ut consideres tunc, si est Fistula propinqua apparens, aut in loco saluo longinquo a iunctura, aut a neruo, aut arteria, aut uena, aut uno locorum quæ dixi tibi: tunc seca Fistulam secundum quod præmissum est ex narratione mea, & aufer quod est in ea ex filtratione, et carnibus corruptis, quod nascitur in orificio eius ex carne, aut thelul, & similibus: et cura ipsam, donec sanetur. Si autem Fistula est longinquæ profunditatis, & est secundum rectitudinem: tunc oportet ut leces eam in profundo quantū est tibi possibile. Deinde mundifica ipsam ex omnibus carnibus eius corruptis. Deinde administra linimenta inuoluta in medicinis acutis: & intromitte ea usque ad concauitatem Fistulæ quam comprehendisti cum ferro: fac cum ea illud aliquoties, donec corrodat medicina acuta totum quod remansit in concauitate Fistulæ ex corruptione. Deinde restaura ipsam cum unguentis quæ generant carnem sanam, donec sanetur. Si uero non sanatur per illud, tunc cauteriza ipsam secundum quod narrauimus. Si ergo causa Fistulæ est os, & certificat apud te illud: tunc inquire ipsum, & seca ipsum secundum quod narraui tibi: si non prohibet te aliquid ex uena, aut neruo, aut membro principali, sicut diximus. Si ergo detegitur tibi os, et est in eo quiddam corruptionis, & nigredinis: tunc rade ipsum, donec auferatur corruptio eius tota. Deinde cura ipsum cum eo quod incarnat ipsum, donec sanetur. Quod si non sanatur, & emittat pus sicut faciesbat: tunc scias, quod tu non peruenisti ad totam eradicationem corruptionis. Detege ergo super illud secundo, et exquisitè fac rationem eius, & mundificationem ipsius cum ultima fortitudine tua. Deinde restaura ipsum. Si ergo sanatur, bonum est: & si non, tunc scias quod illa corruptio est in profunditate longinqua corporis, quam non es consecutus. Non est ergo tibi in ea ingenium, nisi dimittere ipsam naturæ.

Quod si corruptum est os paruum, et est possibile tibi, attrahe ipsum cum forcibus subtilibus quæ conueniunt ad illud. Si autem sunt ossa multa, tunc exquisite fac attractionem eorum omnium, neque dimittas ex eis aliquid cum tua fortitudine. Si uero contrarietatem facit tibi aliquid ex humiditatibus, & non est in incisione eorum timor, uel error: tunc incide illas humiditates & carnes, si sunt illic, & libera ossa. Si uero non est tibi præparatio auferendi ossa ex hora tua, tunc pone super uulnus quod putrefaciat ipsum: et dimitte ipsum, donec putrefiat quod est in circumitu illorum ossium ex carnibus & humiditatibus. Et custodi uulnus ut non consolidetur. Et constringatur sectio quam tu secuisti in operatione tua. Imo pone super ipsum, si times, cotum submersum sulfure trito cum oleo: aut cotum submersum in unguento ægyptio, aut aliquo unguentorum uiridium. Nam quando putrescent illæ scilicet hu-

miditates, & separantur ex eis ossa, alleuiatur ablatio eorum, et ipsorum **A**
 attractio. Si autem est os unum magnum, sicut os cruris, aut os coxæ,
 & similia illis, et quod ex eo corruptum est, est pars magna: tu ne rade
 ipsum racione ultima, donec auferatur illa nigredo & corruptio. Deinde
 de restaura uulnus. Si uero quod est in eo corruptum, est pars magna,
 & corruptio iam consecuta est medullam ossis, tunc necesse est ferrare
 ipsum, & incidere ipsum totum usque ad locum, ubi peruenit corru-
 ptio: tunc cura ipsum, donec consolidetur. Et ego narro tibi zucken,
 quæ accidit uiro in crure suo: ut ponas ipsam exemplum & adiutorium
 super operationem tuam. Fuit uir iuuenis ætate circiter triginta annos,
 cui accidit dolor in crure suo, a causâ quæ mota est super ipsum intra
 corpus, id est, ab interioribus, donec peruenerunt materiæ ad crus, & as-
 postematum est apostemate magno: & non fuit ei causâ extrinseca. Ex-
 tensum est ergo cum eo tempus cum errore medicorum, donec apertum
 est apostema, & concurrerunt cum eo materiæ multæ. Et postposita est
 curatio eius, donec fistulatum est crus, & facta sunt in eo orificia multa:
 quæ omnia emittebāt pus, & humiditates corporis. Curauit ergo ipsum
 multitudo medicorum circiter duos annos, & non fuit in eo sapiens in
 arte manus, donec uocatus sum, & uidi crus eius, & materias quæ cur-
 rebant ex illis orificijs cursu magno: etiam omne uiri corpus iam tabu-
 erat, & color eius citrinus erat. Intromisi ergo tentam in uno locorum
 orificiorum, & peruenit tenta ad os. Deinde perscrutatus sum orificia
 omnia: & inueni ea peruenire ad se inuicem ex omnibus partibus crur-
 ris. **B** Properaui ergo, & secui super unum illorum orificiorum, donec de-
 texi partem ossis: & inueni ipsum corruptum: quod iam corrosum erat,
 & denigratum, et putruerat, & perforatum erat, donec penetrauerat us-
 que ad medullam. Serraui ergo quod detectum est mihi, & præpara-
 tum ex osse corrupto. Et deputaui, quod non esset in osse nisi illa corru-
 ptio, quam abscidi, & serraui. Et ego iam eradicaui eam. Deinde
 posui restaurationem uulneris cum medicinis consolidatiuis spacio lon-
 go. Et non est consolidatum. Deinde tentauī, & detexi super os secun-
 do supra detectionem primam: & inueni corruptionē continuam cum
 osse: & serraui quod apparuit mihi etiam ex illa corruptione. Deinde
 conatus sum restaurationem eius. Et non est restauratum. Detexi ergo
 super ipsum iterum, & non cessauī incidere os particulatim, & conari
 restaurationem eius: & non est restauratum, donec incidi ex osse circi-
 ter palmum unum, & extraxi illud cum medulla sua. Deinde restaura-
 ui ipsum cum medicinis; & consolidatum est uelociter, & sanatum: &
 non fuit necessaria hæc iteratio in operatione eius, & sectione ipsius, nisi
 propter dispositionem debilitatis infirmi, & paucitatem tolerantie ei-
 us, & timorem meum super ipsum de morte: quoniam accidebat ei in
 omnibus horis ex superfluitate euacuationis syncopis mala. Sanatus est

Experimentū
 Autoris.

Serraturæ
modus.

C ergo sanatione integra: & nata est in loco ossis caro dura, et bona facta est dispositio in corpore suo, & redijt uirtus eius: et conuersatus est in dispositionibus suis: & non fecit ei contrarietatem in ambulatione nec cumentum omnino. Si autem os eminens in loco corporis iam fractum est: tunc oportet ut serres ipsum, secundum hunc modum: & est: ut accipias ligamentum, et stringe ipsum in extremitate ossis eminentis: & præcipe alicui, qui extendat ipsum ad sursum: et pone ligamentum aliud ex lana grossius ligamento primo. Deinde liga ipsum super carne, quæ est sub osse: & extende extremitatem eius, ut trahas carnem ad inferiora: & tu detegis carnem super locum quem uis ferrare, ut non lædat Serra carnem. Pone lignum, aut tabulam sub osse inferius decenter: quoniam quando facis illud, non prohibetur quin secet carnem corruptam. Et oportet ut sit Serratura super locum corruptum parumper, ut non sit in concavitate ossis corruptio: & non appareat in apparitione sua sensui, & cogat ad Serraturam sui uice alia. Quod si os est corruptum, et non est eminens, imo continuatur pars eius cum parte: & corruptio est in medio eius, aut in parte ipsius: tunc detege carnem ab omnibus partibus totam. Deinde pone lignum inferius. Postea serra illud ex parte prima, ubi est corruptio, donec continuetur Serratura ex parte altera: et sit Serratura secundum longitudinem a corruptione parumper,

D secundum quod diximus. Quod si corruptio est in iunctura, incide ipsam iuncturam corruptam, et serra os ubi continuatur ex parte altera. Si uero corruptio est in continuatione duarum iuncturarum, tunc non est in ea ingenium nisi abrasio. Quod si corruptio est in pectine manus, aut in pectine pedis: tunc res in eo est difficilis ualde. Verum oportet, ut inquiras corruptionem qualiter appareat tibi. Et abrasas eam, & mundes ipsam secundum quamcunque dispositionem tibi possibile est, & cum quocunque ingenio rectificatur tibi: quando non facit tibi contrarietatem Vena, aut Nerus. Et scias quod incisoria, & Serræ ad incidendum ista ossa sunt multa, secundum situm ossium, & præparationem eorum, & ipsorum grossitudinem, et subtilitatem eorum, & magnitudinem, & paruitatem ipsorum, et duriciem ipsorum, & eorum raritatem. Quapropter oportet, ut præpares omni speciei operationis instrumentum conueniens ad illam operationem.

Et scias, quod operationes istæ significant tibi super speciem instrumenti quo indiges, quando tecum est studium longum. Et cognitio modorum huius artis, testimoniū modorum ægritudinum: tunc enim iam inuenies per te ipsum illud quod conuenit ei ex instrumentis ad omnem in firmitatem. Et ego sum firmans tibi in ultimo huius ca-


pituli numerum instrumentorum, quæ pones exemplum propla super quæ incidis, & probationem qua experiaris super alia.

Forma Serræ.


A




Forma alterius Serræ.



Forma Serræ alterius.



Forma Serræ alterius.




B



Hæc forma Serræ depicta, sit decenter facta. Fiat arcus eius superior, & acuitas eius ex ferro: & manubrium eius ex buxo, et sit pyramidale decenter factum.

Forma Rasorij iuncturarum.




Sit caput huius Rasorij, secundum formam capitis clavi stellati: et puncta eius sint secundum formam punctorum elischetfegi. Et non conuenit, nisi ut fricentur cum eo capita iuncturarum, quando corrumpuntur, aut os amplum, & magnum est.

Forma maioris Rasorij.



Forma medijs Rasorij.




C

Forma Rasorij lati.



Forma Rasorij in quo est concauitas.



Forma Rasorij alterius subtilis.



Forma Rasorij alterius curuatæ extremitatis.




Forma Rasorij parui, subtilis tentæ.




D

Forma Rasorij cum quo inciduntur ossa.



Forma etiam Rasorij magni.



Hoc similatur Radio, & extremitas est sicut Serra: exhibetur in locis multis ex razione ossium.



Forma Rasorij quod conuenit ad racionem eius quod perforatum est ex ossibus. Extremitas eius triangula, acutarum est extremitatum. Fit ex Indi. Et similiter oportet, ut fiant omnia quæ diximus ex Rasorij, & Incisorij, & Serris.

P

De incisione extremitatum, & Serratura ossium. Caput LXXXIX.

UT RESERVANT extremitates, aut ex causa extrinseca, aut intrinseca. Cum ergo medicatus fueris illam corruptionē curatione medicinarū, et non confert curatio: & uides corruptionē incidere in membrum, quam non repercutit aliquid: tunc oportet ut incidas illud mem-

¶ Typus Serraturæ membrorum
corporis humani.

Serratura.



- C** brum usq; ubi consequit corruptio, ut euadat infirmus per illud a morte, aut a malicia quæ est maior defectu membri. Et signum cui accidit illud est, quod denigratur membrū, donec putetur: quod ignis combust sit ipsum, aut putrefit post nigredinē: donec inciditur illa putredo usq; ad illud quod sequitur illud membrū, et serpit in totū corpus. Propterea ergo cum incisione eius, & similiter si causā corruptionis est a percussione quorūdam ueniosorū: sicut scorpionis marini, & uiperæ, et rutellæ, & similiū. Si ergo corruptio, aut percussio est in extremitate digiti, tunc incide digitū, et non des spaciū corruptioni, ut incedat usq; ad reliquā manum. Et similiter si accidit in manu, tunc incide eam ex radice facilis, & non des spacium corruptioni, donec capiat in focii brachij. Et si inuadit in eo, tunc incide brachium apud cubitū in iunctura sua. Si autē pertransit corruptio, & uides eum circiter cubitum: tunc in illo est mors infirmi. Et administrare præter illud ex curatione, est quantitas uirtus. Et similiter fac de pede, quando inuadit corruptio in digito, tunc incide ipsum apud unū nodorum: & si capit in pectine pedis, tunc incide pedem totum. Si autem ascendit ad genu, tunc incide crus apud iuncturam genu. Quod si corruptio iam peruenit supra genu, tunc non est in ea ingenitū, nisi dimissio, & relinquere infirmū morti. * Et modus incidendi membrū, aut serrandi ipsum est, ut stringas ligamentū in inferiori, quem uis incidere: & stringe ligamentū aliud supra locum. Et extendat minister ligamentum unum ad inferiora: & extendat minister aliud ligamentum superius ad sursum. Et tu separa carnem quæ est inter duo ligamenta, cum Spatumili la, donec detegatur caro tota. Deinde incidatur, aut ferretur. Et oportet, ut ponas ab omnibus partibus pannum lini, & non tangat Serra locum sanum: & accidat infirmo læsio addita, & apostema calidum. Si autē accidat fluxus sanguinis interius dum operaris, tūc cauteriza locum uelociter: aut pone super ipsum quosdam pulueres abscindentes sanguinem. Deinde redi ad medicationem tuam, donec compleatur. Deinde liga membrum uulneratū cum ligamento cōueniente ei, et cura ipsum, donec sanetur. Et ego narro tibi quod accidit uiro in pede suo, hoc idem accidens quod narro tibi. Quod est, quia accidit in pede suo nigredo, cum adustione quæ assimilatur combustioni ignis: & corruptio illa in primis accidit in digito suo, donec cœpit pedem totum. Propterea uir ex seipso, postquam uidit corruptionem incidere in membro cum uehementia eius, quod inuenit ex dolore, & adustione eius: et incidit ipsum apud iuncturam, & sanatus est. Et postquam præterijt ei tempus longum, accidit ei illa eadem corruptio in digito manus suæ indice. Venit ergo ad me, & conatus sum recuperare illam superfluitatem cum eo quod posui super manum ex medicinis post mundificationem corporis eius: & non repercussa est superfluitas, & cœpit incedere in digitū alium: donec cœpit corruptio in ma-

Experimentū
Aitoris.

num. Vocauit ergo me, ad incidendum manum eius: & nolui illud, spe- A
rans ex me super percussione illius superfluitatis: & timui etiam su-
per ipsum apud incisionem manus eius mortem. Quoniam uirtus uiri
erat super casum. Postquam ergo desperauit de me, reuersus est ad ter-
ram suam: & peruenit ad me de eo, quia properauit, & incidit manum
suam totam: & sanatus est. Et non attuli hanc narrationem, nisi ut sit ad-
iutorium super illud quod cadit de genere huius aegritudinis: & ut sit si-
gnificatio qua significetur, et secundum quam agatur.

¶ De cura Sinuum, & qualitate clisterizationis cum
medicinis. Caput XC.

QUANDO accidit apostema in quibusdam mēbris carnosīs, Sinus.
& prolongatur spaciū apostematis, donec collectionē facit
saniei: deinde rumpit, aut perforatur, & egredit quod in eo est ex sanie,
& remanet locus uacuuus quasi sit uas: & cutis quæ est super ipsum sicut
pānus qui iam subtiliatus est: et non peruenit ad ultimū in corruptione
sua, neq; imprimi in os, neq; in neruum, neq; in ligamentū: meretur ut
nominetur Sinus: & non nominatur Fistula: uerūtamen si prolongatur
spacium eius, donec imprimat corruptio in aliquid horū membrorum;
tunc nominat Fistula, aut zucken. Et cura eius est, ut incidas illā cutem
totam sicut reuoluitur: & præcipue quando subtiliata est, & facta sicut
pannus: et confidis quia non adhæret cum loco, propter corruptionem B
suam. Si autē speras quod adhæreat cutis, & non consequitur ex eo cor-
ruptio illa ultima consecutione: & si in cūte est spissitudo ex carne, tunc
cura, ipsum cum Clisteri: & est, ut consideres ad Sinum. Tunc si est ma-
gnus, et pus quod emittitur ex eo est fœtidi odoris: tunc clisteriza ipsum
cum medicamine ægyptio, quod est aceti, & olei, & ziniar, partes reci-
piens æquales, aggregentur in uase: & decoquantur super ignem, do-
nec rubeat medicamen: & ueniat in spissitudinem mellis. Deinde acci-
pe ex eo quod tibi necesse est: & dissolue ipsum cum aqua & melle, et cli-
steriza cum eo Sinum: & stringe orificium eius, & dimitte medicinam
in eo ad quātātem duarū horarum. Deinde extrahe ipsum cū expressi-
one: fac illud diebus tot, donec mundificetur Sinus, et remoueat fœtor.

Et quandoq; clisterizatur cum aqua cineris, quando non est tibi præ-
sens hoc medicamen: et est, ut accipias cinerem lignorū uitis, aut cinerem
ex lignis ilicis: et projicias super eam aquā. Deinde cola eam, & clisteri-
za cum ea, donec confidas quod Sinus iam ablutus est. Quod si infir-
mo non est tolerantia super medicamen ægyptium, neq; aquam cineris,
tunc clisteriza ipsum cum aqua & melle, cui iam permixtum est aliquid
ex ziniar contrito. Aut clisteriza ipsum cum melle & uino permixtis,
quoniam de proprietate mellis est, ut mundificet, & abluat: et uinum fa-
cit adhærere Sinum, præcipue quando in uino est superfluitas stiptici-

C tatis & siccitatis. Cum facis illud aliquoties, et confidis quod Sinus corruptio iam remota est: tunc clisteriza ipsum cum eo quod facit nasci carnem in eo. Et est, ut accipias ex emplastro dyafinicon: & dissolvas ipsum cum oleo rosato, et uino stiptico: aut clisteriza ipsum cū quibusdam medicinis, et unguentis alijs, quorum proprietates scripsi in tractatu unguentorum. Quod si orificium Sinus est strictum, in quo non capit canula clisteris: tunc amplifica ipsum cum ferro parumper: aut pone in ipso licinium inuolutum in unguento ægyptio, aut in unguento basilicon, donec amplificetur. Et similiter si est orificium etiā amplum, tunc aggrega labia eius cum sutura: & dimitte ex eo quantitatem in quam ingrediatur clistere sine additione. Et similiter si orificiū eius ex quo currit pus, est eleuatum ad superiora: tunc seca ipsum in depressiori loco qui est in ipso, ut currat ex eo pus usque inferius: quoniam pus quando coarctatur in profunditate Sinus, prohibet carnem generari in eo. Quod si non est tibi possibile secare Sinum circiter inferius eius secundum quod uis: tunc conare, ut prepares membrum præparatione qua currat ex eo pus cum facilitate secundū quod præparatur tibi. Conare, ut non reuineatur in eo aliquid ex pus omnino: et accipe medicinas consolidatiuas quæ ponuntur super signum, conuenientes ad illud quod uis: Et extende eas super pannū lini. Et sit pannus tantæ quantitatis, qua fiat cōmunicatio totius Sinus. Deinde incide cum forficibus in directo orificij Sinus foramen, amplius orificio Sinus parumper. Deinde extende ex unguentis lenibus super pannum alium, secundum quantitatem foraminis: & pone eum super ipsum positione longinqua ab orificio Sinus, ut alleuetur exitus pus ex eo: & non auferas pannū magnum, nisi post dies aliquos uice una. Ille autem qui est super orificium Sinus, est ille quem remoues in omni hora, ut egrediatur quod aggregatur in eo ex pus: & ut scias, an illud quod currit ex eo uirus, est multum, aut parum: aut digestum, aut indigestum. Et cum hoc iterum considera locum Sinus ipsius, an in ipso sentiat dominus eius dolorem, aut nō sit in eo dolor, & an sit in eo apostema, aut non sit in eo apostema. Cum ergo protenditur medicatio tua taliter, & uides materiam quæ egreditur super orificium Sinus, tunc scias, quod Sinus iam adheret, aut approximat adherentiae: tunc ergo solue ipsum in manē, aut in tertio die: et quādo soluis uulnus, tunc permuta pannū alium, & renoua unguentum. Si autem egreditur ex Sinu post spacium longū uirus subtile, tunc non desperes de adherentia eius. nam sanatio eius appropinquat. quoniam ex hominibus sunt qui tardant generationē carnis in uulneribus suis, & ex eis sunt qui agunt e contrario illius. Si autē egreditur ex Sinu post dies multos pus indigestum, tunc scias quod sinus non adhæret. Si ergo tardatur adherentia Sinus, & prolongatur res eius: tunc adde in exiccatione medicinarum, uerum faciant medici, ut sint medicinæ in substantia sua humi-

A dæ, et in uirtute sua siccæ: sicut unguentum dyafinicon, quando additur in eo superfluitas additionis ex zegi. Et ex magis ultimo quo curatur, est, ut accipias unguentum dyafinicon, & soluatur cum oleo rosato, & roretur super ipsum uinum antiquum æquale in substantia sua. Deinde confice ipsum cū eo, & utere ipso. Et iam facit simile huic actioni, quando non est tibi præsens unguentum dyafinicon, mel, quando decoquis ipsum, donec ingrossetur, & uteris eo. Aut accipe myrrham, & aloen, & olibanū: tere totum, & pulueriza illud super mel dum est super ignem. Deinde line super ipsum pannum, et stringe ipsum super Sinum: & line cum melle quod decoquisti, donec ingrossatum est: & pulueriza super ipsum species, & pone super ipsum pannū, et stringe eum. Et quandoque administratur in illo aristolochia longa, & radices lilij cœlestis, & est lilium: et farina herbi, & centaurea. utere eis simplicibus, aut aggregatis. tere ea, & cribella ipsa: et pulueriza super mel quod narraui, & utere eo. Quod si prolongatur res Sinus, et non sanatur hac curatione: tunc scias, quod in profundo eius est corruptio: aut iam facit impressio- nem in ossibus, aut in reliquis membris duris, aut ligamentis: tunc cura ipsum curatione Fistularum, secundum quod præmissum est.

¶ De cura Panaritij & unguis attritæ, & incisione digiti ad-
diti, & sectione. Caput XCI.

PANARITIVM est apostema qd nascit̃ sub ungue pollicis manus, aut pedis: et fortasse nascit̃ in reliquis digitis. Cum ergo prolongatur res eius, & negligitur curatio eius, et apostematur apostemate calido: aut corrumpitur, et emittit pus, donec corrodit radicem unguis: & fortasse corrumpit eam totam, et fortasse peruenit corruptio ad os, donec est ei odor foetidus: & fit extremitas digiti lata, et fit color eius fuscus. Quando ergo tu curas ipsum, cum eo quod diximus in diuisione, et non confert curatio tua: tunc oportet ut incidas cum ferro totā superfluitatem quæ remansit ex ungue. Deinde cauteriza uulnus post illud. Cauterium enim iuuatiuū est ualde. Si uero os est sanum, et est unguis etiam sana, et additiones uacuæ unguis iam comprimūt carnem ad interiora, & incipiunt pungere ipsam, et lædunt eam: tunc oportet ut ponas Radium subtilem sub angulo unguis quæ pungit carnem, et impelle eam sursum: & incide eam carnē cum facilitate, et pone super illud quod remanet de carne ex medicinis comburentibus, corrosiuis, donec remoueat̃ totū eius. Deinde cura illud cum unguētis, donec sanetur.

Si autem corruptio iam imprimit in os, tunc oportet ut incidas illud os, & extrahas ipsum: non enim sanatur unquam dum permanet in eo corruptū. Quod si uides corrosionem & corruptionē incēdere in digitum, tunc incide eum in uno nodorum, secundum quod præmissa est eius rememoratio. Deinde cura ipsum, donec sanetur. Si autem accidat ungui attritio, aut percussio: et contingit in ea dolor uehemens, tunc oportet ut phlebotomes infirmū in primis. Deinde seca unguem cum

B

Panaritium.

C Spatūmili acuto sectione transuersa de sursum ad uisum. Et custodi, ne sectio perueniat ad carnem quæ est sub ungue. nam tu facies accidere per illud super infirmū. dolorem uehementem, & erit causā ad natiuitatem carnis additæ in loco. Deinde cura locum cum eo quod sedat dolores. Digitus uero additus qui nascitur in quibusdam manibus hominum, fortasse est carnosus totus: et fortasse sunt in quibusdam eorum ossa, & fortasse est in eo unguis: et quidam eorum nascitur in radice iuncturæ, aut est natiuitas eius in quibusdam nodis digiti. Ille ergo qui nascitur in quibusdam nodis digiti, non mouetur: & ille qui nascitur apud iuncturam digiti, fortasse mouetur. Eius ergo qui ex eis est carnosus, sectio eius facilis est. Quod est, ut incidas ipsum apud radicem suam cum Spatūmili lato. Eius autem cuius natiuitas est in radice iuncturæ curatio, est difficilis. abstine ergo ab incisione eius. In illo uero qui nascitur in digito apud ultimū nodorum, tunc oportet ut incidas in primis carnem eius incisione rotunda usq; ad os. Deinde serra os cum una illarum Serrarum conuenientium ad illud. Deinde cura ipsum, donec sanetur.

Consolidatio autem quæ accidit digitis adinuicem, multotiens accidit aut ex natiuitate hominis, id est, nascitur cum eo, aut a consolidatione uulneris, aut combustionē ignis, & similibus. Oportet ergo ut seces illam consolidationem, donec redeant digiti secundum formam suam naturalem. Deinde pone inter eos licinia, aut pannos infusos in oleo rosato: ut non consolidentur uelociter, & separa inter eos: aut pone inter eos laminā plumbi subtilem, donec consolidetur locus secundum quod oportet. Et similiter si accidat consolidatio quibusdam digitis cum palma, tunc seca illam consolidationem, secundum quod præparatur, & conuenit figuræ membri.

¶ De incisione Vitium.

Caput xcii.

Vites.

VITES sunt Venæ inuolutæ, grossæ, plenæ superfluitatibus melancholicis quæ accidunt in pluribus membris corporis: & plurimū euentus earum est in cruribus, præcipue in cruribus iter agentium & laborantiū, et portantium. Oportet ergo ut administres excussionem corporis ex cholera nigra aliquotiens excussione forti. Deinde phlebotoma patientis eas basilicam. Curatio uero earū cum ferro, est secundum duos modos. Vnus eorum est, ut secentur, et extrahatur sanguis niger. Et modus alter est, ut eleuetur Vena, & extrahatur tota.


sectio uero eius est secundū hunc modum. Embroca crus in primis cum aqua calida multum, donec resoluatur sanguis grossus seculentus. Deinde stringe crus infirmī a superiori parte coxæ eius, usq; ad inferiorem partem genu cum uitra. Deinde seca uenam in loco uno, aut duobus, aut tribus sectione ampla. Deinde eleua, id est, extrahe sanguinem in manu tua ab inferiori parte cruris, usque ad sursum, & a superiori oportet ut phlebotomes infirmū in primis. Deinde seca unguem cum

usque inferius: donec egrediatur ex sanguine quantitas quam uides sufficere, & quam tolerat uirtus infirmi. Postea liga eam: & præcipe ei, ut abstineat a cibis generantibus choleram nigram: & itera euacuationem & phlebotomiam, quando implentur Venæ, et nocet illud infirmo.

Eleuatio autem eius est secundum hunc modum. Rade crus infirmi, si in ea sunt pili multi. Deinde intromitte ipsum in balneum: aut embroca ipsum in crure eius cum aqua calida, donec rubeat, & exuberentur Venæ: aut exercitetur exercitio forti, si non est ei præsens balneum, donec calefiat membrum. Deinde seca cutem in directo uenæ sectione per longitudinem: aut in ultimo eius apud genu, aut in inferiori parte eius apud calcaneum. Deinde aperi cutem cum uncinis, et excoria uenam ab omni parte, donec appareat sensui: & est apud apparitionem eius, quod uides eam rubeam ad nigredinem decliuem. Cum ergo uadit ex cute, uides eam albam quasi sit chorda. Deinde intromitte sub ea Radium, donec quando eleuatur & egreditur de cute: suspende eam cum uncino cæco, leni. Deinde seca sectionem aliam prope illam sectionem tribus digitis. Deinde excoria cutem a superiori parte uenæ, donec appareat. Deinde eleua eam cum Radijs sicut fecisti, et suspende eam cum uncino alio, sicut fecisti in primis. Deinde seca sectionē aliam, aut sectiones plures, si indiges illo. Deinde eleua, & incide ipsam ultima sectione apud calcaneum. Deinde extrahe eam ad sectionem quæ est supra eam. Et fac illud, donec extrahas eam ex sectione quæ est superior, uel altior sectionibus omnibus, donec quādo egreditur tota: tunc incide eam. Si autem non obedit tibi ad extrahendum, et eleuandum: tunc intromitte acum, cum filo forti duplo, & liga eam, et extrahe ipsam: aut intromitte sub ea Radium: et reuolue manum tuam ad omnem partem, donec egrediatur. Et caue, ne incidatur. nam si incidatur, fit difficile tibi eleuare eam ualde, & ingreditur super infirmum ex ea nocumentum. Cum ergo extraxeris eam totam: tunc pone super locum uulnerum lanam submersam in uino & oleo rosato, aut oleo: & cura ipsum, donec sanetur.


Quod si Vitis est contracta, habens tortuositatem cui sit inuolutio ad partes, & non est sicut diximus secundum rectitudinem: tunc oportet ut findas super eam ad omnem partem tortuositatis eius, & loca inuolutionis ipsius. Deinde suspende eam cum uncinis, donec eleues eam totam: & caue apud sectionem tuam super eam ne incidas uenam, aut uulneres: nam difficile fiet super te eleuare, uel extrahere eam. Conserua ergo prudentiam tuam.

Forma Incidentis quo sanatur Vitis.



C

Forma Vincini cæci.



Non est ei curuitas sicut reliquis Vincinis, neque est acutæ extremitatis, ut non uulneret uenam: & est grossæ flectuositatis, lenis: quoniam si esset subtilis, incideret uenam subtilitate sua: imo sit ei superflua grossitudo, sicut diximus.

H De extractione Venæ cruris. Caput XCIII.

HABET Vena generatur in cruribus in terris calidis, sicut Alizegi, & terra Arabum, et in terris aridis, calidis, pauca teneritatis, id est, in quibus non nascitur herba, neque arbor. Et fortasse generatur in locis alijs corporis præter crura. Et generatio quidem eius est a putrefactione quæ accidit sub cute. sicut accidunt intra corpora serpentes & uermes ascarides, et uermes generati inter cutem & carnem. Et signum incæptionis euentus huius Venæ est, quod accidit in crure inflammatio uehemens. Deinde uesticatur locus. Deinde incipit Vena exire ex loco illius uesticationis, quasi sit radix plantæ, aut animal. Cum ergo apparet ex ea extremitas eius, tunc oportet ut inuoluas super ipsam frustum plumbi, cuius pondus sit ex drachma keil, usque ad drachmas. II. & **D** nodas ipsam: et dimitte plumbum suspensum ex crure. Quoties ergo egreditur ex ea aliquid ad exteriora, inuolue illud in plumbo, & nodas illud. Quod si prolongatur multum, tunc incide partem eius, & inuolue residuum. Et non incidas eam radicitus antequam egrediatur tota. quoniam si incidis, contrahitur, & ingreditur in carnem: et facit accidere apostema, & putredinem in loco, & ulcus malum. Quapropter oportet, ut suauiter tractetur, & extrahatur paulatim, donec egrediatur ex ultimo sui, & non remaneat ex ea aliquid in corpore: & ex hac quidem Vena egreditur in quibusdam hominibus quod est in longitudine sua quinque palmarum & decem. Et iam peruenit ad me, quia exiuit uiro ex. xx. palmis.

Si autem inciditur tibi in hora medicationis tuæ: tunc intromitte radium in foramine eius, & perfora eam foramine longo, cum corpore, donec euacuetur totum quod est in ea ex materia: & administra putrefactionem loci cum medicinis diebus aliquot. Deinde cura ipsum curatione apostematum. Et hæc quidem Vena quandoque habet ramos multos, præcipue quando apparet in iunctura pedis, aut in pede ipso: & accidunt ei orificia multa, & egreditur ex omni orificio ramus. Cura ergo ipsam, sicut diximus in diuisione, & cum eo quod præmissum est.

De sectione super Vermes generatos sub cute, & dici-

tur Aegritudo bouina.

Caput XCIII.

A

HAE C Aegritudo nominatur in quadam terra apud nos Aegritudo bouina: propterea, quia multotiens accidit bouibus, & est uermis paruus unus, qui nascitur inter cutem & carnem. Et uadit in corpore toto, ascendendo & descendendo: et ostenditur sensui apud ambulationē eius de membro ad membrum, donec disrumpit ubicūq; disrumpit in cute locum, & egreditur. Et generatio eius est ex putredine quorundam humorum. Sicut accidunt uermes & serpentes, id est, lumbrici, & ascarides in uentre. Et timetur ex malicia eius. Quia quādo ipse uadit in corpore, & eleuatur ad caput, et peruenit ad locum: tunc fortasse aperit in eo, & egreditur, et destruit oculum: & accidit illud multotiens.

Aegritudo bouina.

Cum ergo uis curare eum, & extrahere ipsum, tunc non fit illud nisi apud ambulationē eius, & apparitionem ipsius sensui. Oportet ergo, ut stringas quod est supra eum, & quod est sub eo cum ligamento constrictione forti. Deinde seca super ipsum, & extrahe eum. Quod si profundatur in carne, & non inuenis ipsum: tunc pone super locum cauterium cum igne, donec moriatur. Et maius quod timeſ, est corruptio eius, quae corrumpit oculū, sicut diximus. Si autē uides eum iam peruenisse in capite prope oculum, tunc stringe sub eo supercilium strictura bona. Deinde seca super ipsum, & extrahe eum. Et oportet, ut utat infirmus mundificatione sui corporis, cum medicinis soluentibus humores putridos. **B** malos. Et caueat sibi a cibis generantibus putrefactionem.

¶ De sectione super aegritudinem Nakir.

Caput

XCV.

HAE C aegritudo nominatur in terra nostra Nakir: & est dolor Nakir. qui accidit in quibusdam membris: deinde permutatur de membro ad membrū. Et ego quidem iam uidi ipsum, secundū quod narro tibi. Vocatus sum ad mulierem infirmā in quibusdam uillis. Et detexit brachium suum, & uidi inflationē paruam in uena funis brachij. Et postquam remansi hora una, uidi unam inflationem incedere cum focili, sicut incedit uermis, ascendendo ad humerū eius uelocius quam esse potest: ut sit sicut argentum uiuū, quando currit de loco ad locum. Recessit ergo dolor ex illo loco, & fixus est in humero. Deinde sedi hora una, et cucurrit in reliquum corpus, donec perueniret in brachium aliud. Deinde narrauit mihi, quia reuoluebatur in toto corpore suo, secundū quod uidi. Miratus sum ergo de uelocitate permutationis eius de membro ad membrum. Et ego quidem ante illud non uideram hanc aegritudinem oculis meis taliter secundū hunc modum. Verumtamen uidi multos, qui inueniunt dolorem permutari de membro ad membrum: et non uidi ipsum oculis, sicut uidi eum in muliere. Et ego non cogito illud esse, nisi quod est propterea, quod mulier fuit ex illis qui sunt ex uillis siccī corporis de

C tectiarum uenarum: hinc ergo apparet sensui illa uentositas permutata: Et est necesse, ut non appareant secundū hanc rationē in illis qui sunt de liciosi, & corporibus humidis, occultarū uenarum. Cum ergo uis curationem eius, et sentit patiens illud dolorem: tunc si est apparens tibio: culo, sicut diximus, tunc stringe supra ipsum, & sub ipso uelociter: et se ca supra ipsum, donec egrediatur illa uentositas cōartata: & cauteriza lo cum. Si autē non uides ipsum oculis tuis: tunc cura ipsum cum excussione corporis, & cum eo quod expellit uentositates, et carminat eas cum pillulis foetidis, & pillulis de serapino, & similibus:

S De extractione Sagittarum. Caput. xcvi.

Sagittarum
uarietas.

SAGITTAE diuersificantur secundū species suas, & secundū loca in quibus cadunt ex corpore. Earum uero diuersitas est: quoniam ex eis sunt quæ habent cuspides magnos, & paruos: et concauæ, & surdæ. Et ex eis sunt quæ habent tres angulos. Et ex eis quibus sunt linguæ. Et ex eis quibus sunt astellæ. Illæ uero quæ sunt secundū membra in quibus cadunt, est secundū duos modos. Aut enim mēbra sunt ex membris principalibus concauis, sicut cerebrum, & cor, et epar, & pulmo, et renes, & intestina, et uelica, & eis similia. Quando ergo cadit in aliquo horū membrorum, & apparent tibi signa mortis, quæ ego narro tibi post, tunc oportet ut deuites extractionē illius sagittæ ex eis. nam mors consequitur illum in quo est, in pluribus dispositionibus. Et quando non apparent tibi ista signa mala, & sagitta non est absconsa in profunditate membri, tunc extrahe ipsam, & cura uulnus. Ex signis enim cerebri quando cadit in eo sagitta, & penetrat os, et egreditur li phac quod est super cerebrum, est: quoniam accidunt ex illo soda uehemens, & scotomia, et uertigo, & rubedo in oculis, & inflatio, & rubedo linguæ, et spasmus, & permixtio intellectus, et uomitus cholera. Et fortasse egreditur sanguis ex naribus, aut auribus. Et fortasse abscinditur sermo, & destruitur uox. Et egreditur ex loco uulneris humiditas alba similis pului. Et exit ex eo simile aquositati carnis. Si ergo apparent tibi ista signa, tunc abstine a curatione, et extrahe sagittam si non egreditur.

Signa sagittæ
infixæ Cerebro.

Cordi.

Signa autem sagittæ quando cadit in corde, sunt: quod ipsa est prope mammillam sinistram: & sentit cum ea quasi ipsa sit fixa in re dura, non in re uacua. Et fortasse sagittæ est motus similis motui pulsus: & currit ex uulnere sanguis niger. Et sequitur illud frigus extremitatum, & sudor frigidus, & syncopis. Scias ergo, quod mors descendit proculdubio. Et signum sagittæ quando uulnerat pulmonem, est exitus sanguinis spumosi ex uulnere: & uasa quæ sequuntur collum, apostemantur, & mutatur color infirmi. Et expirat spiritum magnū, altum: et querit attractionem aeris frigidi. Quod si cadat sagitta in uelamen, quod est in pectore: tunc est prope costas paruas: et sit anhelitus magnus cum dolore uehementi, cum suspirio: & mouentur omnia membra humero:

Pulmoni.

Uelamini
pectoris.

¶ Typus extractionis Sagittarum diuer-
simode infixarum.



- C** rum. Et si cadat sagitta in stomachum, tunc fortasse egreditur ex uulnere ex cibo aliquid indigestum. Et si cadit sagitta in Ventrem, & figitur in eo: egreditur aliquid stercoreis ex uulnere, aut zibum, aut intestinū quod iam disruptum est. Non est ergo spes in curatione eius, neque in extractione sagittæ. Quod si sagitta cadat in Vesicam, & egredietur urina: & procedit ex ea aliquid ad exteriora, et fortior sit dolor super infirmum: tunc scias, quia est mortale. Reliqua autem membra, sicut facies, & collum, et guttur, & spatula, et adiutorium, & spondiles dorsī, et furcula, & coxa, et crus, & eis similia ex membris saluantur secundum plures dispositiones: quando non inuenit sagitta arteriam, aut neruum: et non est sagitta uenenosa. Et ego narro tibi quod uidi de esse harum sagittarum, ut significes per illud super curationem tuam.
- Experimenta** Quod est, quia cuidam uiro cecidit sagitta in lachrymali oculi eius, in radice nasi. Extraxi ergo eam ipsi ex parte altera, sub adipe auris eius: & sanatus est, et non accidit ei in oculo eius nocumentum. Et extraxi sagittam aliam Iudæo, quæ cecidit ei in adipe oculi sui sub palpebra inferiori: & sagitta iam occultata erat, et non consecutus sum ex ea nisi extremitatem paruam eius, cum qua adhæret in ligno suo: & erat sagitta magna ex sagittis arcuum Turcorum, cum ferro leni, in qua non sunt aures. Sanatus est ergo Iudæus, & non accidit in oculo eius accidens malum.
- D** lum. Et extraxi sagittam aliam ex gutture Christiani. Et erat sagitta arabica, & est illa cui sunt aures. Secui ergo super ipsam inter duas guis degi: & iam submersa erat in gutture eius. Subtiliatus sum ergo cum ea, donec extraxi eam: & sanatus est Christianus. Et extraxi sagittam aliam uiro quæ ceciderat in uentre eius: & cogitauimus, quia moreretur ex ea. Postquam ergo præterierunt ei triginta dies, & non mutatum est super eum aliquid ex dispositionibus eius, secui super sagittam: & ingeniaui super eam, & extraxi eam: et sanatus est, & non accidit ei accidens malum. Et uidi uirum cui cecidit sagitta in dorso eius, et consolidatum est uulnus super eam. Postquam ergo fuit post septem annos, exiuit sagitta in radice coxæ eius. Et uidi mulierem cui cecidit in uentre suo sagitta, & consolidatum est uulnus super eam, & remansit sagitta intra ipsam: & non mutata est ex dispositionibus eius aliqua, & mulier non inuenit ei nocumentum in aliqua ex operationibus suis naturalibus. Et uidi uirum alium, cui cecidit sagitta in facie sua: & consolidatum est uulnus, & remansit, non inueniens ei multum dolorem: & similia istis multa. Et extraxi sagittam uiro ex principibus Regis, quæ ceciderat ei in medio nasi sui, et iam declinauerat ad partem dextram parumper: & occultata erat sagitta tota. Vocatus sum ergo ad curationem eius post casum sagittæ usque ad tres dies. Inueni ergo uulnus sagittæ strictum ualde. Inquisiui ergo eam cum tenta subtili, & non sensi eam: & ipse quidem inueniens

bat punctiōem & dolorem sub aure sua ex parte dextra. Speravi ergo, **A**
 quod erat illa punctiō ex extremitate sagittæ. Emplastravi ergo locum
 cum emplastro in quo erat uirtus attractiua, & digestiua, cōfidens apud
 me, quod apostemaretur locus, & appareret mihi signum sagittæ, ut se-
 carem super eam: & non accidit in loco accidens significans quod sagit-
 ta consecuta sit locum. Assiduauī ergo cum emplastro super eum die-
 bus multis: & non accidit accidens, et consolidatum est uulnus inter-
 im: & remansit infirmus de extractione eius spacio dierum, donec sensi
 sit sagittam die quodam intra nasum suum. Et narrauit mihi illud. Pos-
 sui ergo super illud uulnus medicinam acutam, corrosiuam diebus mul-
 tis, donec apertum est: & cum tenta tentauī ipsum, et sensi extremita-
 tem sagittæ subtilem quæ adhæret in ligno. Deinde addidī in apertū
 one uulneris per illam medicinam acutam, donec apparuit nobis uisibi-
 liter extremitas sagittæ: & præterijt mihi cum eo spaciū temporis
 circiter quatuor menses. Deinde postquam amplificatum est uulnus, &
 possibile fuit mihi intromittere forcipes in ipsam, & mouere ipsam, &
 non obediuit ad exitum: tunc non cessauī subtiliare, & ingeniare super
 eam cum modis ingeniorum, donec cœpi super eam die quodam cum
 forcipibus decenter factis, secundum quod ueniet forma eorum in fine
 capituli, donec extraxi eam. Deinde restauraui uulnus. Et medici quid-
 em iudicant, quod cartilago nasi non restaurat. Restaurauī ergo ipsam, **B**
 & consolidatum est uulnus, et sanatus est infirmus sanitate integra: nec
 nocuit ei aliquid omnino. Et ego narro tibi qualitatem extractionis
 quarundam sagittarum: ut ponas illud regulam & significationem su-
 per illud quod non dixi. quoniam partes huius artis & distinctiones ea-
 rum non comprehenduntur cum narratione: neque comprehendit il-
 lud liber, & artifex prudēs comparat cum paucis super multum: et cum
 eo quod est præsens, super illud quod est absens: & inuenit operatio-
 nem nouam, et instrumentum nouum apud descensus rerum extranearum
 huius artis quando accidunt. Dico ergo, quod sagittæ non egre-
 diuntur ex membris quibus sunt fixæ, nisi secundum duos modos. Aut
 per attractionem ex loco ex quo intrauit. Aut contrario partis alterius.

Modi duo ex-
tractionis Sa-
gittarum.

Et illa quæ egreditur unde intrauit, aut est sagitta procedens in loco
 carnoso: & attrahitur, et egreditur. Quod si non obedit ad exitum ex ho-
 ra in qua cadit: tunc oportet ut dimittas ipsam aliquot diebus, donec
 putrefiat caro quæ est in circumitu eius: & alleuietur attractio eius, &
 eius egressio. Et similiter si figitur in osse, & non obedit tibi ad exitū,
 tunc dimitte ipsam etiā aliquot diebus: & itera eam cum attractione &
 mōdōne omni die, donec egreditur. Quod si non obedit tibi ad exitum
 post dies, tunc oportet ut perfores in circumitu sagittæ in ipso osse ab
 omni parte cum terebro subtili, donec amplificentur sagittæ. deinde at-
 trahe eam, & extrahe ipsam. Si autem sagitta est fixa in capitis osse, &

C iam processit in uno uentrium cerebri, & apparent ex infirmo quædam illorum accidentium quæ dixi: tunc abstine ab attractione sagittæ, et dimitte eam, donec æquetur esse eius post dies. Nam si sagitta peruenit ad sisach, tunc mors non prolongatur ei. Et si sagitta non est fixa, nisi in corpore ossis tantum, & non penetrat usque ad sisach: & remanet infirmus aliquot diebus, & non accidit ei ex illis accidentibus aliquid: tunc ingenia in attractione sagittæ & extractione eius. Si autem est fixa ualde, & non obedit tibi ad attractionem: tunc administra terebella in circumitu sagittæ, sicut narraui tibi: deinde cura locum, donec sanetur.

Si autem Sagitta iam absconsa est in loco corporis, & occultatur & absconditur a sensu: tunc inquire eam cum tenta. Si autem sentis eam, tunc attrahe eam cum quibusdam instrumentis quæ conueniunt attractioni eius. Si autem non potes super eam, propter constrictionem uulneris, & propter longitudinem sagittæ in profundo: & non est illic os, neque neruus, neque uena: tunc finde super eam, donec amplifietur uulnus, & sit possibile extrahere sagittam. Quod si sunt ei aures quibus teneatur, tunc libera carnem fixam in eis ab omni parte, omni ingenio quo potes illud, & ingenia, si non potest super euasione carnis in fractura aurium, & contorsione earum, donec euadat.

Cautelæ.

D Et tu quando adminstras extractionem Sagittæ, in quocumque loco est, tunc utere contorsione manus tuæ, cum forficibus ad partes omnes, donec facias eam euadere: & subtilia ultima subtilitate, ut non frangatur Sagitta, & fiat difficilis tibi attractio eius, & ipsius extractio. Quod si non potes super eam ex hora una, tunc dimitte eam diebus aliquot, donec putrescant quæ sunt in circumitu eius, deinde itera eam: alleuietur enim tunc. Si uero contrarietatem tibi facit fluxus sanguinis, tunc administra quod diximus ex curatione in capitulo suo: & custodi uirtutem tuam ab incisione uenæ, aut nerui, aut chordæ. Et administra ingenium omni modo quo tibi possibile est euasione Sagittæ: & sit illud cum facilitate, & tranquillitate, uel tarditate, & firmitate, sicut narraui tibi. Et oportet, ut facias cum trahis Sagittam, ut infirmus sit secundum figuram, secundum quam fuit apud casum Sagittæ in ipso. Quoniam est magis iuuatium. Si autem non est tibi possibile illud, tunc administra quod tibi est possibile ex figuris. Sagitta autem quæ egreditur ex contrario partis alterius, aut iam procedit ex ea aliquid ad exteriora: aut facit gibbositatem extremitas Sagittæ per sensum ex superiore parte cutis propinquæ, & uides eam eminentem: seca ergo super eam, & sit sectio secundum quantitatem quod capiant in ea forcipes. Deinde attrahe eam: ipsa namque sit facilis ad exitum. Si uero retinetur in osse, tunc torque manum tuam secundum rotunditatem, donec imprimat Sagitta in osse, & amplifiet sibi ipsi: deinde trahe ipsam. Et si non: dis-


mitte eam diebus aliquot: deinde itera eam, donec egrediatur.

A

Quod si lignum Sagittæ est in ea, tunc impelle ipsam cum eo. Si autem cecidit lignum, & uis administrare impulsione: tunc intromitte ad eam instrumentum concauum, ut ingrediatur concauitas eius in caudam Sagittæ: deinde impelle eam cum ipso. Si autem Sagitta est concaua, tunc impelle eam cum instrumento intrante in ipsam. Sagitta enim alleuiatur per illud. Quod si Sagitta est toxicata, tunc oportet, ut concaues carnem totam, in qua est uenenum: si est tibi possibile. illud. Deinde cura eam cum eo quod conuenit ad illud.

Quod si Sagitta est cadens in pectore, aut in uentre, aut in uesica, aut in latere: & est propinqua ex eo quod tangis cum tenta, & possibile est tibi secare super eam: tunc seca, & caue ab incisione uenæ, aut nerui, & extrahe eam. Deinde fue uulnus, si uides, & cura illud, donec sanetur.

Et hæc est forma Forcipum, quibus extrahuntur Sagittæ.




B

Sint extremitates similes rostro auis, quæ factæ sunt sicut ferra: quando capiunt super Sagittam, non dimittunt eam. Et fiunt ex eis species multæ, magnæ, & paruæ, & mediæ, secundum quantitatem magnitudinis Sagittæ, et paruitatis eius, & amplitudinis uulneris, et constrictionis eius.

Forma Impellentis concaui.



Et forma Impellentis furdi.




Hoc est furde extremitatis sicut Radius, ut alleuietur introitus eius in sagittam concauam, & impellatur cum eo. Huius extremitas impellentis concaue est concaua sicut penna auis: ut alleuietur introitus sagittæ in ipsam & impulsio eius.

¶ De phlebotomia Venarum. Caput xcviij.

VENÆ phlebotomandæ, quarum cucurrit consuetudo in corpore, sunt triginta. Ex quibus in capite sunt sexdecim: duæ Venæ pulsatiles, quæ sunt post aures, dictæ duæ Herbæ: & duæ Arterię, quæ sunt in duobus temporibus apparentes: et duæ Venæ quæ sunt

¶ Typus Venarum corporis hu-
mani phlebotomandarum.



in duobus lachrymalibus duorum oculorum, quæ dicuntur *Aspicientes*: & *Vena præparata* in medio frontis: et uena quæ est in extremitate nasi. Et duæ *Guidegi*, quæ sunt in collo. Et duæ uenæ quæ sunt in labio superiore oris. Et duæ uenæ quæ sunt in labio inferiore. Et istæ sunt uenæ quæ dicuntur *Algecherich*. Et duæ uenæ quæ sunt sub lingua.

Venæ autem quæ phlebotomantur in brachijs, sunt quinque uenæ in omni brachio. Vna earum est *Cephalica*, et est ex latere syluestri: & nominat eam uulgus uenâ capitis. Et *Fusca*. Et est *Mediâ* uena, & est composita ex ramo *Basilicæ*, et ramo *Cephalicæ*: & nominat eam uulgus uenam corporis. Et *Basilica*, & est posita in latere domestico: et nominatur etiam *Tiullicaris*. Et nominat eam uulgus uenam uentris. Et *Funis brachij*, et est posita super focile: & est illa in qua phlebotomatur, et est illa quæ apparet supra pollicem apparitione manifesta. Et *Saluatella*: & est uena quæ est inter annularē & minimū: et sunt ei duo rami. Et in crure & in pede sunt tres uenæ. Vna earū est quæ est sub pollicis curuaturâ ex latere syluestri. Et secunda est *Saphena*: et locus eius est apud calcaneum ex latere domestico. Et uena *Nesse*: et locus eius est apud calcaneum ex latere syluestri. Et in crure alio sunt tres uenæ similes illis.

¶ De phlebotomia duarum uenarum post Aures.

Phlebotomiæ uero duarū uenarum quæ sunt post Aures, iuuamentum est, ad catarros antiquos, & hemigraneam, et *sahafati*, & ulcera capitis mala antiqua. Et qualitas phlebotomandi eam est secundum quod narro. Et est, ut radatur caput infirmi: et fricetur occipitium eius in loco duarum uenarum cum panno aspero frictione bona. Deinde stringat infirmus collum suū cum uitta, donec appareant duæ uenæ. Et loca earum sunt post Aures in duobus locis depressis capitis. Quare ergo eas digito tuo, et ubi sentis pulsum earum sub digito tuo, illic signa cum encaustro. Deinde accipe phlebotomum cultellarem, & est ille qui dicitur *Incidens*, deinde intromitte ipsum sub uena in cute, donec perueniat phlebotomus ad os. Deinde eleua manum tuam cum uena & cute ad superiora, & incide uenam cum cute incisione incidente. Et sit longitudo incisionis quantitas duorum digitorum iunctorum, aut circiter illud: & fac exire ex sanguine quantum uis. Deinde stringe eam cum puluillis, & dimitte eam, donec sanetur. Et iam præcessit in principio libri incisio earum, & ipsarum cauterizatio.

¶ De phlebotomia duarum Arteriarum in temporibus.

Duarum uero Arteriarum quæ sunt in duobus temporibus phlebotomiæ iuuamentum, est ad hemigraneam antiquam: et sodam prauam, & obthalmiam assiduam: et cursum superfluitatum effusarum acutarum ad oculos. Et qualitas phlebotomandi eas est secundum quod narro tibi. Stringat infirmus collum suum multum, donec appareant duæ uenæ sensui apparitione manifesta: & demonstretur pulsus earum sub digito

Cephalica.

Fusca.

Mediana.

Basilica.

Funis brachij

Saluatella.

Saphena.

Nesse.

B


.d. .e.

C tuo. Tunc enim signa cum encaustro. Deinde eleua cutem desuper uenam ad superiora cum digito tuo indice, & intromitte phlebotomū incidētem desubtus, & eleua uenam ad superiora. et incide eam, sicut fecisti in duabus uenis alijs: & fac currere ex sanguine secundum quantitatem necessitatis tuæ. Deinde solue cōartationem infirmi, & pone digitum tuum super uenam hora una. Postea pone super ipsam cotum & puluillos, & stringe ipsum desuper constrictione fortis: et dimitte ipsam, donec sanetur. Et iam præcessit rememoratio earum, et ipsarum incisio, & earum extractio in principio libri.


¶ De phlebotomia uenę frontis post phlebotomiā Cephalicā.

a. Iuuamentum uero phlebotomię uenę frontis est post phlebotomiā Cephalicā, ad ægritudines faciei antiquas: & ad hemigranēam, et rubedinē: & ulcera fœda. Et qualitas phlebotomię eius est, secundum quod narro tibi. Cōartet infirmus collum suum cum uitta, donec appareat uena. Deinde accipe instrumentum quod nominatur Fossorium. Cuius hæc est forma.

Fossorium.



Aliud.



D Pone acumen eminens quod est in capite Fossorij super ipsam uenam, & percutē super ipsum cum pectine, aut cum re alia in modo eius: & dimitte sanguinem currere secundum quantitatem quam uis. Deinde solue perforationem infirmi, & stringe eam, donec sanetur. Et quandoq; aperitur cum phlebotomo lato. Verumtamen non oportet, ut sit phlebotomus acutę extremitatis, sicut reliqui phlebotomi, imo sit latę extremitatis. Et phlebotoma eam secundum transuersionem: quoniam os est propinquum: & fortasse in eo frangetur phlebotomus quando est subtilis.

¶ De phlebotomia Venarum in duobus Lachrymalibus.

a. Iuuamentum autem duarum Venarum quę sunt in duobus Lachrymalibus duorum oculorum, est ad oculum ex scabie & rubedine: & sabel in oculo, & ægritudinibus faciei. Et qualitas phlebotomię earum est, ut stringat infirmus collum suum cum uitta. Deinde phlebotoma eas: & tu sis stans super caput eius. Et fiat phlebotomia secundū transuersum ad longitudinē parum, cum phlebotomo paruo, lato parumper. nam in loco non est caro. Si enim phlebotomus est subtilis extremitatis, fortasse frangitur. Deinde fac currere ex sanguine quantum est tibi necesse. Et pone super eas cotum, & stringe eas nocte una, & solue eas.

¶ De phlebotomia uenarum Nasi.

Venæ autem Nasi phlebotomia, est conferens ad febrem acutam, & sordam uehementem, & ægritudines faciei, sicut hemigraneam, & rubedinem quæ accidit in facie: præcipue quando est antiqua. Et qualitas phlebotomiæ eius est, ut stringat infirmus collum suum. Deinde tene nasum eius manu tua sinistra, & accipe phlebotomū subtilem, longum: & fige eum in medio leporis ipsius, inter illud quod distinguit nasum secundum rectitudinem. quoniam uena non apparet sensui illic, & quia sanguis incipit fluere statim. Et oportet, ut ultimes manum tuam cum phlebotomo parumper: & facias currere ex sanguine secundū necessitatem tuam. Deinde liga ipsam nocte una, ipsa enim restauratur uelociter.

¶ De phlebotomia uenarum Guidegi.

Duarum uero Guidegi phlebotomiæ iuuamentū, est ad constrictionem anhelitus, & incæptionem lepræ, et ægritudines melancholicas, & impetiginem, et ulcera mala, & corrodentibus, id est, herpetibus estio-
menis. Et qualitas phlebotomiæ earū est ut stringat infirmus sub utrisque in collo suo cum ligamēto: & stet artifex super caput infirmi, et infirmus sit sedens super sedem. Deinde phlebotoma uenam ad longitudinem phlebotomia ampla parumper. Deinde extrahe ex sanguine quantitatem temperatam, aut secundum illud quod uides ex necessitate quæ est ad illud. Deinde fac similiter de uena alia. Postea solue ligamentum, & stringe duas uenas strictura media: ut nō præfocetur infirmus. Et dimitte eam usque mane. Sanatur enim uulnus.

¶ De phlebotomia uenarum Algeberich.

Venæ autem Algeberich phlebotomiæ iuuamentum est: quia confert ad alcolam in ore, & corruptionem gingiuæ: & ulcera mala: et fissuras labiorū, & plcera mala, etiam quæ sunt in naso, & in circumitu eius. Et qualitas phlebotomiæ earum est, ut facias sedere infirmum coram te: & stringe collum eius cum uitta. Deinde reuolue labium eius, & aspice ad duas uenas: quarum una est a dextera labij, & secunda a sinistra eius: & demonstratio utriusque est per nigredinem ambarum. Et illud uerum est: quia in circumitu earum sunt uenæ minutæ, nigre. Incide ergo utramque incisione incidente. Si autem dubitatio est super te, & non scis quæ earum est: tunc intende ad incisionem maioris earum, & ipsarum manifestiorem. Et similiter fac de duabus uenis quæ sunt in labio superiore: et plurimum quidem currit consuetudo cum eo: & incide duas uenas quæ sunt in labio inferiori.


¶ De phlebotomia Venæ sub lingua post Cephalicæ phlebotomiā.

Duarum uero Venarū quæ sunt sub lingua phlebotomiæ iuuamentum: est, qd phlebotomia Cephalicæ est ad præfocationes quæ sunt in gutture, & ægritudinem uulvæ, et ægritudines oris. Et qualitas phlebotomandi eas est, ut sedeat infirmus inter manus tuas coram sole: & eleua

C linguam eius, & aspice sub lingua a latere eius uno uenam, & a latere eius alio uenam: & color utriusq; decliuus ad nigredinē. **Phlebotoma** ergo utraq; et custodi; ne ultimes manū tuā in phlebotomando eas. Nam sub eis sunt arteriæ, & fortasse accidet fluxus sanguinis ex illis arterijs.

¶ De tribus Venis in cubito.
.bb. Venæ autem tres quæ phlebotomantur in cubito, sunt in quarum phlebotomia cucurrit consuetudo in omnibus hominibus. Et phlebotomia earum fit secundum duos modos. Aut pungendo cum phlebotomo myrtino lato: aut oliuari ad subtilitatē decliuui: aut secando cum phlebotomo cultellari, & est **Alnefil**. Et hæc est forma eius.

Alnefil.




Sic **Alnefil** est, quod cōuenit ad sectionem. Et ex eis sunt species lata, & subtiles, secundū amplitudinem uenarum & stricture earum.

Forma phlebotomi myrtini.



Forma phlebotomi myrtini sit lata, sicut uides. Et conuenit ad aperientdas uenas concauas, plenas, procedentes, apparentes, grossas, & illas quæ continent sanguinem grossum, turbidum.

Forma phlebotomi Oliuari.



D Etiste phlebotomus est minoris latitudinis, & subtilioris extremitatis. Et conuenit ad phlebotomiam uenarum subtilium, quæ continent sanguinem subtilem citrinum.

¶ De phlebotomia Basilicæ.

.y. Basilicæ autem quæ est una harum trium uenarum phlebotomiæ iuuamentū est. Quia extrahit sanguinem ex ægritudinibus quæ sunt sub gutture & collo, ex eo quod sequitur pectus, et uentrem: et cōuenit phlebotomatori cum phlebotomat eam, ut caueat, & sit super timorē ex ea, nam sub ea est arteria. Si ergo errat, & addit in punctura phlebotomi, incidet illam arteriam, et accidet fluxus sanguinis. Quapropter oportet, ne phlebotomet eam cum phlebotomo pungente: imo sit secans cum **Alnefil**. Quod si non appareat Basilica apparitione manifesta, tunc oportet, ut alienes ipsam, & permuteris ad aliam, aut quæras aliquem raram eius: aut phlebotomes loco eius **Funem brachij**, ipsa enim est manifesta, & seca eam cum phlebotomo **Anesil**, sicut diximus. Si autē uis phlebotomiam ipsius eiusdem, tunc oportet ante stricturem brachij, ut tangas locum, donec cognoscas locū pulsus. Deinde signa super locum cum encaustro, postea brachium, & seca uenam sectione concaua cum phlebotomo **Alnefil**, sicut diximus. Et caue ne cadat percussio per spa-

cium a loco arteriæ. Et quando uides, cum tu stringis ligamen, inflatio- **A**
nem in loco quem signasti cum encaustro, tunc illa inflatio est inflatio
arteriæ: deuita ergo eam. Quod si uides sanguinem apud phlebotomiam
salire, sicut urina pueri, & est sanguis subtilis, rubeus: tunc scias,
quia est ex sanguine arteriæ. Tunc ergo propera, et pone digitum tuum
super ipsum spacio longo. deinde aufer digitum tuum. Si ergo abscin-
ditur sanguis (multotiens namq; abscinditur) tunc stringe brachium, &
dimitte ipsum: & caueat infirmus a motione eius: & sit super timorem
eius. Et non moueat ipsum diebus aliquot, donec sanetur. Si autem
non abscinditur sanguis, & uincit te: & non est tibi præsens in momen-
to tuo medicina, tunc incide arteriã, si apparet tibi. nam extremitates ei-
us contrahuntur, & abscinditur sanguis. Aut accipe corticem fistici, &
finde eum: accipe medietatem unam, & stringe eam super locum uenæ
strictura decenti, cum ligamento & puluillis usq; ad diem alium. Tunc
si abscinditur sanguis, est bonum. Et si non: tunc cura ipsum cum eo cu-
ius præcessit rememoratio ex loco puluerum abscindentium fluxum sangui-
nis: & abscisio sanguinis eius non est difficilis in pluribus dispositio-
nibus, propter locum paruum uulneris, & possibilitatem li-
gamenti ex brachio.

¶ De phlebotomia uenæ Fuscæ.

B
Venæ autem Fuscæ phlebotomiæ iuuamentum est, quod trahit san-
guinem ex superiori parte capitis, & inferiore corporis: propterea, quia
est cōposita ex ramo Basilicæ, & ramo Cephalicæ, sicut diximus. Et con-
uenit phlebotomanti eam, ut sit super timorē ex phlebotomia eius. nam
sub ea est neruus. Si ergo addit in punctura phlebotomi, & inuenit ner-
uum, accidit in ea stupor, et difficilis fit sanatio eius, & fortasse non sana-
tur penitus. Et iste neruus multotiens apparet sensui. Si autem occulta-
tur in quibusdam hominibus, & est subtilis, et non ostenditur: tunc o-
portet ut ponas phlebotomiam tuam qua eam phlebotomas, sectionem
cum Alnesil, & deuita neruum cum fortitudine tua. Quod si uena est
inter duos neruos, tunc finde uenam in longitudine.

¶ De uena Cephalica.

A.
Phlebotomiæ autem uenæ Cephalicæ iuuamētum est, quia attrahit
sanguinem ex capite, & confert ad ægritudines oculorum. Et oportet in
hac uena proprie, si uis, ut phlebotomes eam pungendo cum phlebo-
tomo oliuari, aut cum phlebotomo myrtino: quoniam est saluior uenarum
omnium, quoniam non est sub ea arteria, neque neruus. Verumta-
men conuenit tibi apud phlebotomiam, ut deuites cum phlebotomo
caput lacerti tantum, & quæras locum leniorem: & non nocet ei, si non
inuenitur cum percussione prima, ut iteretur super eam cum phlebotomia
aliquotiens. Verumtamen fortasse apostematur in quibusdam ho-
minibus quando non phlebotomatur in percussione prima, sed non

C nocet ei illud apostema in aliquo.

¶ De utilitate Phlebotomiæ, & cautelis
in ea obseruandis.

Qualitas autem Phlebotomiæ, & accidentia eius ex ea, in cuius rectificatione oportet te cogitare. Primum ergo illius est de quo oportet ut scias; quod phlebotomia non administratur, nisi in conseruatione sanitatis, & perseverantia eius, et cautela ab aduentu ægritudinum. Et ut fiat phlebotomia in una uenarū trium quæ sunt in cubito, scilicet Cephalica, et Fusca, & Basilica. Et ut fiat phlebotomia in principio Veris super ieiuniū, in uere, & æstate: et autumno, & hyeme post comestione, quando apparent significationes repletionis. Et fiat phlebotomia in die primo, aut in tertio, postquā præterierint de die tres horæ. Phlebotomia autē quæ administratur in ægritudinibus, non habet horam determinatam: sed quando prouocat conuenientia & necessitas ad illud, in nocte, aut die, & in omni hora, et in omni tempore. Et non oportet, ut phlebotomētur pueri, donec ueniant super eos quatuordecim anni. Neque phlebotometur mulier prægnans, nisi a mense quarto usq; ad septimū. Neq; phlebotomentur senes, qui iam pertransierunt sexaginta annos.

D Cum ergo aliquis uult phlebotomari propter quemcūq; modum sit oportet, ut mundificet intestina sua ante phlebotomiam cum clisteri leni, si in eis est sterco mulū retentum: ut non attrahant uenæ apud phlebotomiam ex intestinis superfluitates putridas nocentes membris principalibus. Neq; phlebotometur patiens toctina, id est, satietatē nauſeatiuiam: neq; crapulatus, neq; euadens ab ebrietate, donec remoueat illud ab eis. Neq; infirmus cum hydropisi. Et caueatur phlebotomia iterum post colicam passionem, & uomitum, et fluxum uentris, & multiplicationem coitus, & laboris, et exercitiij, & uigiliarum, et ieiunij, & omnis quod dissoluit uirtutē ex re corporea aut animali. Deinde considera in subtilitate humorum ante illud, si sanguis est grossus cum cibis & potibus, et medicinis: si possibile est ei illud. Deinde introeat balneum, si non prohibet ipsum aliquid: aut exercitetur aliquo exercitio, ut subtilietur sanguis. Et pone phlebotomiam eius in pectore, circa tertiam diei, sicut diximus: & conare, ut euacuetur pectus eius illa die ex omnibus accidentibus animalibus malis: sicut angustia, & ira, & timor: & ex omnibus accidentibus corporeis, sicut labor, & pœna, et superflui coitus, et illis similia. Et fedi suæ faciat esse presentes res cum quarum usu cucurrit consuetudo hominum ex aromaticitate, & odoramento, & tripudio, & similibus illis per quantitatem possibilitatis. Deinde sedeat phlebotomator super puluinari, quod sit altius quam puluinar phlebotomandi: postea extrahat brachium suum, & fricat ipsum phlebotomator manu sua bis, aut ter. Deinde stringat ligamentum cum corria

Modus phlebotomandi.

gia, & inuoluat eam bis. Et sit stricture temperata. quoniam stricture **A**
quando est inæqualis, aut per superfluitatem in stricture, tunc prohibet
cursum sanguinis: aut in mollificatione, tunc etiam prohibet cursum san-
guinis. Deinde post stricturem oportet, ut fricet phlebotomandus ma-
nus suas simul adinuicem, donec inflentur uenæ, & declarentur sensui.
Deinde abstergat phlebotomator phlebotomum cum pauco oleo, an-
tiquo proprie. Deinde ponat digitum suum indicem manus sinistrae su-
per ipsam uenam sub loco cuius phlebotomiā uult, parum: ut non fugiat
at uena, & cassetur percussio. Quoniam ex uenis est quam inuenis sic
ut chordam fugientem apud phlebotomiā: & ex eis est quæ est plena
uentositate: et quando ponis phlebotomum super eam, contrahitur sub
phlebotomo, & decipitur phlebotomator, et non aperit phlebotomus
uenam: & si aperit eam, est stricture: propter illud ergo oportet, ut firme-
tur phlebotomator, et sit sollicitus in his rebus omnibus. Deinde de-
ponat phlebotomū. Si ergo aperitur uena ex uice una, tunc bonum est.
Et si non, tunc itera illud uice alia sub illo loco parum, aut supra ipsum
cum festinatione: si non apostematur locus. Quod si apostematur, aut
expauescit infirmus, tunc dimitte eum die, aut duobus diebus: & non
stringat ligamentum. Fortasse enim attrahet apostema calidum. Neque in-
grediatur balneum. Deinde iteret phlebotomiā, si amat. Quod si **B**
apertio est parua, aut currit sanguis subtiliter: & times ut non egredia-
tur ex sanguine quantitas quam uis: tunc itera phlebotomū in foramine
ipso secundum rectitudinem, et adde in operatione parum. Et fac illud
cum festinatione, antequā apostemetur locus, apostematus enim locus
est in multis hominibus apud operationem paruam. Si ergo uides
ipsum iam apostematū, tunc non iteres super ipsum omnino. non enim
excusat apud te aliquid. Et pone super ipsum aliquid ex fœce olei: quoniam
am alleuiat cursum sanguinis. Et est melior in hoc loco quam oleum ip-
sum, et quam reliqua olea. Et similiter administra fœcem olei in omni
phlebotomiā tua, qua phlebotomas uenas apud prohibitionem cursus
sanguinis: & faciunt illud tyriaca alfarach, & sagzenea, quando ponitur
ex una earū super locum. Sanguis enim subtiliatur & resoluitur, quādo
est grossus. Quod si accidat in loco phlebotomiæ apostema magnū,
nam multotiens accidit, præcipue ei qui non est phlebotomatus nisi uice
illa, aut est apertio uenæ parua, tunc propera & pone super locū spon-
giam infusam in aqua & sale, calefacta parumper: et stringe eam hora u-
na: quoniam soluitur. Et oportet, ut facias illud post exitū sanguinis ex ue-
na ipsa, cum completō sui, aut ex uena alia. Quod si remanet in lo-
co post dies aliquid nigredinis, aut uiriditatis, non nocet illud: & si uis,
pone super ipsum aliquid aloe, aut myrrhæ solutorū: aut aliquid ex suc-
co menthastri, id est, calamenti: aut simile illius. Et multotiens quidē ac-
cidunt apostemata & eminētiæ apud phlebotomiā Basilicæ. Pone ergo

Ex olei.

C manum tuam super ipsam, tunc si inuenis molliciem apud compressio-
 nem tuam super ipsam, tunc illa eminētia est mala. Caue ergo, ut ponas
 super eā aliquid ex eo quod diximus. Nam fortasse fluat ex ea sanguis
 arteriæ. Sed fac emplastrū ei cum eo in quo est stipticitas, ut induretur
 locus. Deinde cura ipsum cum reliqua curatiōe, donec sanetur. Et o-
 portet, ut extrahas omni homini ex sanguine secundū quantitatem uir-
 tutis suæ. & quod apparet ex colore uincente super sanguinē. Nam san-
 guis si est niger, tunc dimitte ipsum exire, donec rubeat: & similiter si ui-
 des ipsum grossum: tunc dimitte eum, donec subtilietur: et similiter si est
 acutus, donec auferatur acuitas eius. Et oportet ei qui est plenus, for-
 tis, et indiget extractione sanguinis uice uisā, ut amplificetur phlebot-
 omia uenæ, & sit phlebotomus latus: et in eo qui est debilis, sit e contrari-
 o illius. Et oportet, ut extrahat ipsum in uicibus, & ut sit foramen stric-
 tum: & melius quod administratur in phlebotomia uenæ est, ut sit transuer-
 sa sectio, non punctura. Et iste modus phlebotomiæ est saluus a fluxu
 sanguinis, et ab incisione nerui: & est laudabilior, et saluior quā phlebo-
 tomia per latitudinē & longitudinē. Et cui consuevit peruenire apud
 phlebotomiā syncopis, oportet ut cibus ante phlebotomiā modico pa-
 ne infuso in aqua granati muzi: aut secianiabin, si est calefactus: & extra-
 has ei ex sanguine in tribus uicibus, aut quatuor. Et si est infrigidata
 complexionis, tunc accipiat ante phlebotomiā panem infusum in syr-
 po miua, aut in syrupo de melle aromatizato cum speciebus, aut in syr-
 po aromatizato odorifero. Quod si accidat syncopis apud phlebot-
 omiam, et est causa eius exitus sanguinis multi: tunc oportet, ut sumat in
 potu aquā * carnis, & syrupum odoriferū subtilem: et urat aromaticita-
 te cum algalia, & liniatur pectus eius cum ea: et uratur reliquis quæ dixi-
 mus in diuisione in capitulo syncopis ex euacuatione. Qui autē uult
 euentare brachiū suum, et soluere sanguinē suum secūdo: oportet ei eu-
 ius phlebotomia est propter euacuationē multam, et uirtus eius est debi-
 lis, ut soluat sanguinē paulatim per quantitatem uirtutis in diebus conti-
 nuis. Qui uero uult euentare brachiū suum, et soluere sanguinē suum
 secundo, & est corpus eius forte: tunc faciat illud post septem horas, aut
 nouem, a phlebotomia sua prima. Qui autem uult attrahere sangui-
 nem ex corpore suo ad contrarium partis ad quam declinat: oportet ut
 euentetur ei in die secūdo, aut in tertio. In cuius uero corpore est san-
 guis multus iam calefactus, & acuitur, et facit accidere febrem: oportet,
 ut egrediatur ex eo sanguis in uice una, & extrahatur ex eo quātitas mul-
 ta: & amplificetur apertio usquequo accidat syncopis: postquā tu fueris
 conseruans omnes conditiones phlebotomiæ: & ut ponas manū tuā
 super pulsum eius apud cursum sanguinis, ut nō accidat mors loco syn-
 copis. Multotiens enim accidit illud, quando ignorat phlebotomator.
 & cadit negligentia. Et non oportet quādo uis soluere brachiū, & sol-

Ad apostema
Basilicæ.

Quantū san-
guinis extra-
hendū,

Ad Synco-
pim.

Vd * cannis.

Phlebotomia
secundaria.

vere sanguinem secundo, cum iam clausum sit orificiū uenæ, & fiat diffi- **A**
cili exitus sanguinis, ut prematur super ipsum cum uehementia, & cur-
matum extendatur uelociter. nam illud est malum ualde, imo dimitte ip-
sum, donec phlebotometur secundo. Aut remoue cum acuitate phle-
botomi illud quod cōagulatum est ex sanguine in orificio uenæ, & po-
ne super ipsum aliquid salis dissoluti in aqua. Et pone super ipsum ali-
quid ex tyriaca alfaroch, aut sagzenea, & pone ipsum compressione le-
ni, donec egrediatu sanguis. Si uero iam apostemata est uenia, tunc di-
mitte eam, & non tegas eam, donec sedet apostema. Quod si necessi-
tas prouocat ad soluendū sanguinem secundo, et non est excusatio, tunc
aut phlebotoma ipsum supra illū locū, aut in brachio alio in uena alia.

Funis autem brachij phlebotomatur loco Fusce, et Basilice, cum non **cc.**
inueniunt, et sunt occultæ. quoniā est composita ex eis. Et qualitas phle-
botomiæ eius est, ut intromittat infirmus manū suam in aqua calida, do-
neerubeat facile, & appareat uena manifeste. Deinde stringatur super
ipsam cum ligamēto parum constrictione media. Deinde phlebotoma
secundū transuersionē paulatim, non latitudinaliter, neq; secundū lon-
gitudinē: & sit apertio ampla, et sit phlebotomia tua qua eam phlebotoma
mas super iuncturā manus parumper. Quod si prohibet exitus san-
guinis, tunc itera manum in aqua calida, & dimitte sanguinem currere
in aqua, donec consequaris necessitatem tuam. Si autem fueris in die **B**
bus æstatis, tunc excusaris ab iteratione manus in aqua calida. Et plu-
rimū quidem ponitur cursus sanguinis in aqua calida in tempore hye-
mis. Et phlebotomia huius uenæ est saluior omnibus uenis, quoniam
non est sub ea uena pulsabilis, neq; neruus.

Phlebotomia uero Saluatellæ manus dextræ, est conferens ægritudi- **cc.**
nibus epatis. Et qualitas phlebotomiæ eius est, ut stringas mahalon ma-
nus cum ligamēto, aut manū tua, postquā tu intromittis eam in aquam
calidā, donec infletur uena, & demōstret sensui ualde. Deinde phlebo-
toma eam transuersando. Et si incidis eam totaliter, non nocebit ei illud
in aliquo. Et conserua, ne ultimes manū tuam cum phlebotomo. sub ea
enim sunt nerui digitorū denudati ex carne. Deinde itera manum ad a-
quam calidam, & dimitte currere sanguinem in ea. Nam si tu non iteras
eam in aqua calida, cōagulatur sanguis in orificio uenæ, & prohibetur
a cursu. Cum ergo extraxeris ex sanguine quantitatem necessitatis, tunc
pone super uenam oleum & sal: ut non consolidetur uelociter. Et simili-
ter oportet, ut facias cum omni ramo strictio. Iuuamentum uero phle-
botomiæ eius ex manu sinistra, est: quoniam est conferens ad ægritudi- **m.**
nes splenis: & similiter fac in phlebotomia eius, sicut feci

sti in secunda æqualiter. **cc.**
Saphenæ aut phlebotomiæ iuuamentū, est ad ægritudines quæ sunt
in inferiori parte corporis, sicut ægritudines matricū, et retentionē men-

C struorum, & infirmitates renū, et ulcera coxarum & crurium antiqua, et similia ex agritudinibus. Et qualitas phlebotomiæ eius est, ut intromittat infirmus pedem suū in aquam calidam: & faciat super ipsum fricatio nem, donec exuberent uenæ: & liga supra iuncturā pedis cum corrigia. Et uenæ quidē locus est apud calcaneum, apparens uersus pollicem: & ramificant ex ea in facie pedis rami multi. Phlebotoma ergo eam in ampliore ramo eius, aut apud calcaneū in aggregatione eius: quoniā est melius & saluius. Quod si phlebotomas eam in facie pedis, tunc caue a neruis qui sunt sub ea super faciem pedis. Et pone phlebotomiā tuam quæ eam phlebotomas ex transuerso, quasi tu uelis incidere eam: & sit phlebotomus Nesil. Si autem prohibetur exitus sanguinis, tunc itera pedem eius in aqua calida: & dimitte sanguinē currere in eam, donec euacuatur. Quod si errat uenam phlebotomator in prima uice, tunc iteret cum phlebotomia ad superiora parumper. nam locus est saluus, & non times ex eo maliciam, quando tu cauēs a neruis, sicut diximus. Et similiter cum Saphena pedis alterius æqualiter.

III. Venæ autē Sciaticæ locus, sicut diximus, est apud calcaneū ex latere syluestri. Et iuuamentū phlebotomiæ eius est, ad dolorem anchæ, quando est propter sanguinē calidum. Et qualitas phlebotomiæ eius est, ut ingrediat infirmus balneum, & festinet: et stringe crus eius a latere anchæ usq; supra calcaneū quatuor digitis, cū uitta subtili longa: non em̄ apparet nisi propter illud. Quādo ergo apparet, tunc phlebotoma eam scdm̄ quodcuq; ingeniū est tibi possibile, aut scdm̄ transuersionē: et est melius, aut ut incidas eā incisione, aut secēs eam sectione. locus em̄ eius est saluior, et ipsa est in pluribus hoibus occulta ualde. Quod si nō inuenis eā, & nō apparet sensui oīno: tūc phlebotoma aliquem ramū eius, et est ille qui apparet in dorso pedis, & uersus auricularē: et caue a neruis, & fac currere ex sanguine quantitatē quam uis. Deinde solue stricturā, et pone super locū phlebotomiæ coriū, & stringe locū. uelociter em̄ sanatur.

V De Ventosatione, & qualitate usus eius.

Caput

XCVIII.

Modi Ventosationis.

14. modi Ventosationis cū scarificatione.

E N T O S A E fiunt ex cornibus, & ex ære, et ex uitro. Et Ventosatio quidē fit secundū duos modos. Cum scarificatione, & extractione sanguinis: et alter est uentosatio sine scarificatione. Et hæc Ventosatio quæ est sine scarificatione, est secundū duos modos. Aut enim est cum igne. Aut est absq; igne. Et uentosis quæ administrant eum scarificatione & extractione sanguinis sunt quatuordecim loca corporis. Quorum unus est, Ventosatio Alnocrati, et est postremū capitis: & Alkehel, et est mediū colli: et uentose Alhagdahim, et sunt duæ lamine colli a duobus partibus simul: & uentosæ menti, & est sub mandibula in inferiori oris: & uentosæ duarū spatularum: et uentosæ Alachosof super finē caudæ: & uentosæ duorū focium, & sunt mediū duorum brachiorū: & uentosæ

duorum crurū: et uentosæ duarū cauillarum. Et Ventosatio quidem **A** non extrahit sanguinē tibi ex uenis minutis sparlis in carne, & propter illud non cadit uirtus ex eis, sicut est casus eius ex phlebotomia. Neq; oportet, ut administret uentosatio siue cum igne, aut absq; igne in aliqua ægritudine quæ fiunt ex repletionē, donec euacuetur totum corpus.

Quod si necessitas prouocat ad Ventosationē ex ægritudine, aut propter consuetudinē, administramus eam in omni hora in principio mensis, in fine eius, et in medio ipsius, & in quocūq; tēpore fuerit. Quod est, quia ex hominibus est qui quādo multiplicat in eo sanguis, donec indiget extractione eius per uentosationē, inuenit in capite suo grauedinē, et sodahan. Et ex eis est qui inuenit repletionē & rubedinē in facie sua, capite suo, & collo suo. Et ex eis est qui inuenit pruritū in facie sua, et fronte sua, et tenebrositatem, et hebetudinē in oculis suis. Et ex eis est qui scalpit locū uentosationis suæ. Et ex eis est cuius risus multiplicat. Et ex eis est qui inuenit gustum sanguinis in ore suo: aut apostematur lingua, & expuit sanguinem. Et ex eis est cuius somnus multiplicatur. Et ex eis est qui uidet in somno suo sanguinem & rubedinē, et interfectos, et plagas, & quæ sunt similia illis. Quando ergo uidemus aliquid ex illis, & proprie si est in tertiā mediā mensis: præcipimus tunc uentosationem fieri, postquam præterierunt de die duæ horæ, aut tres. Iuuamentū autem Ventosationis nuchæ, est: quoniā ipsa confert ad grauitatem in capite, & quod effunditur ad oculos. At uero oportet, ut sit illud post euacuationem totius corporis. Et hæc quidem Ventosa est loco phlebotomiæ Cephalicæ. Et non licet, ut utatur ea qui est frigida cōplexionis, aut in quo est catarrus. Nam infert ei nocumētum magnum. Et propter illud non oportet, ut utantur ea senes, & in cuius capite sunt ægritudines frigida. Qui autē super eam sit assiduus, generatur super eum obliuio. Et propter illud oportet, ut præcipias Ventosatori, ut deponat manū suam cum uentosa parumper ad inferiora, timendo ex generatione obliuionis.

Ventosatio aut Alkehel, est loco phlebotomiæ Fusca, & phlebotomiæ Basilicæ, & propter illud confert asmati, et cōstrictioni anhelitus, & fissuræ instrumenti anhelitus, & tussi, et repletioni. Et oportet, ut impellatur Ventosa Alkehel parumper, quoniam si ponitur inferius, generat debilitatem in corde, et stomacho. Ventosatio uero alhagdahim, confert doloribus accidentibus in capite, et obthalmiæ, et hemigræniæ, & perforationi, et dolori in radicibus dentium: & est loco phlebotomiæ Basilicæ. Et oportet, ut præcipias Ventosatori, ne premat manū suam cum scarificatione: ut non incidat arteriam, & accadat fluxus sanguinis. Ventosatio autem sub mento, confert alcole in ore, & corruptioni gingiuarū, & similibus eis ex ægritudinibus quæ sunt in ore: & stat loco phlebotomiæ alieherich, quæ sunt in duobus labijs. Ventosatio autē spatularum, confert ad alchafacham, quæ fit ex replexione,

Indicia necessitatis Ventosarum.

Ventosationū iuuamēta.

B

..
..

C & caliditate. Ventosatio uero interiorum partium duorum focilium, confert iuuamentum phlebotomiæ uenarum trium, Basilicæ, & Fuscæ, & Cephalicæ: quoniam ipsa attrahit sanguinem ex omnibus illis uenis minutis, quæ sunt in carne: & attrahunt illæ uenæ minutæ ex uenis alijs grossioribus eis, donec peruenit attractio ad uenas tres. Et oportet, ut præcipias Ventosatori, ne multum procedat in scarificatione: quoniam locus est denudatus carne, & sub eo sunt nerui & arteriæ. Ventosa autem quæ uentosatur super alchaufos, confert hemorrhoidibus Ani, & ulceribus inferioribus. Et oportet, ut præcipias Ventosatori, ut sit uentosa magna, et ut sit ex ære: quoniam locus indiget succione forti, & fortasse franguntur Ventosæ subtiles: & scarificetur scarificatione magna. Ventosæ autem crurium minuunt diminutione manifesta: quoniam attrahunt sanguinem ex toto corpore, & conferunt doloribus antiquis in renibus, & matricibus, & uelica: prouocant menstrua, & conferunt bothor, & ademenul: & stant loco phlebotomiæ duarum saphenarum, & alhorcobeni. Verumtamen debilitant corpus multum, & faciunt accidere syncopim in pluribus hominibus. Et Ventosarum alhorcobeni iuuamentum est propinquum iuuamento Ventosarum duorum crurium.

D Qualitas positionis Ventosarum est, ut ponas uentosam in primis uacuam, & sugas succione temperata: & non prolonges positionem uentosarum, sed pone eas uelociter, & remoue eas uelociter, ut ueniant humores ad locum aduentu æquali: & non cesses iterare illud & continuare, donec uideas locum iam rubere & inflari, & appareat rubedo sanguinis: tunc ergo scarifica, & itera succione paulatim. Deinde considera in dispositione corporum. nam qui ex hominibus est teneræ carnis, rarorum pororum, oportet ut scarifices ipsum semel, non plus: ut non ulceretur locus. Et præcipe Ventosatori, ut amplifcet scarificationem, & profundet parum: & temperet succionem in facilitate, & uelocitate, & motu suauis. Quod si in sanguine est grossitudo, tunc oportet, ut scarifices ipsum bis. In uice quidem prima aperitur uia subuliationi sanguinis, & aquositati eius: & in secunda quidem perscrutationi exquisitæ extractionis sanguinis grossi. Si uero sanguis est faculentus ualde, tunc fiat scarificatio uice tertia: ut consequatur ultimum. Et ad ultimum, quando uolumus extrahere sanguinem paulatim, uel parumper, sufficit nobis scarificatio una. Quod si uolumus extractionem sanguinis multi, scarificamus scarificatione plurima. Et si nos mensuramus, quod sanguis est grossus: tunc oportet, ut scarificetur scarificatione profunda: & terminus æqualis in scarificatione, est profunditas cutis.

¶ Quid sit illud quod oportet administrari ex oleis apud positio-

nem Ventosarum, & quid caueat uentosandus.

IN illo quidē cuius cutis est grossa, dura, fusca, & pori eius sunt stria-
ti, oportet ut unganē loca Ventosarū cum oleis apertius, lenitiuis,
resolutiuis: si est in tēpore aestatis. sicut est oleū alkeiri, aut oleum uiola-
rum, aut oleū de amigdalīs dulcibus, aut oleū de semine cucurbitæ. Et si
est in tēpore hyemis, tunc oleū narcissinū, aut oleum de lilio, aut oleū ca-
momellinū, aut sarbatinū: et eis similia. Si uero superfluitas est grossa, fri-
gida: tunc oleū sit amaracinū, aut oleum de balsamita, aut oleū alben, aut
oleum anetinū: & eis similia. Si uero uētosandus est amplorū pororum,
teneræ carnis: tunc oportet, ut prohibeā ab oleo, & oportet ut isti ablu-
ant loca Ventosarū earū post uentosationē cum aqua rosata, aut cū aqua
frigida, aut cū aqua solatri, aut cum aqua cucurbitæ, aut cū aqua portu-
lacæ: et similibus eis. Ille autē cuius sanguis est multæ humiditatis, abluat
at uentosas cum aceto, aut cū aqua myrti, et sumach: et similibus eis. Cu-
ius autē superfluitates sunt grossæ, abluat uentosas suas cum uino anti-
quo, aut cum aqua samfuci, aut decoctione aneti, aut camomillæ: & eis si-
milibus. Et oportet, ut caueatur uentosatio in balneo, aut in uestigio bal-
nei, imo oportet, ut administretur post exitū ex balneo per horam, aut
per horas duas. Et non oportet, ut dormiat aliquis post uentosationem.

E Quid est quo oportet ut regatur Ventosandus, aut
Phlebotomatus ante uentosationem.

ET post eā oportet, ut consideres in primis: tunc si Ventosatus, aut
Phlebotomatus sit cholericus, et uincūt super sanguinē eius acuitas & in-
flāmatio: tūc oportet, ut accipiat in frigidantia. sicut granatū muzum: &
etiā endiuia cū aceto & lactuca, et secaniabin, & iuleb: et eis similia. Et
pone cibaria eius pullos, et carnes ouīū sekebiget, et cibos conditos cum
agresta: et eis similia. Et cuius cōplexio est frigida, oportet ut sumat i po-
tu syrupū de melle, aut de almiua, aut alssecaniabin de seminibus faciū:
& sumat uinū odoriferum mediū, quod est inter uetus & nouū: et præ-
cipiatur, ut utatur paucitate cibi. Et pone cibū eius pullos, & canebir: &
passeres, id est, paruas aues: et pullos columborū issiadebet. Et oportet,
ut potus die uentosationis & phlebotomiæ plus sit quā cibus: & opor-
tet, ut detur in potu in quibusdam hominibus in horis tyriaca alfaroch,
aut medicamen de musco, id est, muscata, aut aleffeli the ante uentosatio-
nem: & ante phlebotomiā, aut post: ut confortent membra principalia,
& subtilietur sanguis. Et non oportet, ut sumāt eam in potu calefacto.

V De Ventosis sine scarificatione.

VENTOSAE autē quæ sunt sine scarificatione, sunt Ventosæ
quæ ponuntur super epar, et splenem, & podagrā, et super uen-
trem, umbilicū, et loca renum, & pixidem anchæ: quoniā ista membra
non sufferunt scarificationē super se. Et non quæritur per eas, nisi aut at-
tractio ex membro sanguinis ad membrū: sicut ponimus Ventosam su-


A

B

Regimē Ven-
tosati & phle-
botomati.


C per māmillas in ægritudine fluxus sanguinis nariū. Et utimur eis, ut sol-
uamus a membro uentositatem frigidā inuiscatam in membro: sicut po-
nimus uentosam super uentrem, et umbilicum. Ipsa enim rarificat mem-
brum, & calefacit ipsum, et remouet dolorem propterea, quia resoluit il-
lam uentositatem. Etiam ponitur super renes, quando accidit in eis opi-
lacio, aut lapis. uirtute enim attractionis suę fortasse aperit opilationem,
aut eradicat lapidem ex loco suo. Et similiter facit quādo ponitur super
epar, et splenem apud uentositatem terendam in eis utrisq;. Et istę Ven-
tosæ administrantur uacuae cum sectione tantum. Et quandoq; admini-
strantur cum igne. Et quandoq; administrantur plenæ aqua tepida in ægri-
tudinibus pleuresis: & illud est, ut impleatur Ventosa, et sit magna, aqua
calida sola, aut aqua in qua decoctæ sint herbæ quæ conueniunt.

¶ Forma Ventosæ administratæ cum igne.




D Sit amplitudo orificij eius duorum digitorum apertorum, secundum
quod formauimus: & quantitas eius in profundo sit medietas palmi: &
sit in latere eius in loco qui est circiter medium eius, foramen paruum,
secundum quantitatem quod ingreditur ipsum acus: fiat ex ære simul,
aut citrino, grossorum marginum, lenium, æqualium, terforum: ut non
lædat membrum apud positionem suam super ipsum: & sit in medio ei-
us uirga transuersa ex ære, aut ferro, ubi ponitur candela cum igne. Et
iam fit hæc uentosa magna, maior ea quam narrauimus, & parum mi-
nor illa, secundum ægritudines & ætatem eius qui utitur. Ventosę enim
puerorum, & extenuatorum sunt aliæ, quam uentosæ uirorum, & gros-
sorū corporum. Qualitas autem ponendi hanc uentosam cum igne
super membrum, est, ut accēdas licinium cum igne ex lino decenter, aut
candelam paruam ex cæra: & pone eam super medium uirgæ transuersæ
quæ est in medio uentosæ: ut sit accensus ignis circiter inferiore par-
tem uentosę, ut non comburatur corpus infirmi. Deinde ponatur super
membrum: & digitus sit super foramen quod dixi, donec quando tene-
mus uentosam: dum indigemus, auferamus digitum, & egredietur ua-
por super illud foramen, & soluetur uentosa statim. Deinde igni licini-
um secundum modum suum, & iterā eam, si indiges illa. In Ventosa
autem quæ administratur in ægritudine pleuresis cum aqua, nō est uir-

ga transuerſa, neqꝫ foramen: & non adminiſtratur, niſi quia impletur a qua, & ponitur ſuper membrum tantum. Et hæc eſt forma eius. Et hæc Ventofa quanto plus eſt magna, ut capiat aquam multam, eſt melior.



¶ De ſuſpenſione Sanguifugarum.
Caput XCIX.

SANGVIS V G A E non adminiſtrantur in pluribus, niſi in quibus membris non eſt poſſibilis poſitio uentofarum, propter paruitatem eorum. ſicut labium, & gingiua, et eis ſimilia. Aut in membro denudato a carne, ſicut digitus, & naſus, et eis ſimilia. Et qualitas utendi eis eſt: ut ueneris ex Sanguifugis quæ ſunt in aquis dulcibus, mundis a putredinibus. Deinde dimittantur die & nocte in aqua dulci, donec famelicæ ſint, & non remaneat in uentre earum aliquid. Deinde euacuetur corpus in primis cum phlebotomia, & cū uentofis. Deinde abſterge membrum infirmi, donec rubeat. Poſtea ponantur ſuper ipſum. Cum ergo implentur, & cadunt, et eſt poſſibilis ſuctio loci cum uentofa, tunc eſt magis ultimum in iuuamento: & ſi non, tunc ablue locum cum aceto, deinde cum aqua multa, & fricetur, et exprimatur. Quod ſi prolongatur curſus ſanguinis poſt caſum Sanguifugarum, & eſt illud reſudando: tunc infunde pannum lini in aqua frigida, & pone ipſum deſuper, donec abſcindatur reſudatio. Quod ſi multiplicat ſanguis, tunc pulueriza ſuper ipſum zegi tritum, aut gallas, et ſimilia eis ex ſtipticis: donec abſcindatur ſanguis. Aut ponantur ſuper locū medietates fabarum ex corticarum: & dimittantur, donec adhæreant fabæ in loco. nam ſanguis abſcinditur. Et oportet ſi neceſſaria eſt iteratio Sanguifugarum, quando eſt poſſibile, mutare eas. Si autem prohibentur Sanguifugæ a ſuſpenſione, tunc abſtergatur locus cum ſanguine recenti. Aut fige aciem in locis, donec egrediatur aliquid ex ſanguine. deinde ponantur. nam ipſæ quando ſentiunt aliquid ex ſanguine, adhærent ſtatim. Quantum ergo uis ut cadant, pulueriza ſuper eas aliquid ex aloe trito, aut ſalē, aut cinerem: & cadent ſtatim.



Os Basillare,

Os Coronale,

Ossa paria quatuor,

Ossa Nasi duo,

Os colatorij unum,

Ossa mandibule superioris xj,

Ossa mandibule inferioris duo,

Os spatule ab utraque pte,

Os Adintorij,

Coste vere et mendose xxiii,

foale minus

foale maius

Ossa Rasce vñ,
uno eis addito,

Ossa pectinis 4,

Ossa digitorum xv,

Os Coxe,

Rotula genu,

Maior tanna,

Os nasiculare ab utraque pte
Ossa Rasce 4
Ossa digitorum 14

Os Laude, siue Capitale

Os parietale ab utraque pte

Os petrosum ab utraque pte

Os Occipitale,

Spondiles vere et mendose xxx,

Os sacrale ab utraque pte,

Os Adintorij,

Arundo maior

Arundo minus

Spondile.

Os Sac siue Anche.

Ossa Rasces

Ossa pectinis

Ossa digitorum xv

Os Coxe,

Rotula genu,

Maior tanna,

Oss femoris, Os
Ili, et Pixis
sub Anchis,
Ite tria ossa
anclæ,

Minor tanna,

Oss calcanei,

Os Calcab,

Ossa pectinis 4.

Os Calcanei,

LIB. Chirurgici ALBV CASIS Pars III. A



¶ Sexto uniuersalis de restauratione, & dislocatione, & curatione torsionis, & similibus. Caput I.

¶ O C C A P I T V L V M etiam multotiens est necessarium in arte Medicinæ, & est restauratio fracturæ, & dislocationis accidentium in ossibus. Scitote o Filij, quia iactant se de hoc Capitulo stolidi medicorum & vulgi, et qui non inspexerunt unquam antiquorum librum, neq; legerunt ex eo literam. Et propter hanc causam fit, quod iste modus ex scientijs in terra nostra est priuatus. Et ego non obuiaui in eo unquam bono omnino, et non adeptus sum ex eo illud, quod sum adeptus nisi propter longitudinem lectionis librorum antiquorum, & studium super intellectum eorum, donec extraxi scientiam illius ex eis. Deinde adhesi experimento & studio longitudine uitæ meæ. Et iam descripsi uobis ex illo in hoc Capitulo totum quod continet scientia mea: et super quod præterijt experimentum meum, postquam abbreviaui illud uobis, & liberaui illud ex occupatione elongationis, et abbreviaui illud sine abbreviationis, & ostendi illud sine declinationis: et formaui in eo formas multas ex formis instrumentorū quæ administrantur in eo, cum sit ex additione declinationis, sicut feci in duobus Capitulis præcedentibus.

Ingenium & peritia Autoris.

monstrat
causas

B

¶ Summa, & collectiones ex esse fracturæ ossium, ex eis quarum præmissio necessaria est, antequā incipiamus rememorationem membrorum fractorum, & diuersorum, si uniuscuiusq; Caput II.

¶ O P O R T E T, ut dicamus in prologo huius Capituli, summas sermonis, et capitula, ad quarum intellectum cogitur in primis annex ad stationē super earum ueritatem: scilicet ut uos, & qui sunt prompti, sciant, uel addiscant hanc artem nobilem, et alij a uobis. Dico, ergo, quod quando accidit alicui fractura, aut dislocatio, aut torsio, aut casus: tunc oportet, ut properes in primis ad phlebotomandum eum, & soluendum ipsum, aut utraq; simul: si non prohibeat aliquid, sicut debilitas uirtutis: aut est ille cui accidit aliquid ex illis puer, aut senex decrepitus: aut est tempus uehementis caloris, aut uehementis frigoris ualde. Deinde sit contentus in cibo suo, oleis frigidis, & carnibus auium, & hedorum: et prohibe uinum, & carnes grossas, et replet ex cibis & omni cibo qui replet uenas sanguine. Donec quando securus sis ex apostemate calido, et non times effusionem materiei ad membrum tunc redeat infirmus ad regimen suum primum cum quo cucurrit consuetudo eius. Cum ergo incipit os fractum restaurari, tunc oportet, ut cibetur infirmus cibis nutriendis nutrimento multo, grosso, graui, in qui

Regime in fractura, dislocatione, aut torsione ossium.

Cbus sit uiscositas: sicut cibaria facta ex tritico cocto cum aqua, & rizū, & capita, & pedes, et uentres uaccarum, & oua, et pisces recentes: et uinum grossum, & similia illis. Cum hoc enim regimine fit coagulatio fracturæ uelocius, et melius. Et scias, quod ossa fracta, quando sunt in uiris qui sunt in prima senectute, & decrepitis, non est possibile, ut continuentur & consolidentur secundum naturam suam semper, propter exiccationem membrorum eorum: et consolidantur & continuantur quæ ex eis sunt in fine lenitatis, sicut ossa puerorum paruorum. Verumtamen natura annectit super os fractum ex omni parte aliquid simile glutino, in quo est grossitudo, quo adhæret & stringit ipsum, donec conglutinantur adinuicem, et ligantur adinuicem, donec uenit in fine fortitudinis & firmitudinis, sicut fuit in primis, donec non prohibet ipsum aliquid ab operationibus suis: et propter hanc causam est necesse, ut ponas nutrimentum infirmi cibaria, in quibus sunt grauitas, et uiscositas, & grossitudo, sicut diximus. Et scias, quod fracturæ species sunt diuersæ, secundum diuersitatem membrorum: quoniam fractura cruris, est diuersa a fractura ossis capitis: & fractura ossis pectoris, est diuersa a fractura ossis dorsi: & similiter reliqua membra omnia diuersa existunt adinuicem: et ego ueni cū rememoratione omnis speciei fracturæ expositæ in Capitulo suo distinctæ ab alia. Et diuersificant species fracturæ ossis etiam in seipsa. Quoniam fit fractura eius arcuata, præter quod accidant in ea astellæ. Et quandoque fit fractura eius secundum

Fracturarum
diuersitas.

D longitudinem ossis: & sunt fracturæ eius satagiæ, id est, astellæ, et additiones procedentes, sicut sunt in calamo, cum aptatur cultello ad scribendum. Et non procedentes: et est fractura cum uulnere & disruptione in capite: & est fractura fissura parua. Et omni speciei est ingenium, uel instrumentum proprium in restauratione eius, secundum quod ueniet rememoratio eius, distincta in locis suis. Et ex eo quo cognoscitur fractura ossis, est tortuositas eius, et ipsius eminentia: & apparitio eius sensui, & sonitus eius quando comprimis ipsum manu tua. Quando ergo non est in loco tortuositas apparens, neque sonitus apud tactum tuum cum tangis os cum agitatione, neque inuenit infirmus magnum dolorem: tunc non est illic fractura, imo possibile est, ut sit tortuositas, aut fissura parua: non ergo oportet, ut moueas ipsum cum manu & compressione omnino, imo pone super ipsum ex medicinis, quarum uenit rememoratio, post momentum illud quod conuenit loco: deinde stringatur strictura subtili. Et scias, quod locus, quando arcuatur, & scinditur in duo, præter quod accidant in eo satagiæ, uerumtamen remouetur omnis pars a compari sua: tunc oportet tibi, ut incipias ab hora tua ad rectificationem eius, æquando ipsum antequam accidat ei apostema calidum. Si autem accidat ei apostema calidum, tunc dimitte ipsum diebus aliquot, donec quiescat apostema. Deinde æqua-

Fracturæ co-
gnitio.


ad m. migo
ad m. migo
ad m. migo
ad m. migo

ipsum secundum quemcunque modum potest ex lenitate & ingenio. **A**
 Et scias, quod restauratio eius, & ipsius æquatio, est facilior quam ossis,
 in quo accidunt satagiæ. Deinde stringe ipsum, secundum quod ueniet
 tibi rememoratio eius. Si uero in osse sunt satagiæ, tunc necessaria est
 extensio huius membri fracti ex duabus partibus, si manus sit, aut pes,
 aut cum manu tua, si membrum est paruum: aut cum duobus funibus,
 aut cum fune & manu. Et sit positio tua qua ponis membrum super lo-
 cum æqualem, secundum figuram suam naturalem, donec quando ex-
 tenduntur partes membri fracti: tunc conare, ut redire facias illas addi-
 tiones omni ingenio, & secundum quemcunque modum potes in lo-
 cis suis: & caue secundum fortitudinem tuam, ne accadat super infir-
 mum per operationem tuam dolor, neque læsio: & conare secundum
 fortitudinem tuam, ut applies unum duorum ossium cum socio suo,
 secundum meliores formas. Et oportet in illa hora, ut tentes & tangas
 ipsum manu tua. Si ergo uides illic aliquid diuersum, rectifica ipsum, &
 æqua illud per quantitatem tuæ uirtutis. Et caue extensionem uehemen-
 tem, & compressionem fortem, sicut faciunt multi stolidorum. Multo-
 tiens enim faciunt accidere per operationem illam suam apostema calis-
 dum, aut contractionem in membro: sicut iam uidimus illud ex opera-
 tionibus eorum multotiens. Deinde annecte post æquationem, & de **B**
 centem operationem, & strictionem illius membri, et quietem, & trans-
 quillitatem: et mone infirmum super ipsum. Et fac ipsum cauere, ne mo-
 ueat ipsum in hora suarum uigiliarum, & somni sui apud reuolutio-
 nem suam, & agitationem suam, et apud egestionem suam, & omnes
 motus suos ultima uirtute sua: Et ut caueat, ne sit positio membri positio
 cum qua sequatur dolor. Quod est, quia quando sentit in dispositione
 positionis membri dolorem, aut læsionem: tunc oportet, ut permutes
 ipsum ad dispositionem aliam ab illa cum qua non sentiat dolorem. Et
 caue cum illo, ut sit positio eius illa æqualis, recta: ut non accadat in mem-
 bro tortuositas, quando restauratur. Et qualitas strictionis membri fra-
 cti est, secundum quod narro. Scias, quod membra fracta diuersiffi-
 cantur in paruitate sua, & eorum magnitudine, et ipsorum forma. Quæ **C**
 ergo ex eis sunt parua, sicut brachium, & digitus, et focile, & similia eis,
 tunc oportet, ut sit inuolutio panni mollis, subtilis. Quæ autem ex eis
 sunt grossa, sicut coxa, & crus, oportet ut sit in eis inuolutio lara, dura:
 quoniam iam ligamentum latum, connectit membrum magnum, & strin-
 git ipsum ab omni parte strictione æquali, ita quod non ingreditur ipsum
 macula. Deinde incipe post euacuationem tuam ab æquatione ponere
 linimentum conueniens ad illud, in stuppa leni super locum fracturæ
 ipsius. Deinde incipe inuoluere ligamentum super locum fracturæ ipsi-
 us tribus inuolutionibus, aut quatuor, secundum quod meretur mem-
 brum: et stringe manum tuam parumper cum ligamento. Deinde uade

Fracturarum
 qualitates.

C cum eo ad partem superiorem a loco fracturæ, & stringe minus quam fuit strictura tua, qua strinxisti locum fractū. Deinde elonga te cum inuolutione a loco fracturæ parumper, & mollicifica stricturam paulatim, donec capias ex loco sano rem magnam. Deinde accipe uittam aliam, et inuolue eam iterum super locum fractum inuolutionibus. Postea uade cum inuolutione ad partem inferiorem a fractura. Et sit operatio tua in strictura inuolutionis, & mollicificatione eius, secundū quod diximus in inuolutione prima superiore. Deinde pone inter inuolutiones ex stuppa leni, aut panno, cum quo æquetur tortuositas fracturæ, si est in ea tortuositas: & si non, non ponas in ea aliquid. Deinde inuolue super ipsam uittam aliam. Postea æqua super has inuolutiones astellas decenter factas statim, si non est in loco inflatio, neq; apostema calidū. Si autem in ea est inflatio, aut apostema: tunc pone super eam quod sedet illud apostema, & auferat inflationem: & dimitte eam aliquot diebus. Deinde stringe super ipsam tunc astellas. Et sint Astellæ ex medietatibus cannæ latæ, rasæ, formatæ sapienter: aut sint ex ligno unde fiunt cribra, quæ fiunt ex pino. aut geraid, id est, ramis palmarum, aut calingi: & sit amplitudo omnis Astellæ, secundū hanc formam, & hanc eandem figuram.

Astellarum
forma.



D Verūtamēn oportet, ut Astella quæ ponitur super ipsam fracturam, sit grossior & latior parūper, quam reliquæ Astellæ: & longitudo Astellæ sit secundū quod licet mēbro ex magnitudine & paruitate. Deinde stringe super Astellas cum uitta aliā, secundū stricturam primā eandem. Deinde liga desuper cum filis decēter, secundū quod diximus de strictura: & est, ut sit strictura tua super locū fracturæ plus: & quanto plus elongat a fractura sit, strictura minor. Et oportet, ut sint fila media in grossitudine & subtilitate, et sint ex lino molli. quoniam si fila sunt grossa, sicut uidi ex operatione stolidorum ponentiū fila sua ex chordis lini tortis, est error magnus: quoniam cadit strictura cū eis extra qualitatem. Et fila subtilia iterū non conueniūt: quoniam tu non consequeris per stricturam cū eis illud quod uis. Et nō oportet, ut sit inter astellam & astellam minus quam digitus. Quod si lædīs infirmus per extremitates astellarū post stricturam in locis sanis: tunc pone sub eis ex stuppa leni, aut lana carminata, donec nihil lædatur ex illo.

Quando autem est fractura cum uulnere, & accidit disruptio in cute, ego ueniam cum rememoratione eius in capitulo secundū singularitatem. Et scias, quod non omne membrum fractum oportet ut stringatur cum astellis a primo die. Quod est, quia membrū quando est magnū, non oportet ut ponas super ipsum astellas, nisi post quinque dies, aut septem, aut plus, secundū securitatem tuam ab euentu apostematis calidi.

Et iste est modus emplastrorum, quibus restaurabant antiqui, quæ A
ponuntur super fracturam & dislocationem.

¶ Modus Emplastri cōmunis abbreviati, restaurans fracturam, con-
ueniens pluribus complexionibus, præcipue mulieribus, & pu-
eris: quoniā est ex eo super qđ non uincit calor, neq; frigus.

Et est, ut accipias ex puluere molendini, & est medulla farinæ quæ Emplastrorū
pendet in parietibus molendini apud motū molæ: & conficias ipsum modi.
sicut est, præter quod cribelles ipsum cū albugine oui: & pone confecti-
onem eius non spissam, neq; subtilem. Deinde utere eo.

¶ Modus Emplastri alius, restaurantis fracturam, &
dislocationem, & torsionem.

Recipe almefs, & laudani, et acaciæ, & enulæ, et mugath: & suc. o-
mnium ana. 3. x. myrrhæ, & aloes amborum ana. 3. v. & alethil. 3. xx.
terantur omnia, & cribellentur, et misceantur cum aqua alethil: aut cum
albugine oui, si complexio infirmi est calefacta. Deinde utere hoc em-
plastro. nam ipsum est bonæ compositionis, restaurat ossa fracta uelo-
citer, & confert pluribus hominibus.

¶ Modus Emplastri alius, quod etiā confert fracturæ & torsioni.

Recipe mugath, & mels, et alteæ albæ, omnium ana. 3. x. myrrhæ,
& aloes amborum ana. 3. v. acaciæ. 3. vi. boli armeni. 3. xx. terantur o-
mnia contritione multa, & cribellentur, et conficiantur cum aqua, aut
albugine oui: & administrantur.

¶ Modus Emplastri ad iuncturas, & ossa separata ex locis B
suis: & sedat dolorem accidentem eis, et scissu-
ram ossis, & fracturam.

Sumatur lana succida, et submergatur in aceto, & oleo decocto: et po-
natur super locum. Et in hoc quidem Emplastro non est uirtus restau-
rationis, sed est bonum in sedatione apostematis calidi: & expellit do-
lores proprie.

¶ Modus Emplastri, quod restaurat os fractum.

Sume folia fici furdi, & folia papaueris syluestris: & tere omnia, et
fac emplastrum ex utrisq;.

¶ Modus Emplastri abbreviati, administrati apud restau-
rationem fracturæ ossis: et quando tu uis resolu-
tionem residui apostematis.

Recipe radicis alteæ, & camomillæ, et florum uiolarum, & farinæ her-
bi, omnium ana. partem unam: terantur omnia, et conficiantur cum ui-
no, si non est membrum calefactum. Si uero est calefactum, tunc confici-
ce illud cum aqua coriandri humidī, aut cum aqua, et utere eo.

¶ Modus Emplastri alius fortioris in resolutione, quā istud primū,
quando accidit apostema durū apud restaurationē membri.

Recipe radicis alteæ, & seminis lini, et balauistiæ, & melliloti, et sama-

C fuci, & floris uiolarum, et camomillæ, omniū ana, partem unam, terantur omnia, et conficiantur cum aqua salicis, aut cum aqua dulci, aut cum uino. Totum illud secundū caliditatem mēbri, & quietem calorīs eius. Hippocrates uero non dixit in libro suo, quod ponatur super membrū fractum apud restaurationē eius, nisi cærotum factum ex cæra, & oleo: non aliud: & narrauit, ut sit mediū inter grossitudinem & subtilitatem. Galeno autem uisum est, ut ponantur super membrū fractum apud restaurationem eius res, in quibus est exiccatio caliditatis, sicut myrrha, & aloes, & olibanum, et similia eis ex eis quæ narrauimus.

¶ **Modus Emplastri quod confert ad lēSIONem & dolorem.**

Recipe mugath, & ciceris, et capillorum hominis incisorum, aut penne auis, & alteræ, et salis partes æquales: terantur, & cribellentur, et conficiantur: et fiat ex eo emplastrū. **Quantitas autē secundum quam oportet, ut remaneat ligatura, deinde soluat, est, ut consideres tunc, si non accidit infirmo dolor, neque pruritus, neque mouetur os fractum a loco suo; tunc non resoluas ipsum diebus multis. Quod si accidat ei in loco pruritus uehemens, aut dolor inquietans, aut inflatio: tunc propera, & solue in hora ipsum, et aufer emplastrum ab eo: & accipe pannū lenem, aut spongiā marinā lenem, humidā: & submerge eam in aqua tepida, & ablue cum ea locum, donec quiescat pruritus, et sedetur dolor.**

D Deinde dimitte membrū quiescere una hora. Deinde pone super ipsum lanā succidā, submersā in aceto & oleo, aut oleo rosato: & liga super ipsum nocte una, donec sis securus ab apostemate, calido, et quiescat inflatio membri, & remoueat dolor eius. Deinde itera ipsum ad strictionem subtilem, et emplastrum paruum: & non stringas ipsum constrictione tua prima, et subtilia cum eo, donec sanetur. Quod si uides, quod apostema, & rubedo, et dolor, & inflatio, et omnia accidentia iam remota sunt penitus, & indiges emplastro & strictione, tunc itera illud sicut fecisti in primis æqualiter. Quod si non accidit membro aliquid ex eis quæ diximus, tunc non soluas ipsum, nisi post tres dies, aut quatuor, aut quinque, aut septem. Et quandoque dimittitur uiginti diebus totum illud, secundum quod apparet tibi ex solutione membri, sicut diximus, donec quando adheret fractura, & approximatio coagulatio carnis super eam: adde etiam tunc in strictione plus quam strictione tua prima tota: & adde etiam in ingrossatione cibi infirmi, secundum quod præcessit rememoratio eius.

Si autē uides locū fracturæ iam exiccari, et extenuari plus quam oportet: tunc scias, quod nutrimentū prohibetur peruenire ad ipsum. Embroca ergo ipsum cū aqua tepida apud omnem uicem qua soluis ipsum, & sit illud in omnibus tribus diebus, et alleuia strictionē parūper. Per hanc ergo operationē currit ad membrū nutrimentū, et sanatur uelociter.

Illud autem quod faciūt stolidi restauratores ex fractura membri uis

Quando liga
mētum remo
uendum.

ce alia, quando non restauratur in primis, secundum quod oportet, & restauratur secundum tortuositatem, est error ex operatione eorum, et timor magnus: & si esset rectum, dixissent illud antiqui in libris suis, & operati fuissent cum eo. Et ego nō uidi alicubi eorum uestigium in illo omnino, & rectius est, ut non fiat illud.

¶ De fractura accidente in capite.

Caput III.


S P E C I E S fracturæ sunt diuersæ, & figuræ eius multæ: et causæ eius sunt distinctæ. Nam ex fractura est quæ fit a percussione cum ense: & percussio aufert os totum usquequo peruenit ad siphac, quod est sub osse, sicut facit axia in ligno: & propter illud nominatur hæc species fracturæ Axialis. Aut ensis incidit quiddam ossis, & incidit faciem eius, & non penetrat incisio usque ad ultimum eius: et nominatur hæc species fracturæ Kalaan, id est, Leuatio absolute. Et est uulnus duarum fracturarum, aut magnum, aut paruum. Et ex fractura est, quæ est contritio, aut attritio: & causa eius est percussio cum lapide, aut casus super lapidem, aut eis similia. Et hæc fractura est etiam aut penetrans, quæ iam appropinquat panniculo, quod est sub osse: aut est in facie ossis: & est uulnus harum duarum fracturarum etiam aut paruum, aut magnum. Et ex fractura est, quæ est occulta in osse in subtilitate capilli: & est fissura parua, et propter illud nominatur hæc species fracturæ Capillaris. Et ex eis est fractura, quæ fit a casu, aut percussione lapidis, & eis similibus, quæ faciunt ingredi laminam ossis ad interiora, & fit loco concavitas: sicut accidit caldarijs æris, quando occurrit eis percussio, & ingreditur pars eorum ad interiora. Et plurimum quidem fit illud in capitibus humidorum ossium, sicut sunt capita puerorum. Et fiunt omnibus istis speciebus fracturæ fatagiæ separata, & ego ueniam cum rememoratione illius totius in loco suo. Et cognoscimus omnes has species fracturæ per detectionem super eam, & inquisitionem earum cum tentis, et ablationem carniū corruptarum, quæ sunt super eas. Species uero Capillaris cognoscitur per hoc, quod detegitur super os, et abstergitur, & linitur super ipsum cum encaustro: fractura enim apparet nigra. In curatione autem fracturæ, considera in primis accidentia infirmi: tunc si uides ex accidentibus quod significet significatione manifesta super timorem, sicut uomitus cholera, & extensio, et amissio intellectus, & abscissio uocis, et syncopis, et febris acuta, & egressus oculorum, & rubedo eorum, et similia eis ex accidentibus in pluribus dispositionibus, proculdubio non sanatur: & si uides accidentia non terrena te, & speras salutem: tunc incipe curationem eius.

Quod est, si uenit ad te uulneratus in primis cum uulneratur: & est


Species fracturarum capitæ.

Signa uulneris non curabilis.

Hoc Instrumento
utimur, ubi caput in su-
periorib9 cōtūsum est,
& ossa fracta depresso,
ut cum eo illa commo-
dius extrahamus.



¶ Hoc uero Instru-
 mento utimur, ubi ca-
 put in lateribus timpo-
 rum uulneratū, & con-
 tufum est. Vnde labia
 eius latiora sunt prio-
 re. Extrahit enim sub-
 tilitate terebri, facilius
 fracturas offium.




- C** illud in diebus hyemis, tunc oportet, ut studeas in ablatione ossis ante diem quartumdecimum secundum omnem dispositionem. Et si est in diebus æstatis, tunc oportet, ut properes remouere os ante diem septimum, antequam corrumpatur quod est sub ossē ex panniculo, et accendant illa accidentia quæ narrauimus. Quod si fractura ossis iam peruenit ad panniculum tangentem cerebrum, & est cum minutis, & attractione: tunc oportet, ut incidas partem cōminutam, & attritam, secundum quod narro tibi. Et est, ut radas caput uulnerati: & detege super os secundum quemcūq; modum possibile est tibi: & secundum figuram uulneris, & quod leue est super infirmum. Quod si accidat tibi apud detectionem ossis fluxus sanguinis, aut apostema calidum: tunc oppone ei cum eo quod oportet. Et est, ut impleas locum cum pannis infusis in uino, & oleo rosato: et facias quiescere uulnus, donec sedetur apostema, & sis securus a fluxu sanguinis. Deinde incipe in curatione ossis, et ablatione eius. Et illud fit secundum unum duorum modorum. Modus quidem unus est, ut incidas os cum Incisorio stricte aciei: & hæc est forma eius.

Incisorium
strictum.



- D** Deinde administra Incisorium aliud post Incisorium latius eo parumper: & hæc est forma eius.


Incisorium
latius.




Deinde administra etiam Incisorium aliud latius etiam quā secundum. Et modus secundus est, ut sit apud te numerus Incisoriorū diuersorum: quorum quædam sint latiora quibusdam, & quædam eorum breuiora quibusdam: & sint in ultimo acuitatis extremitatum suarum, & sint ex ferro indo, aut fuled: & utere facilitate in percussione super Incisorium, ut non concutiat caput, & lædat ipsum. Si autem os est forte, durum: tunc oportet, ut perfores in circumitu eius, antequam tu administres Incisoria, cum Terebris quæ nominantur Terebra non profundaria: & non nominantur ita, nisi quoniam ipsa non pertranseunt terminū ossis carnei ad illud, quod est post ipsum: propterea, quod Terebro est extremitas rotunda super illud, quod est sub capite eius acuto, similis margini, & circulus paruus prohibet submergi, et pertransire spissitudinem ossis. Et cōuenit tibi, ut accipias ex istis Terebris numerū multum, quorum unumquodq; conueniat quantitati spissitudinis ossis, donec præsens sit tibi omni craneo Terebrum: cuius extremitatis acuta quantitas in longitudine & breuitate sit, secundum quantitatem spissitudinis illius cranei. Et hæc est forma trium specierum Terebrorum, uel Trepanorum.

Terebra non
profundaria.

A




Terebra.



Qualitas autem perforandi in circumitu ossis fracti, est: ut ponas Terebrum super os, & reuoluas ipsum digitis tuis, donec scias, os iam penetratum esse. Deinde permuta Terebrum ad locum alium, et pone quod est inter omne foramen quantitatem grossitudinis radii, aut circiter illud. Deinde incide cum Incisorij quod est inter omne foramen ex osse: & fac illud subtilius quam potes super illud ex fine leuitatis, sicut diximus, donec eradices os, aut manu tua, aut cum aliquo alio ex quibusdam instrumentis, quae parasti ad illud: sicut tenalia, & forpices subtilis. Et oportet, ut caueas omni cautela, ne tangat Terebrum, aut Incisorium aliquid ex siphac. Cum ergo circumieris os perforando, et separatum fuerit a siphac, si fuerit continuum cum eo, & extraxeris ipsum, oportet ut radas, et aeques extremitatem eius quod remanet in osse cum instrumento alio simili Incisorio. Verumtamen oportet, ut sit tenuis & subtilis magis alijs Incisorijs. Quod si remanet aliquid ex ossibus paruis, & satagiis: tunc accipe ea cum facilitate, cum eo quod est apud te ex instrumentis. Deinde cura uulnus post illud cum lincinijs, & unguentis quae diximus.

Et modus alius operationis est facilis, prorsus longinquus a timore: quem dixit Galenus, & laudauit ipsum laude magna: & iste est sermo eius. Necessesse est tibi in primis, ut incipias detegere partem ossis ex loco, in quo fractura est uehementior, & manifestior: donec quando detexeris illam partem, et posueris sub eo extremitatem huius Incisorij lenticularis, cuius haec est forma.

Operatio
Galeni.Incisorium
lenticulare.

Et pars lenticularis, lenis non incidit aliquid: et pars acuta eius in duabus partibus eius uadens in longitudinem, sicut uides: ut sit pars lenticularis innixa ad siphac, facie eius incidere acuta in osse. Deinde percutite super Incisorium a parte una cum malleo paruo, donec incidas rotundum os cum facilitate, sicut reuoluitur: & tu sis securus ex panniculo, quod non accadat in eo accidens, quod timeas prorsus. Et si medicans non esset

C stultior hoim, et magis ignarus eius, nec esset dormiens, tunc si remaneret aliquid annexum ossi ex panniculo in quibusdam locis, incidere ipsum ab eo cum extremitate incisori lentiuscularis ipsius, & liberaret ipsum ab eo cum facilitate. Liberatur enim ab eo sine nocumēto, et absq; timore.

Et si fractura ossis non penetret usque ad panniculum, & illud quod abscinditur ab offe est facies eius, & remanent in ipso asperitas & sagax subtilis: tunc oportet, ut radas illam asperitatem, et eradices illas sagaxias cum rasorijs subtilibus ex quibus præparasti numerum diuersarum quantitatum, ut sit tibi possibile administrare ex eis in omni loco conuenientiora eorum, & rectiora ipsorum, secundum illud ad quod perducit te operatio, & ipsum os fractum, et figura eius. Et oportet, ut administres in ratione tua, qua in primis radas os, latius illorum rasorium. Deinde utere post ipsum subtiliore eo. Et non cesses facere illud secundum continuitatem, donec peruenias ad administrandum tenuius, & subtilius eorum omnium. In unaquaq; autem fissurarum reliquarum paruarum capillarium, & fractura subtili, oportet ut administres eam, secundum illud quod perducit ad rectificationem eius. Et est res quæ non occultatur super omnē, cui in hac arte est quodlibet studium, & stetit super illud, quod scripsimus, et ostendimus in fracturis magnis.

D Si autem panniculus detectus retinetur, quando tu eradicas os: tunc oportet, ut accipias pannum lini, secundum quantitatem uulneris, et submerge ipsum in oleo rosa. & pone ipsum super orificium uulneris. Deinde accipe pannum alium duplicatum, aut triplicatum, et submerge ipsum in uino & oleo rosa. et pone ipsum super pannum primum: et fac illud quam facilius potes super illud, ut nō grauetur super hac. Deinde administra supra ipsum ligamentum latum: et non stringas ipsum, nisi per quantitatem quæ tenet uulnus tantum: & dimitte ipsum cum hac cura die uno, aut diebus duobus, donec sis securus ab apostemate calido. Deinde solue ipsum, et administra post illud medicinas cum quibus est superflua siccitas: sicut radices lili, & farina herbi, et puluis thuris, & aristolochia, et similia eis: & est, ut facias ex istis medicinis puluerem, qui puluerizetur super uulnus sicut sunt sicce. Et uniuersaliter administra in illo omnem medicinam de proprietate cuius est ut abstergat, & non mordicet. Et caue secundum tuam uirtutem, ut uulnus in curatione tua sit limpidum: neq; sit in ea sordes unguenti, neq; sordicies. Neq; dimittas uirus aggregari in eo omnino: quoniam quando uirus aggregatur super panniculum cerebri, corrumpit eum, et puer facit ipsum: & accidit super infirmum post illud malicia magna: & iam accidit in super capitis, cum mundificatur ab eo os, præcipue quando negligitur cura eius, nigredo in superficie eius. Considera ergo tunc, si accidunt infirmo accidentia quæ diximus, scias, quia est perniciosum proculdubio. Et si nigredo non accidit, nisi a medicina quæ ponitur super ipsum, & est in

uirtute illius medicinae, ut faciat illam nigredinem: tunc oportet, ut accipias ex melle partem unam, ex oleo rosato partes tres, & linias cum eis pannum. Deinde pone ipsum super siphac: postea cura ipsum cum speciebus curationis quae conueniunt, donec sanetur.

¶ De restauratione Nasi quando frangitur.

Caput

IIII.

S C I A S, quod non franguntur ex Naso nisi duæ partes eius superiores simul, aut una earum: propterea, quod ipse sunt duo ossa: quoniam inferius eius est cartilaginosum, non frangitur, et non accidit ei nisi attritio, & tortuositas, et simitas. Si frangitur una duarum partium eius, tunc oportet, ut intromittas digitum paruum in foramen Nasi, & æques illam fracturam digito tuo indice, & pollice de foris, donec redeat Nasus super figuram suam naturalem: & fiat illud arte, cum facilitate. Et caue, ne accadat per operationem tuam illam super infirmum dolor. Quod si fractura est in superiore parte Nasi, & non perueniat ad illam digitus: tunc oportet, ut æquetur extremitate radij, in quo sit grossitudo parua. Si uero fractura est in duabus partibus, tunc fac simile illius: et propera cum restauratione eius in die primo fracturæ, si est possibile. Et si non, tunc post diem septimum, aut decimum apud quietem apostematis calidi. Deinde intromitte in extremitate Nasi licinium ex panno lini, si fractura est in parte una: aut intromitte duo licinia, si fractura est in duabus partibus: & sit in licinio grossitudo tantæ quantitatatis, quæ impleat foramen Nasi. Et dixerunt quidam antiquorum restitutorum, ut infundantur licinia in butyro, et permutentur omni die. Illud uero non uidetur mihi, imo oportet, ut infundatur licinium in albugine oui, confecto cum puluere molendini. Deinde dimitte licinium, donec firmetur os, & induretur cartilago. Et quandoque intromittitur in Nasum loco licinij penna anseris, postquam inuoluitur super ipsam pannus lenis: & sit, quod ipsa tenet fracturam Nasi uehementius, & ut non prohibeatur infirmus ab inspiratione. Et non est hæc res necessaria, si uis, fac illud: et si uis, fac licinia. Quod si accidat Naso iterum dum operaris apostema calidum, emplastra nasum cum caroto, aut cum corio infuso in oleo rosato, aut modico ex dyaaquilon. Si autem non accidit apostema calidum, tunc oportet, ut emplastres ipsum cum farina sifami, & puluere thuris confecti cum albugine oui. Deinde pone super ipsum stuppam lenem, & non liges Nasum cum aliquo omnino. Si uero franguntur ossa Nasi fractura parua, aut comminuuntur, tunc oportet, ut scindas super ea, & extrahas ipsa cum instrumentis quæ conueniunt eis. Deinde sue scissuram, & cura ipsum cum eo quod incarnat, & consolidat ex emplastris conuenientibus ad illud, uel unguentis. Quod si accidat inter Nasum uulnus, tunc oportet, ut cures ipsum cum licinijs: & administres cannulam de plumbo, donec sanetur.

C

Q

¶ De restoratione Mandibulæ inferioris, quando disrumpitur. Caput v.

VANDO disrumpitur Mandibula inferior, & fractura eius non est cum uulnere: conspice tunc si est fractura eius de foris tantum, & non frangitur in duo, et curuatur ad interiora: tunc cognitio eius est facilis. Oportet ergo, si est fractura eius in parte dextra, ut intromittas digitū indicē sinistrę in os infirmi: similiter si fractura est in mandibula sinistra, tunc intromitte indicē manus dextrę: & impelle cum eo gibbositatem fracturę deintus cum facilitate ad exteriora cum manu tua altera ab interiori parte ossis decenter, & cum eo æqua ipsam.

Quod si fractura mandibulæ iam separata est in duo, tunc oportet, ut administres extensionem a duabus partibus, secundum rectitudinem: donec possibilis sit æquatio eius. Si autem iam accidit in dentibus commotio, aut disruptio: tunc stringe illos de quibus speras quod remaneant cum filo auri, aut argenti, aut seta. Deinde pone super mandibulam fractam cærotum. Deinde pone super ipsum pannum duplicatum, & pone super pannum astellam magnam decenter factam: aut frustum cutis soleę æquale, in longitudinem mandibulæ. Deinde liga ipsum desuper, secundum quod præparatur tibi ligatura eius, et conuenit ipsius applicatio, donec non destruiť: & præcipe infirmo, uti tranquillitate & quiete: et pone cibum eius sorditiones lenes.

D

Si autē est imas, quod iam alteratur aliquid figurę aliquo modorum: tunc propere, & solue ipsum in die tertio. Deinde rectifica quod alteratum est ex eo, & emplastra ipsum ex puluere molēdini, cum albugine oui, aut cum farina sisami, postquam tu abstuleris cærotum: & pone super emplastrum lanam lenem. Dum ergo permanet annexum illud emplastrum super ipsum, & non alteratur ossis dispositio, dimitte ipsum, ne soluas, donec sanet: aut stringe fracturam. Multotiens enim stringitur hæc fractura in tribus septimanis. Quod si interim accidat apostema calidum, tunc administra illud quod diximus multotiens in sedatione eius, donec remoueat̃ illud apostema. Et si fractura est cum uulnere, considera. Nam si iam separatur ex osse frustum, aut a satagie: tunc subtilia te in hoc, ut auferas illa frustra satagie cum eo quod conuenit tibi in ablatione eorū ex instrumentis. Si uero orificium uulneris est strictum, tunc amplifica ipsum cum phlebotomo secundum quantitatem necessitatis tuę. Deinde quando abstuleris illa satagie, et non remanserit ex eis aliquid, sue tunc orificiū uulneris, si est amplum: & si non, pone super ipsum ex emplastris quę conueniūt ad illud, et incarnant illud, donec sanctur.


P

¶ De restoratione Furculę, quando frangitur.

Caput VI.

LV R I M V M quidem frangitur Furcula ab anteriore parte ex parte humeri, & fractura eius fit secundum unum teium modorum.

Aut enim frangitur & separatur in duos, præter quod accidunt in ea fatagiae: et est facilius ad restaurationem eius. Aut ita, quod accidunt in osse fatagiae: & est difficilius ad restaurationem. Aut ita, quod est fractura cum uulnere. Et operatio in ea quando fractura est absque uulnere, est, ut facias præsentem esse duos ministros, ut teneat unus eorum adiutorium quod sequitur Furculam fractam, & alter extendat collum uersus partem. Deinde æqua fracturam digitis tuis, donec fiat forma eius, secundum quod oportet: & non sit in ea eminentia, neque concavitas. Quod si indiges extensione plus, tunc oportet, ut ponas sub titillico infirmi spheram ex panno, aut lana: & sit magnitudo eius secundum quantitatem necessitatis tuæ: & extende, et eleua Furculam, & coarta spheram manu tua, donec æques fracturam, secundum quod oportet. Quod si non potes trahere extremitatem Furculæ ad exteriora: propterea, quia peruenit ad profundum: tunc oportet, ut resupinetur infirmus super ceruicem suam: & ponas sub humero eius puluinar medium in magnitudine, & premat minister humerum eius ad inferiora, donec eleuetur os Furculæ quod est in profundo ad sursum: atque tunc rectifica fracturam, & æqua eam digitis tuis. Si autem sentis sathaiatum ex Furcula, & mouetur: tunc oportet, ut findas super illud, & extrahas ipsum assathaiatum cum facilitate. Si autem est retentum in osse, tunc ingenia in incisione eius cum uno Incisoriorum quæ præparasti ad illud, postquam tu posueris sub Furcula instrumentum quod seruat sisach: & est instrumentum ex ligno, aut ex ferro. Et hæc est forma eius.



Assimilatur cochleari cui non est concavitas. Et sit latitudo eius secundum illud quo indiges eo ex magnitudine ossis, & paruitate eius. Longitudo uero eius etiam secundum quod possibile est tibi ad operationem. Et habeat duas extremitates, sicut uides: & extremitas una sit ampla, & altera stricta. Si autem disruptio uulneris quod scidisti quando extraxisti sathaiatum ossis, est ampla, et securaris ab apostemate calido: tunc aggrega duo labia uulneris cum futura. Et si disruptio est parua, aut times apostema calidum: tunc imple uulnus cum pannis, & puluillis secundum quantitatem scissuræ uulneris. Quod si accidat apostema calidum, tunc infunde pannum in oleo rosato, & aceto, et uino, & pone super ipsum. Strictura uero ossis quando est absque uulnere, et absque sectione, est, ut ponas super os emplastrum factum ex farina molendini cum albugine oui. Et pone stuppam lenem super ipsum. Deinde pone spheram sub titillico eius, si indiges illa. Deinde accipe himematem, id est, rotam quam tenent Saraceni, quæ sit longa ualde: & sit latitudo eius palmi unius, aut circiter illud. Deinde pone puluillum duplicatum super stup-

C. pam & emplastrū. Deinde accipe astellam ex tabula subtili, cuius latitudo sitrium digitorū, & in longitudine similiter. Deinde inuolue eam in panno. Deinde inuolue pannū illum cū astella in loco alhimemati qui cadit super fracturam & locū. Deinde pone alhimemati super fracturam sicut reuoluit, & inuolue eam super collū eius, et sub titillico eius sano, & sub titillico eius infirmo: et reduc eam super omnē partem, & quomodo uides quod strictura tenet fracturam strictura decenti: et est illud, qd non occultatur super te, & totū, ut non remoueat astella de super os fractum. Et propter hoc oportet, ut aspicias infirmū in omni die. Quotiens ergo mollificatur ligamentū, & uides astellam iam remoueri: tunc rectifica illud, & stringe ligamentū. Deinde pone somnū infirmi super dorsum eius, & pone sub titillico eius apud somnū eius puluinar parū in nocte, ut cum eo eleuetur adiutorium eius a latere ipsius. Eleuatur ergo fractura furculæ per eleuationem humeri. Aut liga brachium eius ad collum ipsius: & non soluas ligamentum, si non accadat in loco accidens ex pruritu, aut ab apostemate, usq; ad duodecim dies. Deinde renoua emplastrum, si uideris faciem eius ad illud. Et adde in strictura, et dimitte ipsum, donec restauretur & cōaguletur. Et fractura quidem furculæ stringitur & confortatur secundum plurimū in uigintiocto diebus: & quandoq; fit in quibusdam hominibus in minore illo.

D **R** De restauratione fracturæ Spatulæ.
Caput VII.

RARO frangitur Spatula, & in loco lato eius: & non franguntur ex ea nisi margines eius. Quando ergo frangitur ex eo locus, & frangitur in medio eius, & non cognoscitur illud nisi per tactum: tunc secundum quod est figurā fracturæ conare præparatiōem eius. Et reduc eam super figurā naturalem, omni modo ingenij, quod est tibi possibile. Deinde pone super locum puluerem molendini cum albugine oui, et stupam lenem, & pone de super puluillum ex panno duplato. Deinde pone super ipsum astellam latam ex tabula subtili secundum quantitatem Spatulæ totius, aut ampliorem ea parū. Si uero sub astella est concauitas in aliquo locorū Spatulæ, tunc æqua illam concauitatem cū stuppa leni, donec descendat astella secundum æqualitatem. Deinde stringe de super cū alhimemati longa, constrictione decenti, & firmitudine astellæ, donec non remoueat a loco suo. Et considera ligamentū in omni die. Quotienscunq; ergo mollificatur ligamentū, stringe ipsum, et æqua astellam si remoueat a loco suo: & iaceat infirmus super latus suū facium. Et Spatula quidem restaurat in uiginti diebus, aut in uigintiquinq; diebus. Quando ergo complet iste numerus, tunc solue ligamentū: & tu sis in securitate, nam ipsa est ex ossibus, quorū communio non timetur, neq; eorū solutio. Si aut procedat ex osse frustum, & pungit sub

cute: tunc scinde super ipsum, & aufer ip̄m. Et fac quod diximus in fractura furculæ ex sedatione apostemat̄is calidi, si accidat ex eo aliquid. A

¶ De restauratione fracturæ Pectoris.

Caput

VIII.

PE C T V S quandoq; frangitur in medio sui, & raro accidit illud. Extremitates eius quidem plurimū franguntur, & comminuuntur ex accidentibus eius. Quando frangitur eius mediū, quod declinat ad inferiora, & accidit ei dolor uehemēs, & difficultas in anhelitu, & tussis: & fortasse euomit sanguinem, & declaratur concauitas in ossē fractio, & non occultatur sensui, Restauratio eius est, ut resupinetur infirmus super dorsum suum: & pone inter Spatulas eius puluinar. Deinde preme humeros eius, & aggrega costas a duabus partibus uel lateribus cū manibus: & subtiliare in æquatione eius, secundū omnem modū quo possibile est illud & cōuenit, donec redeat figura ossis, secundū quod oportet. Deinde pone super ipsum emplastrū & stuppam; et pone desuper astellam ex tabula subtili ex salice, aut chalingi, & ex eis similibus in leuitate, postquam tu inuoluis eam in panno. Deinde subtiliare in ligando eam super os fractū, ut non remoueat: & uade cum ligatura secundum rotunditatem ad dorsum aliquotiens, & stringe ipsum stricture decenti. Deinde considera ligaturam in omni hora; & quotienscūq; mollificat, stringe eam: & si necessitas eius prouocat ad solutionem eius apud pruritū, uel corrosionem quæ accidit in loco, aut dolorem, aut apostema: tunc prōpera, & solue eam, et radica emplastrum, & rectifica quod accidit cum modo curationis eius. Deinde reduc emplastrū, si uides ad illud faciem: & annecte ei stricturem, donec sanetur.

¶ De restauratione Costarum, quando franguntur.

Caput

IX.

SC I A S, quod Costarū fractura non accidit, nisi in locis grossis quæ sequuntur dorsum, & ex extremitatibus earum ab anteriori parte. Et non accidit eis attritio, nisi propterea, quia sunt cartilaginosa. Et cognitio ipsius non occultatur sensui apud inquisitionem cum digitis. Et restauratio eius fit ita, ut æques fracturam cum digitis secundū modum possibilem, donec æquetur figura, secundū quod oportet. Deinde emplastra, & stringe os fractū cum astella, si indiget illo. Et si fractura Costarum est decliuis ad interiora: tunc accidit infirmo dolor uehemens, & punctura, sicut punctura illa quæ accidit illi qui habet pleuresim: propterea, quod os pungit uelamen, et etiam ei accidit difficultas anhelitus, & tussis, et uomitus sanguinis multi: & hæc est difficilis curationis. Et iam ingeniati sunt antiqui in ea cū ingenijs multis: & ex eis sunt qui dicunt, ut ponas cibos infirmi qui generent inflammationem & uentositatem, ut inflammetur uenter, et extendatur, & impellatur fractura ad exteriora. Nos uero abhorremus, ut nō fiat causa uelox ad faciendū apo-

C stema calidum, si non accidit. Si autē iam accidit, tunc addit in eo. Et dixerūt quidam eorū: ponatur super locum uentosa, deinde fugatur cum fortitudine. & est similis ratio cinationi. Verūtamen timetur, quod attrahat uentosa superfluitates ad locum, propter dispositionem debilitatis. Et dixerunt quidam eorū: oportet ut cooperiat locus cum lana quę iam submersa est in oleo calido: & ponantur puluilli inter Costas, donec impleatur: ut sit ligatura æqualis quando inuoluis eam secundum rotunditatem. Deinde curetur infirmus curatione pleureſis ex cibo & medicina. Quod si cōartat infirmum res uehemens, quam non tolerat, & os pungit uel amen punctura lædente, & timemus super infirmum: tunc oportet, ut scindamus super locum, & detegamus a Costa fracta. Deinde ponamus super ea instrumentum quod conseruat sisac, cuius rememoratio præcessit: & incidamus os cum facilitate, & incidamus ipsum. Deinde aggregemus duo labia uulneris, si est magnum cum futura: & curemus ipsum cum emplastris, donec sanetur. Quod si accidat interim apostema calidum, tunc propera, & infunde puluillos in oleo rosato, et pone super locum: & curetur infirmus cum eo quod conuenit apostemati. Interim etiam resupinetur super latus suum per quod dormit, donec sanetur.

D **O** De restauratione fracturę Spondilium dorsi & colli. Caput X.

S S. I. B. V. S quidem colli quandoq; aduenit fractura, & raro accidit eis attritio: et similiter Spondilibus dorsi etiam. Cum ergo accidit illud alicui, et uis scire, an sanetur, an non sanetur: tunc considera. Nam si uides manus eius iam mollificatas, et stupefactas, & mortuas: et non potest mouere eas, neq; extendere eas, neq; cōstringere eas: et quando constringis eas cum digitis tuis, et pungis eas cum acu, non sentit illud, & non sentit in eis dolorem: tunc scias, quia non sanatur, et in pluribus dispositionibus est mortale. Quod si mouet eas, & sentit in eis constrictionem cum digitis & puncturam: tunc scias, quia nucha ossis salua est, et quod infirmus sanabitur cum curatione. Quod si eueniat Spondilibus dorsi simile illius, et uis scire, an sanetur etiam, an non: tunc considera ad pedes eius: tunc si uides quod mollificati sunt, et accidit in eis illud quod accidit in manibus: deinde quando iacet super dorsum suum, egreditur uentositas & egestio absq; uoluntate: et quando resupinatur super uentrem suum, egreditur egestio sine uoluntate: et quando resupinatur super dorsum suum, et uult mingere, & non potest: tunc scias, quia est mortale, non ergo labores in curatione eius. Si uero non accidit ei aliquid ex illo, res est leuior. Et curatio eius quod accidit ex illo est, ut coneris sedationem apostematis caliditatis, ut ponas super Spondilem attritam oleum rosatū solum: aut cum uitellis oui assati. Pone super ipsam illud aliquoties in die, donec quando sedatur, apostema cat

lidum: tum pone super locum unum ex emplastris confortantibus, ex-
 iccantibus, & stringe super ipsum cum ligamento: et præcipe infirmo,
 ut utatur quiete & tranquillitate. Nec dormiat super partem cum qua
 inuenit dolorem, donec sanetur. Quod si accidit apud attritionem
 ossis fathaiatum, aut aliquid quod iam separatū fit ex eo: tunc oportet,
 ut feces super cutem, & auferas illud. Deinde aggrega duo labia vulne-
 ris, si est magnum, cum sutura. deinde cura ipsum cum aliquo incarnati-
 uo, ex unguentis, donec sanetur. Si uero frangitur postremū ossis al-
 hausos, & est finis caudæ: tunc oportet, ut intromittas pollicem manus
 sinistrae in anum, & æques os fractū manu altera, secundum quod possi-
 bile est, & secūda æquatione. Deinde pone super ipsum, et aufer ipsum:
 & cura uulnus cum curatione quæ præcessit, donec sanetur.

De restauratione Anchæ. Caput xi.

R A R O franguntur ossa Ancharum. Quod si franguntur, tunc
 fractura eorum non est, nisi comminutio in extremitatibus is-
 pforum: & scinduntur in longitudine, et declinantur ad interiora: & ac-
 cidit infirmo dolor in loco, et punctura: & stupefcit eris quod frangi-
 tur. Et restauratio quidem eius est, ut extendas manum tuam super is-
 psum, donec stes super fracturam qualiter est figura eius.

Quod si fractura est in extremitatibus eius tantum, tunc æqua illam
 fracturam, secundum quod præparatur tibi ex æquatione, donec assimi-
 letur figuræ suæ naturali. Si autē fractura est in longitudine, aut iam de-
 clinat ad interiora: tunc fac iacere infirmum super uentrem suum, donec
 præparet tibi restauratio illius fracture. Quando ergo æquaueris ipsam,
 pone super ipsam emplastrum: deinde pone super ipsam astellam ex li-
 gno, aut ex cute: et stringe stricture super quam non timeas permutati-
 onem fracture, neq; remotionem astellæ. Et æqua concauitatem illorum
 cum eo quod impleat eam, donec capiat eam stricture secundum æqua-
 litatem: et præcipe infirmo, ut dormiat super dorsum suū, aut super latus
 suū sanum. Si autem accidat ei apostema calidum: tunc cessa ab extensi-
 one eius, et ipsius restauratione, donec sedetur apostema calidum: & po-
 ne super ipsum quod sedet ipsum, secundum quod præcessit, deinde re-
 di ad restaurationem eius: & stringe ipsum sicut oportet. Si

uero accidit in osse satagie, aut
 comminuitur, extrahe.


De restauratione fracture Adiatorij.

Caput xii.

A D I V T O R I V M est illud, quod est inter cubitum usq; ad
 caput Spatulæ. Si ergo frangitur, tunc restauratio eius est secundum u-
 num duorum modorum. Quorum unus est: ut accipias lignum planum
 mediæ grossitudinis, secundum hanc formam, quæ sequitur.

Adiatorium.

C



Et ligentur in duabus extremitatibus duo ligamenta. Deinde suspendatur ex loco eleuato: & sedeat infirmus super eadem. Deinde proficiat brachium suum fractum super lignum, donec perueniat ad titillicū eius, in cuius medio sit annexa curuitas ligni. Deinde suspende desuper ipsum aliquid graue, ut extendat ipsum minister ad inferiora. Deinde

æquet medicus fracturam manibus suis simul, donec redeat fractura, secundum quod oportet. Et modus alter est, ut resupineatur infirmus super ceruicem suam: & suspende manum eius a collo ipsius cum ligamento. Deinde præcipe duobus ministris, ut teneat unus eorum illud quod est supra fracturam cum manibus suis: & ut alter teneat inferius eius, & extendat unusquisque eorum ad partem suam. Et si uis, ut sit extensio fortior, tunc stringe sub fractura cum ligamento, & supra ipsam cum ligamēto alio: & extendat ea unusquisque duorum ministrorum ad duas partes suas. Si ergo fractura est propinqua extremitati humeri, tunc oportet, ut ponatur unum ligamentum sub titillico, & alterum sub fractura uersus cubitum. Et similiter si fractura est propinqua cubito: tunc oportet, ut ponatur ligamentum super illum locum, & super cubitum ipsum.

D

Deinde æqua fracturam cum facilitate absque labore, donec quando æquatur fractura secundum quod oportet, & applicatur applicatiōe bona: tunc stringe eam, si non accidit apostema calidum. Si uero accidit apostema calidum, tunc dimitte stricturam usque ad diem septimum. Et pone super ipsum lanam succidam imbibitam in aceto & oleo rosato, donec quando quiescit apostema: tunc stringe eam: & modus stringendi eam est, ut ponas emplastrum super fracturam. Deinde pone inuolutionem ex panno nouo super emplastrum. Deinde aggreget brachium super adiutorium ipsum, & ponat manum suam apertam super humerum suum. Et pone pannum, & stringe super adiutorium brachium, ut brachium stet loco astellarum: si non prohibet te ab illo aliquid, neque alteretur super te aliquid ex osse fracto. Quod si times, quod alteretur super te ex osse fracto aliquid, tunc utere astellis: & est, ut ponas super fracturam ipsam astellam quæ sit latior & fortior reliquis astellis. Et ponas inter omnē astellam latitudinem digiti: & sit longitudo astellarum secundum fracturam cum additione trium digitorum ab omni parte. Deinde stringe super astellas stricturam quā dixi in principio capituli. Et est, ut sit strictura tua super locum fracturæ trichter. Et quanto plus elongatur fractura, sit strictura minor. Si ergo uides situm astellarum & stricturam, sicut diximus, in hora qua restauras membrum statim, tunc fac: & si times apostema calidum, tunc dimitte stric-

Acturam & astellas usque ad diem septimum, sicut diximus. Deinde considera ligamentū in omnibus tribus diebus, ut non accadat in loco pruritus, aut inflatio, aut prohibeatur cibus peruenire ad membrum, propter dispositionem superfluitatis stricturæ. Rectifica ergo illud totum, secundum quod diximus. Si uero es super fiduciam, ut non accadat ex illo aliquid: tunc non soluas ligamentum, nisi post tres dies, aut plus. Et sit dormitio infirmi super dorsum suum, & manus eius super stomachum suum: & pone sub adiutorio culcitram plenam lana æqualiter. Et considera in omni hora noctis, aut diei, ut non soluatur figura membri fracta, aut mollificetur ligamentum. Rectifica ergo illud totum uirtute tua. Et pone cibum infirmi secundū ordinem quem præmisimus, ita ut sit cibus subtilis in primis, donec incipiat os stringi: tunc oportet, ut ingrosses cibum eius. de consuetudine enim adiutorij & cruris est, ut stringatur in quadraginta diebus: tunc ergo oportet, ut soluatur, & administretur balneum, & medicetur cum unguētis quæ rectificant illud. Quod si fractura fuerit foeda, attrita: tunc non soluas ab ea ligamentum & astellas usque ad quinquaginta dies, & usque ad duos menses.

De restauratione fracturæ Brachij.

Caput XIII.

BRACHIVM est compositum ex duobus ossibus, quæ nominantur duo focilia. Quorum unum est paruum: & est illud quod sequitur pollicem. Et alterum est magnū, et est illud quod est positum sub paruo ab inferiori parte. Fortasse ergo frangitur focile maius solum, aut paruum: & fortasse franguntur simul. Quando ergo frangitur focile paruum superius, tunc restauratio eius est facilis, & sanatio eius est faciliior. Et quando frangitur focile inferius, est fractura eius mala, & sanatio eius difficilis. Et deterior ea est, quando franguntur duo ossa simul.


Si ergo os quod frangitur est focile parum superius, tunc conuenit medico apud restaurationem eius, ut ponat extensionem paruam cum facilitate, donec æquet ipsum. Si uero focile magnum est illud quod fractum est: tunc oportet, ut ponat stricturam fortiorem ualde. Et oportet, ut ponat figuram manus apud restaurationem eius, & ipsius extensionem extensam super puluinar. Et sit pollex manus ad superiora altior omnibus digitis: & sit articularis inferior omnibus digitis, uel reliquis: & infirmus sedens quadratus super seipsum, et sit puluinar coram eo, uel in directo eius, in altitudine, ut non incurrat infirmus laborem. Deinde extendat minister Brachium ab inferiori parte, aut manu sua, aut cum ligamento. Et minister alius extendat de super similiter. Deinde æquet medicus os, donec reducat ipsum secundum meliorem figuram quam potest. Quod si in fractura ossis sunt sagaxiæ, tunc conare reducere omne frustum in loco suo uirtute tua. Si uero apparet in

B
Ossa Brachij.

C eo sathaiatum separatim, & pungit cutem, et non est tibi spes in restauratione eius: tunc sinde super ipsum, & aufer ipsum secundum modum quem diximus in eis quæ præmissa sunt. Si autem fractura est cum uulnere, ego iam feci ad illud capitulum singulare, ergo accipe curationem illius inde. Quod si accidat in principio tuæ restorationis apostema calidum, tunc line pannum cum cæroto facto ex oleo rosato, & cæra alba, & sit medium inter spissitudinem & subtilitatem: et stringe pannum super ipsum strictura subtili, donec quando sedatur apostema: tunc remoue cæroto, & pone emplastrum præparatum ex puluere molendini cum albumine oui. Deinde pone astellas, & sit astella quæ ponitur super fracturam ipsam latior parumper, & fortior. Et scias, quod numerus astellarum Brachij est sex in pluribus dispositionibus: siue sit fractura in focili uno, aut in duobus focilibus simul. Deinde pone stricturam tuam super locū fracturæ fortiolem & uehementiore, & aliquanto plus cum strictura ad superiora fracturæ, aut ad inferiora eius: aut pone stricturam molliorem strictura eius parumper, secundū quod præcessit rememoratio eius in principio capituli. Et sint panni qui inuoluuntur super fracturam, panni lenes, humidi: & non sint duri, asperi. Et sit filum quo stringitur ex lino proprie, medium inter subule & grossum, sicut narrauimus. Et considera membrum & ligamentum post dies.

Quod si accidat aliquid cuius rectificatio sit necessaria, sicut pruritus qui accidit membro: tunc oportet, ut embroces membrum cum aqua calefacta, donec quiescat ille pruritus, & dimittas membrum non constrictum, donec quiescat. deinde itera stricturam.

Quod si strictura iam mollicata est, & os iam remotum, & similia illis: tunc rectifica illud totum uirtute tua, & considera iterum. Nam si nutrimentum prohibetur peruenire ad membrum, propter superfluitatem stricturæ, tunc oportet, ut mollices ipsum parumper, & dimittas ipsum aliquot diebus, donec currat ad ipsum nutrimentum, deinde stringe ipsum. Si autem non accidit infirmo aliquid eorum quæ diximus, tunc non oportet, ut soluatur, nisi post uiginti dies, aut circiter hos. Deinde suspendatur manus infirmi ad collum eius. Et sit collum eius æquale, & custodiatur uirtute sua a moribus agitatiuis. Et fac eum dormire super dorsum suum. Et scias, quod hæc fractura in triginta diebus, aut in triginta duobus diebus restauratur: & fortasse restauratur in uigintiocto diebus. totum illud est secundum dispositiones complexionum, & dispositiones uirtutis.

De restoratione fracturarum Manus. 
Capitulum XIII.
S C I A S, quod pectini Manus, & nodis digitorum raro accidit fractura. Et non accidit ei, nisi attritio multotiens. Quando ergo accidit

plantę fracturā, aut attritio: tunc oportet, ut sedeat infirmus quadratus: **A**
 & coram eo sit sedes secundum æqualitatem. Deinde pone Manum eius
 super eam extensam. Deinde extendat minister ossa fracta, et æquet
 ea medicus, donec quando coniunguntur coniunctione bona. Tunc o-
 portet, ut ponat emplastrum & stuppam, si non accidat apostema cali-
 dum. Deinde pone astellam desuper secundum quantitatem loci: & tu
 iam inuoluisti eam in panno lini. Si autē fractura est ad inferiora cir-
 citer uentrem plantę, tunc fac simile spherę ex panno: & præcipe infir-
 mo, ut cõartet super eam cum planta sua fracta: deinde stringat cum pan-
 no longo. Et sit astella ex corio, in quo sit lenitas, ut applicetur corium
 cum corpore plantę: et stringe eam, secundū quod oportet. Si autem
 fractura est ad exteriora, tūc oportet: ut ponas astellam desuper, et astel-
 lam aliam ab inferiori in planta: & sit manus aperta recta. Deinde pone
 stricturam, sicut reuoluisti manus: et extende inter digitos cum ligamēto.

Quod si accidat fractura alicuiusmodi digitorum, tunc si est pol-
 lex, æquetur secundum quod oportet. Deinde stringatur cum planta:
 & si amas, pone ei astellam rectam, paruam: ut eleuetur fractura, & non
 moueatur. Si autem fractura est reliquis digitis, sicut medio, & indici,
 aut auriculari, & anulari, tunc æquetur, et ligetur cum digito sano qui se-
 quitur eum: aut ligentur omnes secundum continuationem: & est meli-
 us. Aut pone super ipsum astellam paruam, sicut diximus in pollice. Et **B**
 considera in restauratione tua, & post ipsam dispositionem apostema-
 tis calidi: & oppone cum eo quod oportet, quando accidit aliquid ex il-
 lo, secundum quod iteratur eius narratio.

¶ De restauratione fracturę Coxę.

Caput

xv.

O S C O X A E multotiens frangitur, et declaratur sensui: quo-
 niam conuertitur ad interiorem & posteriorem partem. Et re-
 stauratio eius fit ita, quod stringitur ligamentum supra fracturam, et li-
 gamentū aliud sub fractura. Et infirmus prostretur super faciem suam.
 Deinde extendat omne ligamentū minister ad partem suam secundum
 æqualitatem: et hoc, quando est fractura in medio ossis. Si autem est fra-
 ctura propinqua radici Coxę, tunc sit ligamentum ad partem pectinis,
 ut cadat extensio ad sursum: & ligamentum aliud sub fractura. Et sic si-
 militer si est fractura propinqua genu, tunc sit ligamentū propinquum
 genu, ut sit extensio ad inferiora. Deinde æquet medicus os utriusq; ma-
 nibus suis, donec reducat ipsum secundum similitudinem figurę natu-
 ralis: & coniugatur os coniunctione bona. Tunc oportet, ut ponas em-
 plastrum & stricturam, si non accidit membro apostema. Quod si ac-
 cidat in eo apostema: tunc dimitte ipsum diebus aliquot, donec sedetur
 apostema calidum. deinde redi ad curationem tuam. Strictura autē eius
 ita sit. Oportet ut inuoluas super fracturam imema duram, id est, bin-

- C** dam:& dupla eam bis, aut ter:et remaneat ex ea superfluitas. Deinde in uolue crus, donec perueniat calcaneus apud radicem natis. Et intromitte filum longum inter Coxam & crus prope genu ad inferiora, & ueniant extremitates fili a superiori parte duarum partium. Deinde reuolue super Crus & Coxam quod superfluit ex alimema. Deinde pone super Coxam in loco fracturę ipsius astellas, & pone ex eis astellam unam super os cruris. Deinde imple uacuitates inter crus & coxam cum panis lenibus, ut æquet stricture. Deinde incipe cum stricture forti a medio super locum fracturę tribus inuolutionibus, aut quatuor. Et quanto plus elongaris cum ligamento a loco fracturę, sit stricture tua minor & mollior, et lenior. Deinde intende ad duas extremitates fili, quod tu intromisisti inter coxam & crus. Liga ergo cum utrisque tres astellas quę sunt desuper. Deinde uade cum duabus extremitatibus fili ad inferiora, donec peruenias ad cauillam pedis. Et cum utrisq; stringe etiam extremitates astellarum a parte altera, ut non remotueatur ligamentum ex loco suo. Deinde dimitte stricturem super illud, dum permanet, ita quod non accidat membro corrosio, neq; apostema, neq; inflatio, & similia eis. Quod si accidat aliquid ex illo. propere ergo cum solutione eius, & rectifica illud quod accidit inde totum, secundum quod diximus multotiens. Si uero in osse est frustū ex osse quod pungat: tunc oportet, ut æques illud, si est tibi possibile. Et si non, fide super illud, & remoue illud: & cura cum eo cuius præcessit rememoratio, donec sanetur. Et quandoq; stringitur hæc fractura Coxę, præter quod addantur ei astellę, sicut diximus in adiutorio & brachio. Verumtamen in restauratione eius taliter fracta, non accidit infirmitas claudicatio. Et si restauratur sola, præter quod applicetur ei crus alterum, tunc necesse est, ut claudicet ille cuius est, semper. Et scias, quod Coxa stringitur in quinquaginta diebus, uel additur parum, aut minuitur parum: totum illud est secundum diuersitatem complexionum, & reli-

quarum dispositionum.

¶ De restauratione fracturę Rotulę genu.

Caput XVI.

SC I A S, quod Rotulę genu raro accidit fractura, sed accidit ei attritio multotiens. Si uero accidit ei fractura, tunc non nisi aut fissura, aut foramen in partibus suis. Et est illud cum uulnere, & absq; uulnere. Et statur super illud totum cum sensu. Et restauratio eius est ita, ut æquetur quod disruptum est ex partibus eius cum digitis, donec aggregetur, & coniungatur secundum quod possibile est ex æquatione & facilitate, & fabricatione. Deinde pone emplastrum ex farina sisami, uel molendini, cum albumine oui: & pone super ipsum astellam rotundam, si indiges illa: & stringe desuper stricture cōueniente ad illud. Deinde considera omnes dispositiones quas narrauimus in reliquis fracturis: sicut

apostema calidum, & similia illi: ita, ut opponas omni accidenti cum eo quod conuenit ei, donec sanetur.

¶ De restauratione fracturæ Cruris. Caput XVII.

SC I A S, quod Cruri sunt duo ossa, quorū unum est grossum, & nominatur nomine Cruris: et alterum subtile, & nominatur Fociale. Et accidit utrisq; ex speciebus fracturæ quod accidit duobus ossibus brachij: & propter illud fit restauratio eius, sicut restauratio brachij æqualiter, & operatio est una. Quod si franguntur duo ossa simul, conuertitur Crus ad omnes partes. Et si frangitur os subtilius, conuertitur Crus ad anteriorem partem. Et si frangitur os grossius, inuenis illud inferius: et est ex eis quæ non occultantur tibi. Deinde administra extensionem, et æquationē, & ligationem astellarū secundum illud æqualiter. Verūtamen oportet, si fractura Cruris est fractura foeda, habens sethagie multa: ut sit extensio minor, & lenior alleuiatiōe tua. Et in Crure quidem est ex operatiōe quiddam super brachiū: et est, ut quādo tu æquas astellas, & completes omnē operationem tuā, tunc accipe duas fascias ex ligno pini, quod administratur in fabricatione solariorū quod ponitur sub tabulis: & fiunt ex spatulis palmæ: et elige ex eis quibus est grossitudo parua, & neq; sint ex minutis: et sit longitudo earum secundū longitudinem Cruris a genu usque inferius. Deinde inuolue super unamquamq; pannū duabus inuolutionibus secundum longitudinem eius. Et pone unam partem Cruris a parte una, & alteram a parte altera: & sint ex genu usq; inferius pedis. Deinde liga duas fascias in tribus locis ex duabus extremitatibus & medio. Cum enim strictura prohibetur, Crus declinat ad dextram & sinistram, et stat statione bona. Et iam quidem administretur cunabulum ex ligno secundum longitudinem Cruris, & ponatur in eo Crus, ut conseruet ipsum a motu. Et plurimū quidem oportet, ut facias illud in fractura quando cum ea est vulnus proprie. Deinde considera Crus in omni die, et stude cum eo studio ultimo ab apostemate, aut inflatione, aut reliquis alijs. Si ergo accidit aliquid ex illis, tunc oppone ei cum eo quod oportet, usquequo sanetur, si D E V S uoluerit.

¶ De fractura ossium Pedis, & Digitorum.

Caput

XVIII.

CA L C A N E O quidem nō accidit fractura penitus. Ossibus uero Pedis accidit quandoq; fractura, & Digitis parū etiā accidit fractura: et nō accidit eis nisi attritio in pluribus dispositionibus. Quod si accidit ossibus Pedis fractura, & uides illa ossa sublimari super se adinuicem, tunc ponat infirmus Pedem suū super terram præparatam, sicut ambulans. Deinde sta tu, et pone Pedem tuū super illud quod eleuat ex illis ossibus: postea preme, uel calca eam: et aqua ipsam, donec redeat in

C locis suis. Deinde pone emplastrū, et stuppam desuper: & pone sub uentre Pedis tabulam paruā, cui sint duo capita plana. Deinde stringe eam cum Pede strictura decenti, postquā tu inuoluis eam cū pannis, & reliquis quibus indiget. Cum ergo pretereunt ei tres dies, aut quatuor, tunc solue ligamentum. Nam tu inuenies ossa æquata, siue sint fracta, aut sint dislocata. Operatio ergo in eis est, sicut uides. Si aut franguntur aliqui digiti, tunc restaura eos, et aqua ipsos secundū quod narraui tibi in restoratione digitorū manus. Deinde pone digito tuo astellam secundū longitudinem digiti, & sit latior eo parumper: deinde pone sub Pede hanc tabulam quam narraui tibi, & stringe eam strictura decenti. Si uero quod frangitur ex ossibus est duo, aut tria, aut plus, tunc pone super omnem digitum astellam suæ quantitatis, inuolutam in panno lini: & stringe tabulam in inferiori Pedis: & sit stans super unum capitum tabulæ extra uentrem Pedis, ut teneat retentione bona. Et conuenit tibi, ut non obliuiscaris, quin consideres omnia quæ dixi tibi in reliquis fracturis ex accidentibus quæ diximus: & oppone omni accidenti cum eo quod oportet.

Q De fractura Vuluæ mulieris, & ossis pectinis, et uirgæ uiri. Caput XIX.


Q V A N D O frangitur Vulua mulieris, tūc fac eam sedere quædratam. Deinde inclina eam ad partem dorsi ipsius parumper, & teneatur retro. Deinde impleat obstetrix Vuluam eius coto, donec impleat eam: et fiat in Vulua ex eo sicut sphaera. Deinde concutatur mulier, & eleua dorsum eius paulatim. Illud enim cotum egreditur, donec fiat ante portam Vuluæ sicut sphaera, et os fractum redit. Deinde pone puluillum super dorsum eius. Quando ergo uult mingere, remoueat cotum cum facilitate, deinde mingat: et reduc ipsum secundum modum, quo intromisisti ipsum in primis: deinde redeat ad puluillum suum primum. Faciat illud septem diebus, aut circiter. os ipsum enim restituetur. Et si uis, accipe uesicā ouis, & stringe super foramen eius cannulam arundinis, et intromitte uesicam totam in Vuluam eius. Deinde suffla in cannulam cum uirtute, donec infletur uesica intra Vuluam. fractura enim redit. Deinde impleatur cum coto, & stet aliquot diebus, secundum quod narrauimus, donec sanetur. Et quando frangitur os Pectinis uiri, aut mulieris, tunc administra in restoratione eius, & ipse us æquatione illud quod narrauimus in osse Anchæ. Et non occultetur rectum in his fracturis propinquis, quæ parum contingunt, præcipue cui est quiddam studiū, uel usus. Et intellige librum meum multum. quoniam fractura ipsa significat tibi in pluribus dispositionibus uiam rectam in restoratione sui, & strictura sui: intellige ergo.

In Virga autem uiri quando frangitur, accipe guttur anseris: & intromitte uirgam in ipso. Deinde pone super ipsum inuolutionem ex

panno, & inuoluatur, et dimittatur tribus diebus, aut circiter eos, & sanabitur, si DEVS uoluerit.


C De restauratione fracturæ ossium, quando est cum uulnere. Caput xx.

C O N V E N I T ei cui accidit fractura cum uulnere, precipue si est magnum, sicut os coxæ, aut adiutorij, aut simile illi, ut properes, & phlebotomes ipsum statim: si attestantur tibi conditiones phlebotomiæ, sicut præmisimus. Quod si uulnus effluit sanguinem, tunc oportet, ut properes ad abscissionem eius, ita ut puluerizes super ipsum zegi tritum: si non est tibi præsens aliud. Deinde incipe restaurare fracturam in illo eodem die: & non postponas illud, si non accidit apostema. Si uero accidit apostema calidum, tunc dimitte restaurationem eius usque ad diem nonum, donec sedetur apostema. Et non appropinques ei in die tertio, & quarto omnino, nam tu faceres ei accidere accidentia mala. Si autem os fractum est emînens super cutem detectum: tunc oportet, ut coneris reducere ipsum, et æquare ipsum manibus tuis cum facilitate & extensione parua. Si autem non præparatur extensio eius, & ipsius æquatio manibus tuis: tunc reduc ipsum cum isto instrumento. Et est instrumentum quod fit ex ferro, cuius longitudo est quantitas septem digitorum, aut octo: & eius latitudo est secundum quantitatem uulneris. Et propter illud necesse est medico, ut accipiat ex eis tria, aut quatuor secundum quantitatem qua indiget ad illud ex curatione in omni specie fracturæ. Et sit rotundum: & sit in eo grossitudo parua, ut non duplicetur apud compressionem super ipsum in hora operationis: & sit acutæ extremitatis, cui sit margo in extremitatibus suis. Et sit superius eius ad grossitudinem ex medietate eius usque ad inferiora. Et hæc est forma eius.



O P O R T E T I N H A C O P E R A T I O N E, ut ponatur extremitas eius acuta, curuata super extremitatem ossis emînentis: & impelle ipsum cum eo uice una, donec quando redit os & æquatur quadam æquatione. Conare ergo æquare extremitates fracturæ ad inuicem. Quod si extremitates eius fractæ est subulis, & non accipit eam instrumentum acceptione bona, tunc oportet, ut incidas extremitatem illius ossis, donec instrumentum potestatem habeat eius. Si uero non potes reducere eos cum eo quod narrauimus omnino, tunc incide ipsum cum eo quod conuenit ei ex Incisorij quæ diximus: aut ferra ipsum cum una ferrarum quocumque modo possibile est tibi.

C. 22. 20



Deinde rade illud, quod remanet in osse ex asperitate & corticibus minutis. Cum ergo reducitur os, & inuenit infirmus post reductionem eius dolorem uehementem incidentem, tunc scias, quod os non rediit ad locum suum naturalem. Fac ergo illud. Nam tu confers infirmo iuuamentum magnū, cum compleitur restauratio tua quam facis ossi. Tunc submerge pannum in uino scriptico, nigro. Et proprie si est in astate. Et non ponas super uulnus carotum, neq; aliquid in quo sit oleum: ut non faciat accidere in ipso putredinem & corruptionem. Deinde administra astellas in hora complementi tui a restauratione ossis. Et dimitte uulnus detectum: ita, ut incidas cum forficibus foramen in inuolutionibus secundum quantitatem uulneris. Et caue omni cautela, ne stringas uulnus cum fractura. Multotiens enim fecerunt istud stolidi medici: & fecerunt accidere super infirmos suos aut mortem, aut corrosionem, aut zuchem, id est, saniem. Et sit strictura tua mollis, lemis, diuersa stricturae fracturarum reliquarum. Quod si uulnus est malum, aut est uulnus magnum, & times super ipsum quædam accidentia mala quæ narraui mus, & inuenis dolorem in loco suspensum: tunc non oportet, ut ponas super ipsum astellas. Et fac eis inuolutiones ex pannis duris in loco astellarum, & stringe ipsum cum eis. Cum autem est post diem unum, aut dies duos, & uides uulnus iam incipere, ut in eo generetur pus: tunc aufer desuper ipsum pannum quem posuisti super ipsum cum uino. Deinde administra licinia, et unguenta cum quibus de consuetudine nostra est, ut medicemur uulnera: sicut unguentum tetrapharmacōn, et similia illi. Et conuenit tibi, ut soluas ligamentum. Et considera uulnus in omni die mane & uespere, donec consolidetur, et sanetur. Et oportet, ut præparetur membrum taliter, ut currat ex eo pus ad inferiora cum facilitate.

Quod si prætereunt uulneri dies multi, et non consolidatur, neq; abscinditur pus ab eo: tunc scias, quod illic sunt satagie ossis parua. Quare oportet, ut inquiras uulnus cum tenta. Quot uero ex illis aliatagie sunt separata, remoue ea, & extrahe ipsa. Et quæ ex eis sunt non separata & pungunt membrum, & faciunt accidere dolorem, conare incidere ea, & auferre ea omni modo quo possibile est tibi illud. Quod si accidat uulneri zuchien, aut ekiletē, id est, estiomēnus, aut species alia corruptionis & putrefactionis: tunc oportet, ut opponas unicuique ex eis cum eo quod conuenit ei ex curatione, cuius præcessit narratio in capitulo suo. Et ex eo in quo oportet ut stet sermo meus, & cui facias presentem mentem tuam: quando frangitur os, & eminet super membrum, sicut os coracæ, & adiutorij, et similia eis ex membris magnis, est, ut non præsumas attractionem eius, multotiens enim accidit ex illo mors, imo dimitte

ipsum, donec putrefiat. Fortasse enim cadet per se post uiginti dies, aut triginta. Tunc ergo cura uulnus, si uidetur tibi: & si non, dimitte ipsum. A

¶ De curatione Nodationis in uestigio

M fractura. Caput XXI.
VLTOTIES accidit hæc Nodatio in uestigio sanationis fracturæ, præcipue, quæ est prope iuncturas: & fecdatur ex ea figura membri. Et fortasse prohibet membrum ab operatione sua naturali. Considera ergo tunc, si nodatio est recens: administra in ea medicinas quæ stipticitatem habent, sicut aloë, & olibanum, et myrrha, & sarco colla, & acacia, et similia eis. Ita, ut accipias ex istis quasdam, aut omnes eas: & confice eas cum uino stiptico, aut cum albumine oui, aut cum aceteto: et pone eas super nodationem in stuppa, et stringe eas super ipsam stricturem bona. Et dimitte stricturem, nec soluas eam diebus multis. Deinde solue eam, & itera aliam, donec remoueaturnodatio. Aut stringe super ipsam laminam plumbi decenter. Plumbo enim est proprietas remouendi omne quod timetur ex membris. Si autem nodatio iam in lapidem conuersa est, & stricta est, et festine prouocat necessitas ad auferendum eam: tunc finde super eam ex superiori parte eius, & incide superfluitatem eminentem: aut rade eam cum quibusdam rasorijs, donec remoueaturnodatio: & cura ipsam, donec sanetur.

Plumbi uirtus.

¶ De curatione quando restauratur, & remanet membrum post illud subtile, non secundum naturam suam.

Caput XXII.

Q V A N D O restauratur fractura ossis, & remanet membrum post illud subtile, debile: tunc nō fit illud nisi propter causas multas. Quarum una est: multitudo solutionis ligamenti & ligationis eius non secundum quod oportet: aut propter superfluitatem stricture ligamentorum, donec prohibeatur nutrimentum currere ad membrum: aut propter multitudinem embrocationis superflue in non sua hora: aut propter paucitatem sanguinis in corpore infirmi, & debilitatem eius. Et curatio illius est, cibare infirmum, & tenerum facere corpus eius, donec multiplicetur sanguis in eo. Et administra balneum. Et intramitte gaudium & læticiam super eum. Deinde pone picem super membrum, ut attrahat pix ad ipsum nutrimentum multum. Et assidue remouet nutrimentum eius cum aqua tepida, donec currat nutrimentum, & redeat ad figuram suam naturalem.

¶ De curatione ossium fracturum quando restauratur.

C

rantur tortuose. Caput xxiii.

Q V A N D O accidit membro iam restaurato post sanationem eius tortuositas, & eminentia ossi fracto, aut nodatio: & scedatur per illud forma membri, uerumtamen membrum non prohibetur ab operatione sua naturali: tunc non oportet ut recipias sermonem eius, qui existimat, ut frangatur membrum denuo. Et iam fuerunt multi stolidorum medicorum & restauratorum, qui fecerunt illud in terra nostra. Et hæc quidem operatio est uituperabilis ualde, perducens ad mortem, uel timorem magnum, ut scilicet sit mortalis. Verum si claudicatio & nodatio sunt recentes: tunc oportet, ut embrocetur cum aqua tepida, in qua decoctæ sint herbæ mollificantes, sicut folia alteæ, & radix eius, & mellilotum, et illis similia. Et fiat ei emplastrum cum emplastro mollificatiuo, sicut dyachilon deceter factum. Aut sumatur mucilago radices alteæ, & concutiat cum adipe gallinæ, aut oleo sisamino: & emplastretur cum eo. Aut sumantur ficus pingues, & terantur cum fimo columbino, & similibus eis quæ nominantur ex medicinis diminuentes consolidationem. Et quandoq; soluitur nodatio cum frictione assidua, antiqua, & leni, quæ fit cum manibus humidis. Et administretur motus membri ad omnem partem in horis omnibus.

D

Si autem tortuositas iam antecessit, & fortis facta est, et conuersa est in lapidem, & prouocata est necessitas ad curationem eius cum ferro: tunc oportet, ut secetur superius eius, & soluiatur continuatio ossis, et incidatur quod superfluit ex nodatione aut osse cum incisorijs subtilibus: & administretur facilitas in illo cum sollicitudine & studio.

D

De sermone in Dislocatione.

Caput

xxiiii.

D I S L O C A T I O est exitus alicuius iuncturarum a loco suo. Quare prohibetur a motu suo, & foedatur figura membri. Et facit accidere super infirmum dolores, & læsiones uehementes. Quando ergo accidit alicui dislocatio, tunc oportet festinare ad restorationem eius: neq; tardet eam omnino. Nam si tardatur, apostematur locus, & fortasse cum eo reductio dislocationis. Propter illud ergo non oportet, ut moueatur, neq; extendatur in hora apostemationis eius, quoniã multoties facit accidere spasmus, et dolores lædentes. Verum quando accidit illud, tunc oportet, ut properes ad phlebotomiam infirmi. Deinde dimittatur, donec quiescat apostema. Deinde embrocetur membrum cum aqua calida & oleo. Deinde reducatur cum facilitate. Et curetur omne membrum cum eo cuius rememoratio ueniet in loco suo. Ego quidem iam ordinaui capitula dislocationis, etiam secundum quod præcessit in fractura, a superiori parte corporis usq; ad inferiorem eius.

Dislocatio
quid.

¶ De cura dislocationis Mandibulæ inferioris.

A

Caput xxv.

P A R V M dislocantur duæ Mandibulæ nisi raro. Et dislocatio ambarum fit secundum unum duorū modorum. Aut enim remouentur a locis suis remotione parua, & mollificātur parumper. Aut dislocantur dislocatione integra, completa, donec mollificentur ad partem pectoris, donec currat salua infirmi, & non possit tenere eam, neq; possit claudere os suū, & inuoluatur lingua eius cum sermone. Quando autē dislocatio eius est parua, tunc redit in pluribus dispositionibus perse cum paucitate. Si uero est dislocatio completa, integra: tunc oportet, ut administretur reductio eius uelociter, et non tardetur penitus: & est, ut teneat minister caput infirmi: & intromittat medicus pollicem manus suæ in radicem Mandibulæ dislocationis inter os eius, si dislocatio est a parte una. Aut intromittat duos pollices suos simul, si dislocatio est a duabus partibus. Et reliqui digiti manū eius sint extra, quibus æquet. Et præcipe infirmo, ut mundificet Mandibulas suas, & abfoluat eas ad manducandū ad omnem partem. Et medicus æquet Mandibulam, et impellat Mandibulam, donec redeat ad locum suum.

Quod si difficilis sit reductio eius, præcipue si sunt ambæ Mandibulæ simul: tunc administra uaporationem cum aqua calida, & oleo, donec fiat facilis reductio ambarum: neque tardes reductionem ambarum, omnino, sicut diximus. Cum ergo redeunt & æquantur, et clauditur os infirmi, et non mollificantur: tunc pone super eas puluillos pannorum, cum ceroto quod sit factū ex cera: & oleo rosato. Deinde ligetur cum facilitate cum ligamentis mollibus. Et sit somnus infirmi super dorsum suum: & caput eius sit stans inter duo puluinaria, ut non moueat ipsum ad dextram & sinistram: neque conetur, uel cogatur masticare aliquid: imo ponatur cibus eius sorbitio lenis, donec quando remouentur dolores, & nodatur Mandibula: tunc comedat quod uult, et administretur illud cum facilitate. Non labore super operationem oris sui apud comestionem & potum, & oscitationem, donec nodetur Mandibula, & sanetur. Quod si difficilis fiat reductio duarum Mandibularū, quando dislocantur in hora aliqua, & non conuertuntur ad loca sua: tunc multotiens accidunt inde febres, & soda assidua: et fortasse soluitur uenter infirmi, & fortasse uomit choleram puram. Cum ergo uides illud: tunc scias, quia est perditio, & multotiens moritur ille cui accidit illud in decem diebus.

¶ De reductione dislocationis Furculæ, & extremi tatis humeri.

Caput xxvi.

F U R C U L A quidem non dislocatur ex latere intrinseco, propter continuationē suam cum pectore. Et dislocat quandoq; ad exteriora

Cra: & declaratur illud sensui. Et restauratio eius est, ut iaceat infirmus super dorsum suū, & extendat brachia sua. Deinde cōarta locum cum palma tua cōartatione forti, nam ipsa redibit. Deinde pone super ipsam emplastrū, & puluillos, et stringe eam. Extremitates uero eius quæ sequuntur cubitum, et continuantur cum eo, non dislocantur, nisi raro. Quod si dislocatur die aliquo: tunc oportet, ut reducatur & æquetur secundum quod diximus, & quod præparatur tibi. Deinde pone super ipsam emplastrum, & puluillos, et stricturam. Et præcipe infirmo, adherere tranquillitati et quieti, donec sanetur. Et cum hac eadem curatione reducitur extremitas Humeri, quando separatur etiam a loco suo.

¶ De reductione dislocationis Humeri.

Caput


XXVII.

Dislocationes
Humeri.

SC I A S, quod Humerus non dislocatur, nisi secundum tres modos. Quorum unus est, ut dislocetur ad partem titillici ad inferiora. Secundus est, ut dislocetur ad partem pectoris. Et fortasse dislocatur ad superiorem partem Humeri: & illud fit raro. Et non dislocatur ad posteriora, propter spatulam. Et non dislocat ad anteriora, propter neruos. Et plurimū quidem dislocatur & egreditur ad inferiora uersus titillicū: præcipue in illis, quorū carnes sunt pauce. quoniam egredit in eis uelociter, & ingreditur uelociter. In illis autem quorū carnes sunt multæ, est e contrario illius, scilicet quia egredit cum difficultate, et ingreditur cum difficultate. Et fortasse accidit quibusdam hominibus percussio, aut casus, et apostemat Humerus apostemate calido, & putatur propter illud, quia iam dislocatus est. Oportet ergo, ut experiaris illud, donec stes super certitudinē eius, & tunc procedas in curatione eius. Et cognoscitur dislocatio, quando est ad inferiora uersus titillicū: & distinguas inter Humerum dislocatum, et humerū sanum. Nam tu inuenis inter eos diuersitatem manifestam, & inuenis in capite Humeri concauitatem, et sub titillico apud tactum caput humeri quasi ipsum sit ouū: & non potest infirmus reducere manū ad aurem suam, neq; mouere eam omnibus motibus. Et similiter, si dislocat uersus pectus, aut ad sursum: tunc inuenis manifestū tactum, neq; occultatur. Et huius quidem dislocationis fit facilis reductio, quando est recens, aut infirmus est puer. Et reductio eius est, ut eleuet minister manū suam ad superiora. Deinde pone tu pollices tuos sub titillico eius, & eleua iuncturam cum fortitudine ad sursum ad locum suū: et minister eleuet manū suam, & extendat eam ad sursum. Deinde ponat eam inferius, ipse enim redit uelociter. Si autē non redit per illud quod diximus, & sunt a principio quo accidit dislocatio dies multi: tunc oportet, ut balnetur infirmus in aqua calida, & administretur embrocatio quæ mollificat & lenit. sicut si decoquantur radices alteæ, & fœnugræcum, & mellilotum in aqua, et administretur. Deinde resupinetur infirmus super dorsum suum: & ponatur sub titillico eius sphaera

& lana, quę sit æqualis inter lenitatem & stricturam. Deinde ponat me- A
dicus calcaneum suum super spheram, & eleuet caput humeri cum uir-
tute, & attrahat manum infirmı ad inferiora. Et minister alius teneat ca-
put infirmı, ut non moueatur ad inferiora: ipse namq; redit statim. Et si
uis, reduc eum secundum modum hunc: & est, ut facias esse præsentem
uirũ qui sit longior infirmo, & stet a parte lateris, & intromittat hume-
rum suum sub titillico infirmı: & eleuet titillicum eius ad superiora, do-
nec sit infirmus suspensus in aëre. Et minister alius trahat manum infir-
mı ad inferiora uentris eius. Si autem infirmus est leuis: tunc oportet, ut
suspendatur cum eo aliquid aliud, ut grauet ipsum: nam redit dislocatio
statim. Et reducitur etiam secundum modum alium: & est, ut figatur
in terra lignum longum, cuius caput sit rotundum figura: sicut manica
mortarij: quod non sit grossum, neque subtile. Deinde ponatur sub in-
firmo postquam ponuntur super caput ligni panni lenes: & infirmus
sit stans secundum longitudinem ligni. Deinde extendatur manus eius
ad inferiora a parte altera, & extēdatur corpus eius ab altera parte cum
fortitudine: nam iunctura redit ad locum suum cum uelocitate.

Quod si difficilis sit eius reductio per omnia quę diximus, tunc ute-
re hac cura: & est, ut accipias lignum cuius longitudo sit quantitas duo-
rum brachiorũ, & eius latitudo quantitas quatuor digitorum, & grossi-
tudo eius quantitas duorum digitorum: cui sit caput rotun-
dum, ut alleuietur introitus eius in profundum B
titillici, secundum hanc formam.



Deinde ligentur super caput rotundum panni lenes, ut non lædat li-
gnum infirmũ. Deinde ponatur sub titillico infirmı, ut extendatur ma-
nus, aut brachium super lignum usq; ad inferiora: & ligetur lignum su-
per adiutorium & brachium & extremitatem manus. Deinde ponatur
brachium super gradum scalę per latitudinem, & extendatur manus
ad inferiora, & dimittatur reliquum corpus suspensum a parte altera.
Iunctura enim ingreditur statim. Cum ergo completur introitus eius se-
cundum quemcunq; modum possibile est: tunc oportet, ut ponas sub ti-
tillico spheram æqualis quantitatis ex lana. Deinde pone emplastrum
preparatum ex puluere molendini cum olibano, et albumine oui super
humerum totum, sicut reuoluitur desuper. Deinde stringe sub titillico
strictura decenti: et reuoluatur ligamentum super emplastrum desuper:
& annectatur manus eius ad collum ipsius, & dimittatur, neque moue-
atur manus eius septem diebus. Et oportet, ut ponatur cibus infirmı

C paucus, donec confortetur membrum : quoniam est uelocius ad sanationem eius. Deinde ponatur amplior post septem dies, aut quinque, & exercitetur cum motu. Si ergo firmatur & non mollificatur, tunc iam sanatus est. Si uero iunctura dislocatur multotiens, propter humiditatem quæ accidit ei, aut propter caussam aliam : tunc oportet, ut administretur in ea cauterium cum tribus foraminibus, secundum quod præmissum est in capitulo de cauterio. Quod si fiat hoc totum, & soluantur ligamenta post septem dies, & non confirmetur iunctura, & reducatur emplastrum & strictura super ipsum aliquotiens, & non firmetur, & cadat, & non possit eleuare ipsum ad superiora : tunc scias, quod nervi eius qui sunt ad caput humeri, iam incisi sunt, aut extensi, aut mollificati : & scias, quod iunctura nunquam figetur in loco suo.

Dislocationis autem quæ fit uersus pectus & mammillam, aut ad posteriora reductio, fit cum impulsione & extensione cum manibus : donec redeat, & administretur in ea reliqua strictura & cura, donec sanetur. Quod si accidat post sanationem grauitas in membro, & tarditas in motu eius, tunc utatur infirmus balneo multotiens, donec leniatur illa grauitas, & redeat ad naturam eius primam.

¶ De curatione dislocationis Cubiti.

Caput

XXVIII.

D **S** C I A S, quod iunctura Cubiti dislocatur cum difficultate, & similiter redit cum difficultate etiā : & ipsa quidem dislocatur ad omnes partes, & præcipue ad anteriorem, aut ad posteriorem. Et eius dislocatio non occultatur tibi : quoniam est cadens sub uisu, & sub tactu, secundum quamcunque figuram dislocetur. Et quando coniungis cubitum dislocatum cum sano, declaratur tibi illud manifeste. concauatur enim iunctura, & non potest duplicare brachium, neque tangere cum eo humerum suum. Et oportet, ut properes, & reducas dislocationē statim, antequam accidat ei apostema calidum. Nam si accidit ei apostema calidum, difficilis fit eius reductio : & fortasse non sanatur omnino, præcipue quando est ad posteriora. est enim deterior omnibus speciebus dislocationis, & uehementioris doloris eis : & multotiens descendit cum ea mors. Et restitauratio eius quando est ex eis quæ possibile est reducere, est, ut extendatur manus eius cum duabus manibus : & brachium eius sit expasum, & manus, medici sint supra cubitum & sub eo, & ipse impellat iuncturam cum pollicibus manuum suarum simul, aut cum radice palmæ suæ, donec redeat ad locum suum. Aut uero dislocatio est ad anteriora : tunc redit ita, ut duplicet manum cum manu sua, donec percutiat cum radice palmæ suæ cubitū qui est dislocatus. Quod si non obedit dislocatio ad reductionem, tunc administra extensionem uehementem, fortiter ualde : & est, ut extendant brachium duo ministri : & teneant ipsum

duo ministri etiam, ut non remoueatür apud extensionem. Deinde re- **A**
uoluatur brachium ad omnē partem postquā inuoluitur super manum
eius pannus duplicatus longus, aut ligamentū latum. Et quando tangit
medicus manu sua iuncturam, inungat ipsam cum oleo: ut sit illud ex eis
quæ adiuuant in lubricitate iuncturæ cū facilitate. Deinde impellat iun-
cturam impulsione uehementi, donec redeat. Et post reductionem eius
oportet, ut ponatur super ipsam emplastrum, in quo sit stipticitas, et ex-
iccatio cum albugine oui: & stringatur strictura decenti. Et suspendatur
brachium a collo infirmī: & dimitte diebus aliquot. Deinde soluatur.
Si ergo firmatur iunctura in loco suo, tunc solue ligamentū ab ea, & di-
mitte ipsam. Et si uides iuncturam non bene stringi, tunc itera empla-
strum, & ligamentum, et dimitte ipsam diebus aliquot, donec stringatur.
Deinde solue ipsam. Si autem accidit ei grauitas post reductionem iun-
cturæ, & dispositio sit in motu: tunc administra humectationem in bal-
neatione, & fricationem subtilem, et compressionem, donec liniatur, aut
pone super iuncturam iliati, id est, natem arietis pinguem. Deinde ligan-
tur, & dimitte ipsam super eam die & nocte. Deinde aufer eam, et intro-
mitte ipsum in balneum. Cum ergo sudat, tunc frica iuncturam frictio-
ne temperata. Deinde itera super ipsam alesiati uice una, & secunda, &
tertia cū introitu balnei, donec leniatur. Et si uis, pone super ipsam ster-
cus uaccinū, humidum, calefactum cum butyro, & stringe super ipsum.

Fac illud aliquotiens. ipsa namq; lenitur, & redit
ad dispositionem suam.

B

¶ De curatione dislocationis Almahasssem.

Caput. XXIX.

MAHASSEM manus multotiens dislocat, id est, iunctura
quæ est inter brachium & manum. Et reductio dislocationis eius est fa-
cilis. Econtrario reliquarum iuncturarum. Verumtamen oportet, ut ue-
locitas sit in reductione dislocationis eius in hora in qua dislocatur, an-
tequam apostemetur locus: aut accidat in eo apostema calidum. Et redu-
ctio dislocationis in eo est, ut ponas Mahasssem manus infirmæ super ta-
bulam, & extendat minister manum eius: & ponat medicus palmam su-
am super eminentiam iuncturæ, & impellat eam, donec redeat. Verum-
tamē oportet, ut consideretur, si palma iam recessit ad uentrem manus:
tunc ponat infirmus dorsum manus suæ super tabulam apud extensio-
nem & reductionem: & si dislocatio est procedens ad dorsum manus,
tunc sit positio manus eius intrinsece super tabulam, id est, interior pars
manus eius super tabulam ponatur, ut cadat manus medici super ipsam
eminentiā iuncturæ. Si ergo redit statim, bonum est: & si non, tunc strin-
ge eam cum emplastro sedante apostema: & dimitte ipsum, neque iteres
illud. Nam si non tolerat, neque potes super reductionē eius, postquam
prætereunt ei dies, uerumtamen iunctura remanet secundum tortuosam

C tatem suam: & nō nocet infirmo aliquid, nisi quod mollificatur manus, & non potest stringere aliquid: tunc scias, quod nervi sunt abscissi, aut attriti. Non est ergo ingenium in ea, nisi ut stringatur cum cauterio prope casum eius. Et fortasse non confert illud aliquid. Cum ergo non redit Almahassem, tunc pone super ipsum emplastrum, quod narrauimus. Deinde stringatur, & dimittatur quinque diebus: postea solvatur & dimittatur, et exercitetur manus. Si autem priuatur motus eius, & accadat in ea aliquid grauitatis: tunc leni eam cum aqua calefacta, & frictione aliquoties, donec leniatur.

¶ De curatione dislocationis Digitorum.

Caput

xxx.

Q V A N D O dislocatur ex eis Digitus ad omnem partem, uel ex eis Digitus ad dorsum palmar, aut uentrem eius: tunc extendere Digitum, & impellere dislocationem pollicibus tuis, donec redeat. Deinde sustenta caput Digiti, & suspende ipsum uersus partē ad quam dislocatur, & dimitte ipsum duobus diebus. Deinde suspende eum, & extende ipsum, donec æquetur rectus in illo die suo. Cum ergo fuerit nox, liga ipsum secundum narrationem ipsam: & non cesses soluere ipsum in die: & exerce eum cum motu: & liga ipsum in nocte. fac illud diebus aliquot, donec stringatur. Et similiter fac cum eo, si dislocatur ad uentrem manus: & liga eum ad partem ipsam, & fac cum eo operationem tuam primam, donec sanetur. Et similiter fac cum eo quando dislocatur ad reliquas partes.

¶ De curatione dislocationis Spondilium dorsi.

Caput


xxxI.

Q V A N D O accidit alicui Spondilium dorsi, aut colli dislocatio completa, aut remouentur Spondiles multæ a locis suis: tunc non est in ea curatio. quoniā mors properat infirmo. Et signum illius est, quod egestio infirmi egreditur absque uoluntate, neque potest tenere eam: & multoties mollificatur ex eo quædam membra eius, aut duo crura eius, aut duo brachia ipsius, aut unum eorum: aut remouetur Spondilis una de loco suo. Multoties enim remouetur, quod multoties fit remotio earum ad quatuor partes. Illa ergo quæ remouetur ad posteriora, nominatur Gibbositas. Curatio uero eius est, ut consideres tunc, si Gibbositas accidit a puericia: tunc non est in ea curatio, neque ex ea est sanatio omnino. In illa autem quæ accidit a casu, aut percussione, aut similibus illis, iam dixerunt antiqui modos curationis sermone prolixo. Cuius plurimum non redit cum proficuo. Ego uero iam abbreviaui ex illo, cuius parum excusat a multo eius ex propinquitate mea ad intentionem: & expositione mea qua exposui illud, & formaui in

Gibbositatis
curatio.

strumentum eius diuerso modo ab eo quo ostenderunt illud, & expo^s A
 fuerunt ipsum. Dico ergo, quod in gibbositate quæ accidit ab anteri^o
 ori parte, non est ingenium, neque sanatio ex ea. Et similiter in illa quæ
 fit ad duo latera etiam. Et non curatur ex eis, nisi illa quæ accidit in dor^{so}
 so proprie, cum eo quod ego narro: & est, ut extendatur infirmus super
 faciem suam super podium æquale prope parietem: & expandatur sub
 eo stramentum humidum, ut non lædatur pectus eius. Deinde ponatur
 lignum rectum fixum in fouea in terra; in extremitate podij, circiter ca^p
 put eius: & lignum aliud circiter pedes eius in extremitate altera podij:
 & minister teneat lignum, et sit non firmatum in fouea. Et minister alter
 teneat alterum. Deinde inuolue super caput infirmi, & sub titllicis eius
 ligamentū lene, firmum: & extende extremitatem ligamenti ad lignum
 quod est apud caput eius: & liga ipsum in eo. Deinde stringe ligamen^t
 tum aliud supra anchas eius, & supra genua ipsius, & apud cauillas ei^{us}
 us. Deinde aggrega ligamenta omnia, & liga ea in ligno altero quod
 est apud pedes eius. Deinde extendat omnis minister ad partem ligni
 ligamētum, & non remoueantur duo ligna ex locis suis in quibus sunt
 fixa: uerumtamen non sint firmata, sicut diximus. Et medicus ponat
 palmas suas super Spondilem cum fortitudine, donec redeat: aut ponat
 super eam tabulam. Deinde annectat super tabulam pedes suos, donec
 redeat. Si autē non redit per hanc curationem, tunc accipe tabulam cuⁱ
 ius longitudo sit circiter tria brachia. Et caua in pariete de quo diximus
 quod est prope infirmum, locum in quem ingreditur extremitas tabu^{læ}
 læ. Deinde pone medium tabulæ super Spondilem. Et ponat pedes su^{os}
 os medicus super extremitatem alteram. Et stringat bene, donec coar^t
 tetur Spondilis, et redeat ad locum suum. Deinde si uis, operare cum
 torno quod inuoluitur cum manu tua: & est, ut figas in terram apud ca^p
 put infirmi in postremo podij duo ligna, quorum longitudo sit bra^{chij}
 chij unius: & apud caput eius in postremo podij duo ligna. Et sit lon^g
 gitudo quæ est inter omne lignum palmus unus: & iam factum est in
 omni loco foramen, in quo currit tornum: & firmetur lignum omne in
 terra multum, ne moueatur omnino. Et intromittatur lignum rotun^{dum}
 dum: & est tornum in quo reuoluitur ligamentum in duobus foramiⁿ
 nibus duorum lignorum. Et in extremitate eius est foramen, in quo fir^{matur}
 matur lignum, cuius longitudo est palmus cum eo quod reuoluitur:
 & in duobus lignis alijs est similiter illius. Deinde stringe ligamenta
 quæ strinxisti in pectore infirmi torno quod est apud caput eius: & li^g
 gamenta quæ strinxisti in cruribus eius in torno quod est apud pedes
 eius. Deinde stet apud omne tornum minister, qui torqueat manum
 suam cum licinio, cum quo reuoluitur tornum: & medi^{cus}
 cus æquet Spondilem, secundum quod dixi^{mus}
 mus. Hæc est forma torni, quæ sequitur.

C



Deinde postquam redit Spondilis, & æquatur locus, tunc oportet, ut ponas emplastrum exiccatiuum cum albumine oui. Deinde stuppam. Postea pone supra emplastrum astellam ex tabula, cuius latitudo sit trium digitorum, aut circiter eos. Et longitudo eius quantitas quæ capiat locum Gibbositatis, & super partē Spondiliis sanæ. Deinde ligetur cum ligamento quod diximus. Et utatur infirmus nutrimento subuli, donec sanetur. Quod si remaneat quiddam eminentiæ in loco in fine sanationis: tunc oportet, ut administrentur medicinæ quæ mollificant, & leniunt, cum administratione tabulæ quam narrauimus tempore longo. Et iam administratur in illo lamina plumbi. Et quandoq; accidit eminentia in postremo Spondilium dorsi: & putatur per eam dislocatio, & est illud os quod iam eminet. Quare nō oportet, ut præsumptio fiat ei cum hac medicina: fortasse enim accidere faciet mortem.

¶ De curatione Anchæ dislocatæ.

Caput xxxii.

SCIAS, quod iuncturæ Anchæ, & iuncturæ humeri, non accidit, nisi dislocatio tantum: neque accidit eis quod accidit reliquis iuncturis ex remotione parua, & concauitate. Et iunctura quidem Anchæ dislocatur secundū quatuor partes. Quod est, quia dislocatur ad anteriora, & ad posteriora. Et plurimū quidem dislocatur ad interiora: & parum dislocatur ad anteriora, et ad posteriora. Et curatio dislocationis eius ad interiora, est: quia quando tu coniungis crus infirmī solum cum infirmo, est longius: & est genu eius eminens plus quam sanī, & non potest infirmus duplicare pedem suum apud inguen: & est locus qui sequitur inguen apostematus apostemate calido, propterea, quod caput coxæ iam peruenit illic. Et signum eius cui accidit dislocatio ad exteriora

Dislocatio
Anchæ qua-
druplex.

ora est, quod sunt accidentia eius contraria istis accidentibus. Et signum **A** eius cui accidit dislocatio ad anteriora, est, quia expandit crus sanum secundum complementum: uerumtamen non duplicat ipsum absq̃ dolore qui est in genu: & si conatur ad ambulandum, non potest super illud ad anteriora: & retinetur urina eius, & apostematur inguen eius, & apud ambulationem est calcatio eius super calcaneum. Et signum eius cui accidit dislocatio ad posteriora est, ut non expandat genu, neq̃ possit duplicare ipsum antequam duplicet inguen: & est crus eius etiam breuius altero: & inguen est mollificatū, & est caput coxæ apud locum ilij.

Reductio uero huius dislocationis specierum est, ut consyderes tunc, si dislocatio est uetusta, quæ iam antiquatur cum habente ipsam. Deinde si tu administres reductionem eius, & remanet secundum dispositionem suam: tunc non est in ea curatio omnino. Non ergo oportet, ut præsumptio fiat ei penitus. In illo autem cuius dislocatio est recens, & est ex una specierum quatuor dislocationis: tunc propera ad hoc, ut uoluas iuncturam, & extendas ipsam ad interiora & ad exteriora, & moueas eam dextra & sinistra: fortasse enim redit, & non indiget alia cura. Si autem non redit hoc modo, tunc oportet, ut præpares ministrum fortem, & extendat crus eius ab inferiori parte: aut cum manibus suis, aut cum ligamento, quod ligetur super crus eius supra genu: & minister alius extendat manum eius desuper, ita ut intromittat **B** manus suas sub titillicis eius. Deinde stringat cum ligamento leni super radicem coxæ, & teneat extremitatem ligamenti alterius. Et sit extensio eius aut ab anteriori parte inguinis ad partem furculæ, aut a posteriori ad partem dorsi. Et sit extensio eorum omnium uice una, donec eleuetur infirmus cum corpore suo a terra, & remaneat pendens. Et hæc enim species extensionis est species communis specierum quatuor. Si ergo redit dislocatio cum eo quod diximus, est bonum: & si non, tunc necesse est omni speciei illud quod dicam de curatione propria: In reductione quidem eius propria quando dislocatio est ad interiora, oportet, ut resupinetur infirmus super latus suum sanum. Deinde ponat ligamentum super radicem coxæ, in eo quod est inter caput coxæ, & locum qui est sub inguine. Deinde extende ligamentum ad sursum a parte inguinis ad altiore partem corporis, ad partem furculæ. Deinde accipiat minister alius fortis brachia eius, & minuat locum grossum coxæ infirmæ, & extendat ad exteriora extensione uehementi. iam enim redit ad locum suum. Et hæc species est facilioris reliquis speciebus curationis, qua reducitur hoc membrum.

Si autem excusatur super te, & non obedit tibi ad introitum cum hac specie curationis omnino: tunc oportet, ut ligentur duo pedes infirmi simul cum ligamento forti, leni, super duos calcaneos, & super duo genua: & sit longitudo cuiusque a comparare suo quantitas qua

C tuor digitorum: & sit crus infirmum extensum plus altero quantitate duorum digitorum. Deinde suspendatur infirmus super caput ligni, quod sit in domo: & sit longitudo eius a terra quantitas duorum brachiorum. Deinde præcipe iuueni forti, ut muniat caput coxæ: & suspendatur cum infirmo iuuenis alius: & impellat iuuenis alius, muniens coxam cum fortitudine. nam iunctura redit ad locum suum cum uelocitate. In reditione autem eius propria, quando est dislocatio ad exteriora, oportet, ut iaceat infirmus super podium, secundum quod narrauimus in habente gibbositatem. Et stringatur ligamentum super crus eius, infirmum proprie, & super pectus eius. Deinde ponantur duo ligna, unum apud pedes eius, & alterum apud caput ipsius. Deinde ponatur lignum additum in medio podij, fixum bene: super quod inuoluti sint panni humidi, ut non lædat infirmum: & sit lignum inter coxas eius, ut non attrahatur ad inferiora apud extensionem. Deinde extendat omnis minister ad partem suam, & medicus æquet reductionem manu sua. Si ergo obedit ad reuersionem, erit bonum. Et si non, pone super ipsam tabulam, & preme ipsam, sicut diximus in gibbositate, æqualiter. Verumtamen oportet, ut iaceat infirmus super latus suum sanum. Et quando dislocatio est ad anteriora, tunc oportet, ut extendatur crus infirmi uelociter: & est secundum hanc eandem narrationem super podium: & ponat medicus palmam manus suæ dextræ super inguen infirmum. Deinde cōartet ipsum cum manu altera, & cum illa cōartatione pone ipsum extensum ad inferiora ad partem genu.

Et si dislocatio est ad posteriora: tunc non oportet, ut extendatur infirmus ad inferiora, & sit eleuatus super terram: imo oportet, ut sit positus super rem duram, sicut oportet, ut sit etiam si dislocatur ancha eius ad exteriora, secundum illud quod diximus de accubitu eius super duas anchas: & est super faciem eius, & ligamenta extensa: secundum quod diximus nuper. Et oportet, ut administraretur compressio cum tabula etiam super locum ad quem egreditur iunctura, cum completur reductio secundum quod oportet. Et signum reditionis eius non occultatur tibi: & est, ut extendas duo crura infirmi: & quando uides ea æqualia, & infirmus stringit crus suum, & expandit ipsum absque excusatione: tunc scias, quia iam redit membrum, secundum quod oportet: tunc coniunge duas coxas, & pone emplastrum, & stringe cum inemati, id est, rota: ita, ut non moueatur ancha ad aliquam partem: & adhæreat infirmus quieti tribus diebus, aut quatuor. Deinde solue ligamentum, & emplastrum, & compara crus cum altero: tunc si uides ea æqualia in statu, tunc scias, quod dislocatio iam firmata est: absolute ergo infirmum ad ambulandum. Et si uides aliquid mollificationis: tunc redi, & emplastra illud, & stringe illud secundum strictionem tuam primam: & dimitte illud etiam tribus diebus. Deinde solue

ue illud & fac ipsum tardare in ambulatione super utrumq; aliquot diebus, donec confortetur bene.

A

G De dislocationis Genu. Caput xxxiii.
GENU dislocatur secundum tres modos. Dislocatur ad exteriora, ad interiora, & ad inferiora, scilicet ad posteriora. Et non dislocatur ad anteriora. Et signum dislocationis eius, est, ut precipias infirmo, ut applicet crus suum ad coxam suam. Si autem non adhæret cum coxa: tunc scias, quod Genu est dislocatum. Et restauratio omnium modorum dislocationis eius est, ut facias sedere infirmum rectum, ita ut iam extendat crus suum si potest super illud, & adhæret dorsum tuum ad faciem eius: & pone pedem eius inter pedes tuos. Deinde adhærere fac Genu eius cum palmis tuis, & recta eas inter digitos tuos super Genu eius. Deinde applica cum palma tua duo latera Genu eius cum fortitudine. Et minister alius extendat pedem eius, donec redeat Genu ad locum suum. Et signum reductionis est, ut adhæreat crus cum coxa in lenitate, non laboriose. Deinde emplastra ipsum, & adhærere fac crus cum coxa. Deinde liga ea simul cum uitta tribus diebus, aut quatuor. Deinde solue ea. Et non utatur infirmus ambulatione aliquot diebus, donec sanetur. Si autem recusat tibi reductio eius, tunc administra extensionem fortem cum ligamentis, quorum præcessit narratio in curatione anchæ, donec redeat.

B

C De curatione dislocationis Calcanei. Caput xxxiiii.
CALCANEVS quandoq; remouetur remotione parua, & quandoq; dislocatur secundum complementum. Et dislocatio eius fit, aut ad interiora, aut ad exteriora. Et signum dislocationis eius est, quod uides Calcaneum inflatum, procedentem ad partem ad quam dislocatur. Curatio autem remotionis eius, est facilis reductionis: & est, ut exteri datur cum facilitate cum manibus, et aquietur, donec redeat. In curatione autem eius quando dislocatur secundum complementum, oportet, ut facias sedere infirmum rectum: & teneat ipsum minister fortis ualde a posteriori parte dorsi eius, in medio ipsius. Deinde tene tu cum manu tua dextra pedem eius a superiori parte eius, & cum manu tua sinistra ab inferiori parte pedis eius loco cauillæ. Deinde trahere pedem ad te cum manu tua dextra. Deinde cum sinistra duabus uicibus. Deinde extendere cum sinistra, & impelle pectus pedis cum dextra uersus crus absque labore. Fac illud bis, sicut narrauimus. Deinde impelle pectus pedis ad crus in uice tertia, & tu trahis cauillam. Si ergo redit in uice una, aut in duabus secundum hunc modum, & uides pedem æquatum, est bonum: & si non, tunc iterum operationem super ipsum: quoniam ipse redit. Si autem prohibetur tibi reductio eius cum eo quod narraui

Cmus: tunc fac iacere infirmum super dorsum suum super terram, & fige paxillum in terra firmatum ualde, ut cadat inter coxas eius: & tu iam inuoluisti super ipsum pannum, ut non lædat infirmum. Deinde accipiat minister coxam eius: postea extendat minister alter pedem, aut cum manibus suis, aut cum ligamento quod liget super collum pedis. Deinde extendat omnis minister contra extensionem comparis sui: & paxillus sit stans inter duas coxas infirmi retinens eum, ut non attrahatur corpus eius ad inferiora apud extensionē. Deinde aquet medicus dislocationem manibus suis, & minister alter teneat crus sanum ad inferiora. Nam dislocatio redit cum uelocitate. Quando ergo redit dislocatio, & declaratur tibi sanitas reditionis eius: tunc pone emplastrum & stuppam, & stringe ipsam cum ligamentis firmiter, & liga pedem cum ligamento ad crus. Et oportet, ut caueas uel timeas de neruis, qui sunt supra calcaneum posterius, ut non sit ligamentum super eos uehemens, & lædat eos. Deinde dimitte ipsum duobus diebus, aut tribus. Quod si molificatur ligamētum, stringe ipsum: deinde solue ipsum in die tertio, aut quarto: & prohibe infirmum ab ambulatione quadraginta diebus. Si uero conatur ambulare ante illud spacium, non sit securitas quin dissoluatur super ipsum dislocatio, & corrumpatur, & non recipiat post illud curationem. Quod si accidat ei apostema calidum: tunc oportet, ut ad ministros in sedatione eius illud, in quo præcessit narratio nostra in alio loco ex curatione, & embrocationem, donec remoueat.

¶ De dislocatione Digitorum pedis, & cura.

Caput

xxxv.

OPORTET, ut æquatur quod dislocatur ex eis cum extensione pauca absq; labore: & illud quidē non est difficile, imo est facile. Si autem dislocatio est in quibusdā nodis dorsi pedis: tunc oportet, ut faciat sedere infirmus pedem suū super locū æquale terræ, aut super tabulam: & est stans sicut ambulans. Deinde tu sta, & pone pedem tuum super illud quod eminet ex illis iuncturis. Deinde calca illud cum pede tuo cum uirtute, donec redeat, & uideas ipsum iam æquatum, & non appareat in loco eminentia. Deinde pone sub uentre pedis eius tabulam quæ capiat pedem totum, cui sint duo capita. Deinde stringe ipsum strictura decenti tribus diebus. Deinde solue ipsum, & fac quiescere cum ab ambulatione diebus multis, donec stringatur & securetur a reductione.

¶ De speciebus dislocationis cum uulnere uel fractura. Caput xxxvi.

QUANDO accidit aliquid ex illo, & conaris curationem eius, & ipsius restaurationem, multotiens succedit mors: & propter illud non oportet, ut presumat super curationem eius, quod est

huiusmodi, nisi qui est prudens in arte longi usus, misericors, pius, tardus, non audax, neque presumptuosus: & ut utatur in incæptione medicinis quæ sedant apostemata calida tantum: & dimittat infirmum diuino iudicio. Nisi uideas, aut speras salutem a perditione cum lenitate ægritudinis, & in quo apparet quiddam spei. Conare ergo reductionem eius statim in principio rei, antequam accidat apostema calidum. Si ergo redit membrum, secundum quod uolumus, tunc administra regimen quod sedat apostema: & cura uulnus cum eo quod cõuenit ei ex unguentis desiccatiuis. Quod si dislocatio est cum fractura, & accidunt in osse saragie separate, tunc conare ablationem earum, & fac in illo quod diximus in ægritudinibus simplicibus ex eo quod præcessit in locis earum. Et caue secundum tuam uirtutem, et custodi teipsum ab introitu in uiam timoris: secundum quod præcessit prædicatio mea tibi. Nam illud est melius tibi apud Creatorem tuum, & magis permanens ad gloriam tuam, & magis saluum tuo corpori apud illos in tuo tempore.

¶ Explicit Liber Chirurgiæ, quem transtulit Magister Gerardus Cremonensis in Toletum, de arabico in latinum: qui Liber est tricesima particula libri Azaragi, quæ composuit Albucasisi.

¶ A R G E N T O R A T I apud Ioannem
Schottum librarium. XXVI. Febr.
Anno M. D. XXXII.

✚ C V M Gratia & Priuilegio Imperatoriæ
Maiestatis ad Quinquennium.